

*image
not
available*


NOVI
HER
BARI
TOMVS II.

PER OTH. BRVNF.
recens editus, M. D. XXXI.

Continens quæ uersa pagina
subnorantur.

ARGENT. apud Ioannem Schottum,
cum Cæs. Maieſt. Priuilegio ad Sexenniũ.





DE VERA

HERBARVM cognitione
APPENDIX,
cui sequentia insunt.

- 1 Exegesis omnium Simplicium Dioscoridæ,
& quomodo ipsæ quæ in Officinis seruan-
tur respondent. 3
- 2 Scribonij Largi Medici uetustissimi, de Sim-
plicibus fragmentum. 31
- 3 Io. Mainardi Ferrarien. Medici nostri secu-
li clarissimi, Annotationes aliquot Sim-
plicium, e scriptis eius extractæ. 32
- 4 Nicolaus Leonicensus de falsa quarundam her-
barum inscriptione a Plinio. 22
- 5 Pandulphus Collinutius de interpretatione
Simplicium quæ sunt apud Plinium, calu-
nijs Leoniceni respondens. 89
- 6 Leonardi Fuchsi, Principis Brandenburg.
Medici Annotationes de Simplicibus, a
medicis hæcenus perperam intellectis, &
æstimatis. 129
- 7 Generosi Comitæ Heremanni a Neuenar cen-
suræ aliæ Herbarum super eadem re. 116
- 8 Do. Ioachimi Schylleri Medici iudicium de
Garyophyllis. 115
- 9 Hieronymi Tragi medici dissertationes fere
quingenta, de herbarum quarundam
nomenclaturis 156
- 10 Marci Gatinariæ medici quondam Ticinen.
Annotatio una & altera de Taraxaco, Ci-
corea, Iua, Elula, & Soldanella. 165
- 11 Iacobi de Manlijs Alexandrini, interpretatio
Simplicium, secundum ritum Offinarum. 167
- 12 Hieronymi herbarij Apodixis Germanica,
ex qua facile uulgares herbas omnes lice-
bit perdiscere. 193

C O N T E N T A.

¶ Rhapsodiæ Herbarum T O M I Secundi,

Hederarum typi duo .	6	Acori	28
Peoniæ.	11	Apiorum & Petroselin	29
Caprifolij 1	12	Iaceæ	50
Pulicariarum typi duo	16	Gladioli	51
Feniculi 1	21	Herbæ fullonum 1	52
Serpilli 1	22	Libanotidis	53
Scabiõfæ 1	25	Maïoronæ	60
Eupatorii 1	27	Lappati 1	62
Solani 1	29	Meliloti 1	62
Hirundinariæ 1	36	Nasturtij 1	73
Fragariæ 1	37	Mentaram 1	77
Rostri ciconiæ 1	38	Polypodij	85
Scolopendrij 1	21	Saluiæ	88
Liliorum	22	Valerianæ	90

¶ Herbæ remissæ ad .I. T O M V M, uel alias ut ignotæ, non descriptibiles.

Parietaria	19	Dondernegelin	58
Solidago	25	Cardus triplex	65 & seq.
Penitaphyllon duplex	33	32 Acetosa	63
Geusbluom	32	Vnifolium	60.
Scheiffskraut	39	Herba Trinitatis	69
Garyophyllata	22	Malua triplex	70 & seq.
Ebervurtz	23	Herba syluestris ignota	80
Synnau	53	Sanguinaria	81
Fleyischbluom duplex	52	55 Stellaria	82
S. iacobs bluom	56	Artemisia	83
Negelblümlin	57	Raponeoli	82

D. Generosis C O M I T I B V S, et Dominis
D. Bernardo, Othoni, & Vuolphgango
a S O L M S, patri, cum duobus
filijs, dominis suis gratiosis.
Otho Brunfelsius
S. D.

Fortasse & in nos iactabunt Celsi. V. qđ de Ciclyco quondā scriptore lusi poēta Horatius,
Nec sic incipies, ut scriptor Ciclycus olim.
Fortunam Priami cantabo, & nobile bellum,
Quid dignum tanto, feret hic promissor hiatu:
Parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Siquidem post diuturnum illud silentium, *καὶ μνησθῆναι ἡμῶν*, amplissimasq; spes illas, quas de
hoc secundo Tomo, uestre sibi Celsi, conceperant, uix tandem pauculas herbas proferimus, &
eas partim in priori descriptas Tomo, partim incognitas, & e Medicorū schola exoletas. Con-
tingitq; & nobis, ut amphorā instituentibus, plane urceus exierit. Verum huius negligentiae, ut
priuata aliquando rationē reddemus Celsi. V. ita et apud herbariē ac simplicis medicinae stu-
diosos, publica apologia nos purgabimus, ubi libellum nostrum ediderimus in lucem, quem
de Synonymis nunc in manibus habemus. Et ut rem uno uerbo retegā Celf. V. tam immen-
sum in ipso mediō opere tēdū nobis obrepit, ut nisi tātis id a nobis precibus efflagitassent, adeo
q; & extorsissent doctis, ac longe clarissimi uiri, D. Henrichus ab Heppendorff, D. Nicolaus
Gerbelius, & D. Ioannes Sapidus, alteri eam demandaturi prouinciam fuisset: quibus sane
ut amicis, multis nominibus nobis charissimis, fas non fuit quicquā denegare; ita sane, si quid
siue frugi, siue ineptum etiā, posthac in eo genere a nobis scribetur, illis sane debetur autori-
bus. Quamquam & in hanc diem ea torqueamur molestia, quā quouis Aethnae onere, hume-
ris nostris grauius incumbit, arque ideo tamen excutere non licet, quia typographo obstri-
cti necessario sumus, cui fuerat gratificandū: cū alioqui, aut alio officio, aut uberiori, faciliorq;
argumento poteramus fidē nostrā redimere a Celf. uestris. Vestrarum igitur Celf. erit, cum to-
tum hac uice pensum reddere non ualeamus, saltem *καὶ ταῦτα* accepta habere. Et quem admo-
dum ego corporalia uestra beneficia magnifacio, ita si non adamusim mea respon-
deant literaria, quod reliquum est uestro splendore, uestraq; magnificentia farcire dignamini,
ἀλλ' ἵνα οὐκ ἐμὴν οὐδὲν γὰρ ἔλαττω. Quod si letioribus auspicijs nos exce-
perit sequens annus, tum & nos quoque maioribus uigilijs, acriori-
busq; studijs ornabimus sequentem librum nostrum. De tam
prolixo quoq; Appendice, & cur in illo pugnantes
scriptorum sententias iuxta posuerimus, in Sy-
nonymis quoq; nostris ratio reddet.
Interim bene ualeant Celf. V.
quas ut Dominus
quam diutissime nobis seruet, uehementer optamus. Argen-
torati quarto Nonas Decembris, Anno a Ser-
uatore nostro nato domino Ihesu
Christo millesimo quingen-
tesimo trigésimo
primo.



Hedera.

A



B

Epphew.

A 3

C

¶ De HEDERIS omnium generum,

Rhapsodia PRIM A.

¶ Nomendatura.

Hedera Græce, κίανος. χρυσόκαρπος. κίαιον. ἡκάλανος.

Latine, Syluamater, Hedera.

Germanice, Epphaw

¶ Summaria descriptio HEDERARVM
ex Dioscor. lib. 2.Hederarum
genera.

HEDERA DIFFERENTIAS MVLTAS in specie sortitur, generalissimas autem treis. Nam quædam candida est. Altera nigra. Tertia Helix. Candida fructum fert candidum. Nigra, nigrum, aut Croci æmulum, quam uulgus Dionysiam uocat. Helix fructum non gignit, sed tenues habet palmites, & folia parua, angulosa, & rubra.

¶ De multis HEDERAE Generibus ex

Plinij lib. 16. cap. 32.

Hedera iam dicitur in Asia nasci. Negauerat Theophrastus: nec in India, nisi in monte Mero. Quin & Harpalum omni modo laborasse, ut fereret eam in Medis, frustra. Alexandrum uero ob raritatem ita coronato exercitu, uictorem ex India rediisse, exemplo Liberi patris: cuius dei & nunc adornant thyrsos, galeasq; etiam & scuta, in Thraciæ populis, in solenni bus sacris. Inimica arbor satis omnibus, sepulchraq; ac muros rumpens: serpentium frigori gratissima, ut mirum sit illam in honore ullo habitam. Duo genera eius. Prima ut reliquarum, mas, & fœmina. Maior traditur mas, corpore, & folio duriore ac pinguiore, & flore ad purpurâ accedente. Vtriusq; autem flos similis est rosæ syluestri, nisi quod caret odore. Species horum generum tres. Est enim candida, & nigra Hedera, tertiâq; quæ uocatur Helix. Etiam nunc hæ species diuiduntur in alias: quoniam est alia fructu tantum candida, alia & folio. Fructumq; candidum ferentium alii is densus acinus, & grandior, racemis in orbem circumactis, qui uocantur Corymbi. Item Selenitium, cuius est minor acinus, sparsior racemus. Simili modo in nigra. Alicui & semen nigrum, alijs crocatum. Cuius coronis poetæ utuntur, folijs minus nigris: quam quidam Dionysiam, alijs Bacchicam uocant, maximis inter nigras corymbis. Quidam apud Græcos etiam nunc duo genera huius faciunt, a colore acinorum, Erythraenum, & Chrysocarpum. Plurimas habet differentias Helix: quoniam folio maxime distat. Parua sunt & angulosa, concinnioraq; cum reliquorum genera simplicia sint. Distat & longitudine internodiorum, præcipue tamen sterilitate: quoniam fructum non gignit. Quidam hoc ætatis esse, non generis existimant: primocq; esse Helicem putant, fieri Hederam uetustate. Horum error manifestus intelligitur: quoniam Helicis plura genera reperiuntur, sed tria maxime insignia. Herbacea ac uirens, quæ

Hederarum
species tres.Corymbi.
Selenitium.Helicis gene-
ra.

plurima est: altera candido folio: tertia uersicolor, quæ Thracia uocatur. **A** Etiamnum Herbaceæ tenuiora folia, in ordinem digesta, densioraq;. In alio genere diuersa omnia. Et in uersicolori alia tenuioribus folijs, ac similiter ordinatis densioribusq;. In altera neglecta omnia hæc. Maiora quoq; ac minora sunt folia, macularumq; habitu distant. Et in candidis, alia sunt candidiora. Adolefcit in longitudinem maxime Herbacea. Arbores autē necat Candida, omnemq; succum auferendo, tanta crassitudine augetur, ut ipsa arbor fiat. Signa eius, folia maxima atq; latissima, mammas erigētis, quæ sunt cæteris inflexæ: racemi stantes, ac subrecti. Et quantq; omnium generi radica brachia, huic tamen maxime ramosa ac robusta. Ab ea nigre. Sed proprium albæ, quod inter media folia emittit brachia utrinque semper amplectens. Hæc est & in muris, quamuis ambire non possit. Itaque etiam pluribus locis intercisa, uiuit tamen, duratque, & totidem initia radicum habet quot brachia, quibus incolumes & solidas arbores fugit ac strangulat. Est & in fructu differentia albæ, nigraeq; Hedere: quoniam alijs tanta amaritudo accini, ut aues non attingant. Est & rigens Hedera, quæ sine adminiculo stat, sola omnium generum, ob id uocata Cissos. E diuerso, nunquam nisi humi repens Chamæcissos.

Hederae candidæ signa.

Hederarigens.
Chamæcissos

¶ Ex Theophrasto, lib. 3. cap. 18.

HEDERA MULTIGENIA EST. QVAEDAM ENIM HUMILIS repens. Quædam se in excelsum attollens. Et excelsarum genera plura, sed trina summa patescunt, Candida, Nigra, tertiaq; Clauicula. Horum item species pleræq;. Quippe alia fructu tantum candida, Alia etiam folijs. Rursum fructum tantum candidum ferentium, alia maiusculum, densum & uelut in globum circumactum profert, quam Corymbiam quidam uocauerunt. Athenienses Acharnicam reginam eam appellant. Alia minorem, sparsiorēq; modo Nigræ. Sed Clauicula differentijs maximis discernitur. Etenim folijs plurimum distat, cum paruitate, tum quod angulata concinctoraq; sunt, cum: Hedera rotundiora, simplicioraq; habeat. Distant etiam internodiorum longitudine, atq; etiam sterilitate: quoniam fructum quædam non ferunt. Ergo Clauiculæ plura genera, sed quæ conspectiori, summaq; occurrunt, tria sunt. Herbacea ac uiuens, quæ plurima est. Secunda candida. Tertia uersicolor, quam Thraciam quidam appellant. Ei harum quæque distare uidetur. Quippe Herbaceæ quædam folio tenuiori, longiori, atq; etiam densiori: quædam minus hæc omnia habens. Et in uersicolorum genere, alia folio ampliore, alia minori. Macularumq; habitu diuersa pari modo, & magnitudine, coloreq; distant. Aucup perfacilis Herbacea, inque plurimū uenit manifestā, quæ hederefcit affirmant, nō tantum folijs, quæ maiora, latioraq; habet, uerum etiam germinibus. Protinus enim erecta gerit, non inflexu gracilitate et longitudine. Herbacea uero crassiora, leuioraq; ac Hedera, ut semen proferre incipit, germen sublimē, rectumq; edit. Est quidem uniuersa Hedera radice numerosa, densa, flexuosa, furculosa, crassa, nec minus alta, sed præcipue nigra: et inter candidas quæ asperrima, immitissimaq; habet. Quamobrē eius amplexus arbores omnes infestat. Omnes enim necat, et exiccat, ablato alimento. Grassatur hæc maiorem in modum, atq; arborefcit intantū, ut per se ipsam Hedera arbor fiat. Attamen ex maiori parte, semper super aliud uitam degere solet, atq; ut ita dixerim, amplexicaulis est, uti pro sua natura, uel quiddam eiusmodi ilico gerit. Nam e graminibus radículas assidue inter folia mittit, quibus arboribus, murisq; obrepit, quasi de industria a natura exhibitum, atq; ita humorem auferens, exhaustiensq; arefacit. Et si inferius succidat, nihilominus uiuere durareq; potest. Habet & aliud discrimen non mediocre in fructu. Nam alijs dulcis, alijs uehementer amarus, tam in candida, quam in nigra. Alii aues mandunt, alium non attingunt. Hedera ita habet.

B

Corymbia
Hedera.

¶ De HEDERAE temperamento ex

Galeno lib. 7. Simplicium.

HEDERA ex contrarijs composita est facultatibus. Habet enim quiddam adstringentis substantiæ, quam terrenam & frigidam esse ostendimus. Habetq; etiam nonnihil æris, quam ca

C lidam esse uel gustus comprobatur. Nec deest tertia; aqueam namque substantiam quandam tepidam obtinet, certe si uiridis sit. Siquidem dum arefcit, hæc prima exhalat necesse est, manetque quæ terrea est, frigida, adstringensque, & ea quæ calida & acris.

Viridis autem, folijs eius in uino decoctis, ulcera grandia conglutinat, quæque maligna sunt, ad sanitatem reducit. Tum igne factas exulcerationes, cicatrice includit.

Porro cum aceto decocta folia, lienosis profunt.

Flores autem quodammodo ualidiores sunt, ut ad leuiorem redacti, cum cerato ambustis conueniant.

Præterea succus medicamentum est errhinon, hoc est, in nares fufum, capiti purgando idoneum.

Tum uetustas aurium fluxiones sanat.

Ad hæc ulcera uetera, tum in auribus, tum in naribus.

Porro si acrior appareat, aut rosaceo, aut dulci oleo miscetur.

Lachryma eius lendes interimit.

Pilis nudat: usque adeo calide potestatis, ut obscure adurat. Est enim uelut aqueus quidam liquor, sicut aliæ omnes lachrymæ.

¶ Vires & iuuamenta ex Dio-

scoride lib. 2.

HEDERA omnis acris est, & adstringens.

Nervos tentat. Flos trium digitorum carptu, facit ad dysentericos, in uino bis die potus.

Ambustis cum cerato illinitur.

D Recentia folia ex aceto cocta, aut cruda cum pane detrita, lienes sanant.

Foliorum & corymborum succus, cum irino unguento, melle, aut nitro, naribus infunditur.

Et contra ueteres capitis dolores, caput eo cum aceto & rosaceo perfrundi utile est.

Purulentis auribus, aut dolentibus cum oleo medetur.

Iuuamenta
Nigræ.

Nigræ Hederae succus, aut e poti corymbi corpus infirmant: mentemque turbant largius sumpti.

Acini quinque triti, calefactique in punico cortice, cum rosaceo, si instillantur a contraria aure, dolorem dentium mitigant.

Denigrant capillum illiti corymbi.

Folia in uino decocta, illinuntur omnium ulcerum generi, etiam si caecæ the sint.

Vitia cutis in facie, & ambusta sanant, uti antea diximus decocta.

Mouent menses triti, & subditi corymbi.

Idem poti post purgationes foeminarum, drachmæ pondere, concipiendi spem adiungunt.

Pediculus foliorum melle irrigatus, ac uulua inditus, menstrua & parus extrahit.

Instillatus succus, putrida tædia narium, graueolentiamque emendat, & sanitati restituit.

Lachryma Hederae Psilothrum est.

Illitu pediculos enecat.

Succus in aceto potus, contra phalangia prodest.

EXBARBARICOROLL.

Hederā fructus quidē uendicāt, sed arborū magnitudinē crescendo aequat. folia primo angulosa, processu rotundant. Multa ei gēra. Humi repit Chamæcissos: de qua in loco. Celsarum tria capita. Candidū. Nigrum. Et Helix, id est, Clauricula, siue Pampinus uocata. Candidū aliud fructu solo, aliud fructu & folio. Id quod fructu solo cander, aut crassiusculū, densum, globatumque habet eum, & Corymbias uocat. Athenis uero Acharnicon irriguū, aut minorem acinum, sparsioresque racemū, & Silention appellat. Simili modo in nigra, cui & suæ quædam differentia sunt, sed minus perspicua. Alicui em semen nigrum. Alij croceum, cuius coronis poete utant, folijs minus nigris: quā & Nyssiam, & Bacchicā, & Dionysiam uocabant, maximis inter nigras corymbis. Alij duo genera fecerunt a colore acinorum, Erythranon, & Chrysocarpion. Helix ab Hedera distat aperitissimo discrimine. Primum folia huic angulata, concinna, exigua: Hedera simplicia, rotundioraque. Distat & longitudine in ternodiorū, præcipue tamē sterilitate: quoniam fructum non gignit. Quidā hoc ætatis uitiiū intelligunt, primoque esse Helicem, & Hedera senectute fieri: quid quidē falsum esse Theophrastus & Plinius contendunt: cū quia foliū & germen Helicis ab Hedera quilibet anno sæ folio plurimū differat: tum quia plures eius differentia noscantur. Herbacea, seu uirens, quæ numero sissima est. Altera folio alto. Tertia uersicolore, quæ Thracia uocatur. Herbaceæ duplex genus. In uno tenuiora folia, digestaque per ordinē, longiora densioraque: in altero diuersa omnia in minus. In uersicolori quoque alia folio crebriore, tenuiore, ordinato: in altera incondito, nūc maiore, nunc minore, maculosoque. In candido gēne, alia plus, alia minus sunt candida. Crescit in longitudinem possimū Herbacea. Nunc reuertor ad Hedera. Hedera ubi semetē cere occæpit, germē sublime, rectūque agit. Radice numerosa, con torta, densa, crassa, lignosa, nec admodū profunda, pserim nigra. Et candidarū quæcūque asper rima imitissimaque est. Hæc & arbores amplexu & suctu stragulat, tanta crassitudine, ut ipsa per se arbor fiat. Signa eius, folia maxia & latissima, mamas, hoc est, germina subrigēda, quæ sunt cæteris inflexæ. Racemi stantes atque recti. Radicosa & robusta. Huic maxime uni brachia. Post ipsam Nigræ: sed propriū Albæ, quæ inter media folia emittit brachia, quibus arbores cōplectūt, & parietibus obrepit. Pluribus hæc locis succisa durat, atque uiuit. & totidē initia radices habet, quæ brachia, ob id flexipedæ cognomēto apud poetas. In nigra & alba alijs dulcedo Acini: alijs tanta amaritudo, ut aues nō attingāt. Est & rigens Hedera, quæ sine adminiculo stat sola oim generū, ob id uocata Cissos a Theophrasto & Plinio, quasi Columellā in eo uocabulo significent. Sed summa diuisio ipsē autoribus, in marē, & fœminā, quæ altera foliū durius, pinguius, maius habeat, & florem ad purpurā accedentē: altera non habeat. Vtriq; in flos syluestri rosæ similis, sed minor & inidoneus. Quæ descriptio uidet recētoribus quibusdā non Hederae, sed Cistho cōueniens, cui & sexus & flos punici tribuitur. Sed Theophrastū sequutus est Plinius li. stirpiū sexto, hæc ipsa non de Cistho, sed de Hedera prodenē. Hedera Theophrasti ætate in Asia nasci nō poterat: nec in India, nisi mōte Mero, unde ortus est Bacchus. Frustra & Harpalū laborasse oimo do tradūt, ut fereret eam in Medis. Inimica arbor satis oibus, sepulchraque ac muros rūpens. Serpentii frigori gratissima. Vlos in funes, & armamēta nauiiū Hedera ueteres, autor est Athenæus, quæ & Rhodano petebāt, ut Canabim. Catōnis experimentū, uolenti scire, aqua in uinū addita sit, nec ne: ut uasculū & materia huius faciat, uinū quod erit dilutum, transluet, aqua manebit. nec em continet uinū inquit uas Hederaeum. Quod poculi genus græci Cissybion, ab Hedera uidelicet appellant, quæ pro quocūque ligneo id accipitur. In quo significat & Cymbiū, & Cypellū quandoque sit. Alij uetustos calices Cissybion intelligunt, propterea quæ in Didymē Iouis dedicatione folijs hederaceis libare moris fuisset. Cymbia uero, quæ ansis careant, oblonga, & angusta, nauigij spēm præbentia. De Hedera Cilicia, quæ tamē Hedera non est, in Smilace trachea quarto uolumine monstrabit. Cissōn, hoc est, Hedera pusionē Liberi patris fuisse Græcia confinxit, in nois sui fructū conuersum, dū minister cū eo deo saliens, terræ allitus perijt. Athenienses Cisson ipsūm Bacchū uocant, & apud se Acharnis uico natā Hedera primo uolunt, ut inquit Pausanias, Syluestre Hedera cerui phalangio percussū mandūt, & liberant. Adelianus autor.

EXM. VERG. COMM.

Numerantur a Plinio uiginti Hederarū genera, folijs, corymbis, uiticulis, altitudine, humilitateque, & usu diuersa, omnia a Theophrasto diuersis locis accepta. Copiosiorque ille generū numerus, quæ in ore oim fuisse quondā nerissimile est, occasione ut nos credimus scriptorem hunc exscribentibus attulit, ut a principio statim Hederarū historię tā multis, tamque diuersis appel-

Theophr. li. 2.
bro. 6. cap. 2.
Pli. li. 16. ca. 34.
lib. 24. cap. 10.

Helix.
Hedera.

B

Cissybion.

Cymbia.

C lationibus, non una nominaretur planta, sed unius plura numerarentur genera.

¶ Paulus A E G I N E T A de H E D E R A.

Cissos ex contrarijs constat potentijs. Stringit enim, & refrigerat, atq; cum quadā acrimonia calefacit, essentię aquosę particeps, uiridis tepida.

Viridia ergo folia incocta uino, uulnera conglutinant.

Ambusta igni, & Spleneticos iuuant.

Succus medicamentum est ^{εἰς πυρ}, id est, quod naribus iniectum cerebrum perpurgat.

Tum inueteratas Aurium fluxiones sanat.

Lachryma eius longe acutior, lentes perimit, & pilis nudat.

¶ Apuleius de Hedera.

Ad C A L C V L V M.

Herbæ Hederae baccas, aut septem, aut undecim contritas, ex aqua potui sumptas, mire Calculos in uelica congregatos frangere & extrahere per urinam, certum est.

Ad C A P I T I S dolorem.

Herba Hedera cum oleo rosaceo, & succo eius mixto uino, tempora, uel frontem perfricabis, sedat dolorem.

D Ad S P L E N I S dolorem.

Herbæ Hederae nigra grana primo. 2. secundo. 5. tertio. 7. quarto. 9. quinto. 11. sexto. 13. septimo. 15. octauo. 17. nono. 19. decimo. 21. in uino bibuntur diurnis diebus: si febricitat, in aqua calida, maximo auxilio lienis auxiliatur.

Ad phalangiorum M O R S V S.

Herbæ Hederae radicis succus bibatur.

Item ulceribus Hedera ex uino decocta, utiliter imponitur.

Ad N A R E S graueolentes.

Herbæ Hederae succus bene colatus in nares infunditur.

Ad A V R I V M uitia, & eis qui

minus audiunt.

Herbæ Hederae succus mundissimus cum uino stillatus medetur.

Ne C A P V T a sole doleat.

Herbæ Hederae folia mollissime trita in aceto, & oleo rosaceo, aduersus omnem capitis dolorem fronti illinuntur,

¶ De uarijs generibus Hederae, uide in Appendice plura.

¶ De P A E O N I A,

R H A P S O D I A .II.

¶ Nomenclaturæ.

Græce, γλυκύσιδα, πείωνια.

Latine, Pæonia. Casta.

Germanice, Bünigoblüm. Peonienblüm.

¶ De P A E O N I A E generibus ex

Dioscor. lib. 3.

P A E O N I A E duo genera sunt. Mas folia Iuglandis habet. In forma uero Smyrni more diuiduntur. Summo caule filiquas emittit ueluti græcas nuces. In quibus quum dehiscunt, multa granula rubra, acinis punicatorum similia inueniuntur, & in medio nigra, quinque, aut sex, purpurea. Radix maris tenuis, digitali crassitudine, & palmi longitudine, gustu adstringens, alba. Foemine radicibus ceu glandes circiter septem, aut octo inhaerent, ut in Hastula regia.

P L I N I U S lib. 25. cap. 2.

B

Vetustissima inuentu Pæonia est, nomenque autoris retinet, quam quidam Pentorobon appellant, alij Glycyfiden. Hec quoque difficultas est, quod eadem aliter alibi nuncupatur. Nascitur opacis montibus, caule inter folia digitorum quatuor, ferente in cacumine ueluti græcas nuces quatuor, aut quinque. Inest ipsi semen copiosum, rubrum, nigrumque. Hæc medetur & faunorum in quiete ludibrijs. Precipiunt eruere noctu. quoniam si pius martius uideat, tuendo in oculos imperum faciat.

Eadem fere Theophrast. lib. 9.

De P A E O N I A E temperamento ex Galeni lib. 6.

Glycyfida, quam Pentorobon, & Pæoniam uocant, radicem habet leuiter adstringentem, cum dulcedine quadam, ac si plusculum dentibus mandas, acrimoniam item quandam subamaram esse percipies. Proinde menses ciet ex melicrato amygdali pota quantitate. Sane tundere eam necesse est, ac ita cribratam inspergere. Expurgat porro etiam iecur obstructum, & renes: sed hec efficere nata, quia acris et subamara est. Quia uero etiam quiddam adstrictorium obtinet, in uentre prouenientes fluxiones sistere potest. Cæterum eam nunc in austerorum uinorum quopiam decoctam potare conuenit. Est porro omnino et resicatoria. Eapropter haud desperauerim, eam ex collo pueris suspensam, merito comiciali morbum sanare. Equidem uidi puellum quandoque octo totis mensibus, morbo comiciali liberum: ac postea forte fortuna, cum quod a collo suspensum erat decidisset, protinus denuo conuulsione correptum, rursusque suspensio in locum illius alio, inculcate postea egisse. Porro uisum est mihi, satius esse, rursus id collo detrudere, certioris experientie gratia. Id cum fecissem, ac puer iterum esset conuulsus, magnam recentis radice partem ex collo eius suspendimus: ac deinceps prorsus sanus effectus est puer, nec postea conuulsus est. Rationabile itaque erat, aut partes quasdam a radice defluen-

Experimentum contra morbum comiciali.

Cres, ac deinde per inspirationem attractas, affectos ita locos curare, aut aërem a radice assidue mutari & alterari. Nam hoc pacto succus cyrenaicus columellam phlegmone affectum iuuat, et melanthium frictum, palam catarrhos, et coryzas desiccatur, si quis id in calidum linteam rarum liget, assidueque calorem ex eo per inspirationem in nares attrahat. Quin etiam si compluribus linis, & maxime marinæ purpure, collo uiperæ iniectis, illis uiperam prefores, eaque postea cuiuspiam collo obijcias, mirifice profuerit, tum paristhmij, tum omnibus ijs quæ in collo expullulant. Sane de talibus, priuatim aliquando forte conscribam. At nunc Pæoniæ cognoscendum temperamentum est, tum exiccatorium, tum subtilium esse partium, haud tamen insigniter calidum, sed aut symmetrum, aut pauxillo calidius.

V I R E S & luamenta ex Dioscor.

Fœminis a partu non purgatis, sicca radix datur.

Ciet menses nucis græcæ magnitudine pota.

Sic ventris doloribus cum uino auxiliatur.

Valet contra regium morbum, & renum ac uesicæ dolores.

Decocta in uino, aluum sistit.

Rubra grana rubentis menses sistunt, decem, uel duodecim pota in uino austero & nigro.

D Grana nigra auxiliantur suppressionibus nocturnis, uulvæ strangulationibus, & matricis doloribus, quindecim numero pota, in aqua multa, aut uino.

Nascitur in altissimis montibus, & promontorijs.

EX APVLEIO ad Sciaticos.

Pæoniæ herbæ radice partem alligabis ei qui patitur, & circumcinges: res est saluberrima.

AD LVNATICOS.

Herba Pæonia, si lunatico iacenti imposita fuerit, nunquam ei hoc mali accidet.


EX M. VERG. COMM.

Vnum Pæoniæ genus tantum tradidit Theophrastus libro. 9. de plantarum historia, quo loco, nisi a Plinio isdem uerbis redditum esset, quod ab eo traditur, non diceremus. Id huiusmodi est, ἀλλὰ τὰ τοιαῦτα ὡς περ ἐπίθετα καὶ πόσῳ δὲν εἶνε πῶς πωλείαν ἐν δὲ γλυκύσιδαν καλοῦσι νῦν τῶν κελύουσιν ὁρῶσιν, ἅν γὰρ ὑμῖν αὖτε, καὶ ὅθῃ τις ἀπὸ Δρυονιάδων τὸ μὲν καρπὸν ἀποδίδων, κινδυνεύει τοῖς ὀφθαλμοῖς. Quorum sensus sit, ut Plinius etiam reddidit (uerum adiunguntur hæc, & ex longinquo) Quemadmodum Pæoniam, quam Glycyfidem uocant, noctu effodi iubent: quoniam si per diem fodiatur, uideaturque Picus auis, qui semen legit oculis, periclitatur. Vidimus nos, renascentemque aliquot annis utramque Pæoniam obseruauimus: & ex ijs, quas habebant ambræ præcipuas & certiores notas, folia scilicet, caules, folliculos, & in folliculis semina nihil scriptoris huius historiae aptius respondere uisum est.

Sequens herba potius Stellaria, quam Caprifolium est, de qua infra fol. 82.

Caprifolium.

A



B

Walmeyster.

C

DE CAPRIFOLIO,

uel Matrifylua. Teutonice

Geyssolat, oder Walmeyster.

R H A P S O D I A .II.

Matrifylua quid sit ex sententia scholiastæ
Luminis maioris.

CAPRIFOLIVM SECVNDVM NICOLA-
um, est Matrifylua. Matrifylua autem apud Dioscoridem est
^{περικλυμένον}. Ex folijs ipsius apud quosdā fit Licium. Et est herba quę iuxta
hortos inuenitur: et illa est, quam rustici uocant Cezolo.

Oculus luci-
dus.
Licium fit ex
Caprifolio.

Et rursum, Matrifylua secundū Compositorem est Ocululus lucidus,
seu Caprifolium, & de hoc apud quosdam fit Licium: sed illud Licium
est debile.

Hęc herba apud nos iuxta hortos inuenitur: cuius folia sunt apud nos
subalbida ab uno latere, ab alio latere uiridia, sibi adherentia, & se inuo-
luentia super alias plantas, ut est notum. Et est quam Dioscor., Periclymne
non uocat, & nostri Cezoli uulgariter uocant.

Splenaria.
Linealis.

Sententia P A N D E C T A R I I succinens priori.

Matrifylua gręce ^{σπληνάρια}, uel Splenaria, uel Linealis, uel Periclymenos.
Herba est cuius folia sunt ex altero laterum subalbida, & ex altero uiri-
dia, adherens, & aduoluens se sepibus. Cuius fructus sunt magnitudine
Cubearum, in principio uirides, & cum maturuerint citrini coloris, ten-
dentes ad rubedinem, positi ordinarie, et conclusi in duobus folijs simul
coniunctis, existentibus in capitibus stipitum iuxta eum.

Matrifylua.

M A T R I S Y L V A nomen uulgare multis.

Videtur commune atq; uulgare nomen multis herbis, uocabulum Matrifylua. Siquidem &
Stellaris herba: quam in primo Tomo fecimus Hepatarię tertiam speciem, ni fallor, uocatur
hoc nomine, fortasse, quia uelut mater omnibus alijs herbis emineat atq; præpolleat. Vide in-
fra Hieronymi descriptionem in dictione, Walmeyster.

Genuina descriptio Periclymeni
ex Dioscoride lib. 2.

Nomenclaturę
Caprifolij.

Periclymenon, aliqui Aeginam, alij Cylmenon, alij Carpathon, alij
Splenion, alij Epetitin, alij Axinam maiorem, nonnulli Clematitin, alij
Myrcinen, alij Calycanthemon, Magi Polion Veneris, Aegyptij Tur-
con, Romani Volucrum maius, Aphri Lanath appellant.

ὑκόν

Simplex fruticat, ex interuallis parua folia habens, ipsum amplecten-
tia, subcandida, hederacea. Inter folia furculi exeunt, in quibus bacę He-
derę similes. Flos fabę, candidus, aliquantum rotundus, & quasi in fo-
lium procumbens. Semen durum, & quod difficile euellatur. Radice ro-
tunda, crassa. Nascitur in aruis ac sepibus, conuoluens se adminiculis pro-
pter assidentibus.

DE PERICLYMENI tempera

Periclymeni utilis est tum fructus, tum folia: adeo uehementer intercidentis pariter & excalfacientis facultatis: ut si plusculum bibantur, urinam sanguinolentam efficiant, principio quidem urinam dumtaxat mouentia: porro foris cum oleo illita, excalfaciunt. Inuant & lienos difficulter spirantes. Competens potionis mensura est drachmę unius cum uino. Porro desiccatur quoque semen. Et quidam aiunt, si copiosius bibatur, sterilitatem bibentibus afferre. Sed & sunt qui certum dierum numerum, ad talem portionem præfiant, ut Dioscor. qui septem & triginta eos tradi refert. Hic etiam urinam cruentam reddi a sexto die memorat.

V I R E S eius & iuuamenta ex
Dioscor. L I B R O . 2.

Semen eius postquam ematuruit collectum, & in umbra siccatum, drachmę pondere datur in uino quadragenis diebus, ut lienē absumat, ac molestiam discutiat.

Sed urinam ciet, statim a sexto die cruentam.

Orthopnoeę, & singultui prodest.

Partum accelerat.

Folia sunt eisdem uiribus prædita. Quę tricenis septenis diebus epota, sterilitatē facere produntur.

Perunctis ex oleo febrium rigores abigunt.

Ex P L I N I O libro. 27. cap. 12.

Periclymenos fruticat & ipsa, ex interuallo duo folia habens, subcan- **B**
dida, mollia. In cacumine autem semen inter folia durum, & quod difficile euellatur. Nascitur in aruis ac sepibus, conuoluens se adminiculis qui buscunque. Semen eius in umbra siccatum tunditur, & in pastillos digeritur. Hi resoluti dantur in uini albi cyathis tribus, tricenis diebus, ad lienem: eumque urina cruenta, aut per aluum absumit, quod intelligitur a decimo statim die. Urinam ciet & folia decocta, quę & orthopnoicis pro sunt. Partum quoque adiuuant, secundasque pellunt pora simili modo.

De alio V O L V C R I O .

Est etiamnum aliud Volucrium, quod Græci *κλυμενος* uocant: & uidetur esse Liliū conuallium, teutonice, *Meyblümlin*, proxime supra adpictum. quod quid reuera apud Dioscoridem esset, priori Tomo ingenue confessi sumus nos ignorare. Descriptio est apud Dioscor. lib. 2. iuncta ei, quam nunc tractauimus Periclymeno: quam poterunt inibi, qui nostris rationibus atque augurijs fortasse diffidunt, consulere.

Liliū conuallium.

Pulicaria mascula.*Flechtraut Männlin.*

Pulicaria Fœmina.



Flehkrautweiblin.

B 2

C De P V L I C A R I I S.

C Rhapsodia .II.

P V L I C A R I A E nomen, nescio quam recte inditum sit herbis duabus, quæ hodie Pulicariæ uocantur: quando nihil prorsus illis respondent Dioscor. Conyzæ, lib. 3. simplicium. Quare inter anonyms libuit collocare, donec certius aliquid addiscamus. Habebis infra & in Commentarijs Iacobi de Manlijs, nonnihil de Pulicarijs.

E X D I O S C. L I B. III.

De Conyza magna.

Conyza magna ab aliquibus Cynozematitis, alijs Danaïs, alijs Tanachion, aliquibus Phycos, alijs Ichis, alijs Dinofmos, Magis Brephoctonos, quibusdam Anubias, nonnullis Hedemias, Aegyptijs Creti, Romanis Militaris, aut Deliarium, aut Febrifuga, alijs Fraginosâ nuncupatur.

B A R B A R I C O R O L L.

Conyza, quæ a nostris Cunilago dicitur, & Plinio Cunila quandoque libro decimo, & a Theodoro Pulicaris, quia pulices necat. Folio coronat, & maior & minor appellata. Maior dicitur esse mascula, folio aspero, pinguiore quæ minoris, & imbricato, torosiore caule, magisque ramoso, radice lignosa: quæ a quibusdam ut herba quoque ipsa, Libanotis dicitur, autore Plinio. Manipulo eius abiecto, omnes etiam a tota domo blatte conueniunt ad eam. Vtriusque genus ferotinus, ut quod post arcturum germen, floremque mittat. In summa, Cunilaginis appellatione, quatuor herbarum ueniunt: mascula, & foemina. Et quæ tertio loco ponitur foetidissimi inter omnes odoris. Quarta reddit Plinius: quæ appellatur satiuâ, Serpillo similis, e Culagine mœrana facta. Est & contra eius species Hippoc. ut dicit paulo post. Cunilago dicitur et ipsum Ligusticum ab aliquibus, sed falso. At Cunilæ tria sunt genera siue nomina. Capitata et nostratæ, quæ Satureia sit, uocamus. Gallinaceam quæ Origanum, Heracleoticum: Bubulâ, quæ quædammodum a Græcis dicatur, aliud non capi, quæ quæ Plinius per Origanum accipere multis locis uidetur, in qua significatio uocabulo eo et nos uti sumus.

D De CONYZA PARUA.

Conyzæ duo genera. Quæ parua uocatur, odore præstantior est. Maior uero frutice altior, & folijs latioribus, graui odore. Vtriusque folia Oliuæ similia, hirsuta, pinguiâ. In maiore caulis binum cubitorum altitudine attollitur. In minore pedem æquat. Flos squalidus, lutei, aut fului coloris. Quin in pappum abit. Radices superuacuae. Suffitu, substratuque frustex animalia fugat. Culices abigit, & pulices necat. Folia conuenienter illinuntur serpentium plagis, & tuberculis, ac uulneribus. Flos cum uino ad menses partusque eiciendos bibitur. Item contra urinæ stillicidia, arquantum morbum, & tormina. Comitiales potus ex aceto adiuuat. Decoctum in deflectionibus medetur uulnæ malis. Impositus succus abortum facit. Ex oleo efficaciter rigoribus oblinitur. Capitis dolores tenuis illita sanat.

B A R B A R I C O R O L L.

Conyza minor eadem foemina, Hippocrati Cunilago semper mollis uocatur. Folia huius trita, mellis odorem habent, digitis tactu coherentibus. Hanc Dioscorides Libanotidem appellat, cum Plinius masculam ita nominet. Pilosiora minori folia & rami: qui & aculeati sunt. Flos squalidior, odore acriore, qui tamen grauior sit masculæ.

De Altera Conyza.

Est & tertium Conyzæ genus, quod aliqui Paruam, alij Panion, alij Libanotidem. Magi Cronon uocant. Caule crassiore, ac molliore. Folijs quam Paruæ maiusculis, minime pinguis, & maiore minor, multo grauius

Pulicariæ anonyms.

Cunilaginis genera.

D

oris odoris & inuicundioris, sed inefficacior. Prouenit locis non riguis. **A**

Hippocrates Cunilaginem, siue Conyzam, præter supradictas, aliam describit. Aplo crispo similem: in maritimis, sabulosisq; nascentem, odoris terribilissimæ, & maxime fastidendi: quam cum melle atq; uino foeminarum locis, quæ sætum non recipiant, admoueri præcipit, libro de muliebribus causis secundo.

C O N F U N D I T, M I S C E T Q; P L I N I U S pluribus locis cum Origano Conyzam. Nec facile est eodem

nomine duas diuersasq; plantas ab eo sæpius appellatas, in historię medicinę gratiam & usum fecernere. Longior fuerim, si omnia quæ tam multis locis de Conyza, Cunilagine, & Cunila ab eo dicta sunt, coaceruare hoc loco cogitem. Superuacaneū id etiam fuerit, quoniā signanda non multo post & repetenda nobis omnia, aut plura saltem ex illis erunt. Aliud itaq; prius agamus, & ut nouerint omnes, non esse Conyzam Origano eandem, neq; diuerso utriusq; proprias numerabimus notas: ut propositis his, quæ a Plinio miscentur certius pateant. Incipiamus autem ab Origano, quam hic ait folium Hyssopo simile habere, umbellam nō comosam, uerum diuisam, & in summis uirgis semen. Et quod ad alia Origani genera pertineat Onetida candidioribus folijs, sed magis Hyssopo similibus esse: semine uero corymborum mō, & quā agrestem Origanum dicunt, folia priori Origano similia habere: uirgas dodrantes, in quibus Anethi modo umbellæ sint, & candidi flores. Et hæc omnium Origanorum in hoc scriptore notæ sunt. Conyza uero, quas paulo ante diximus folium oleaginum, non Hyssopi, hirsutum, pingueq; caules bicubitales: flores lutei, fragiles, subamari, & qui in puppis euolent. Quorum nihil habet Origanus aliqua. Plinius autem lib. 19. cap. 7. auctore herbario Crateia, Ligusticum primo seu Panaces Cunilam bubulam uocari tradit: cæteros hanc Conyzam græce appellare, & ab eodem Cunilaginem dici. Idem non multo post uolumine. 20. cap. 15. Cunilæ præter fatiuam plura sunt in medicina generā. Quæ Bubula appellatur, semen Pulegi habet: uile ad uul-

Crateias herbarius.

nera commanducari, impositumq; ut quinto post die soluiatur. Contra serpentes quoq; in uino bibitur, ac tritum plagis imponitur. Vulnere ab his facta confricantur. Item testudines cum serpentibus pugnaturs, hac se muniant. Hic ipse Plinius sequenti capite etiam ait. Est alia Cunila appellata a nostris, a græcis Origanum Heraclæoticum. Totoq; hoc capite nihil, nisi multiplex Cunila ab eo tractatur: manifesteq; Conyza hæc Cunilæ nomine censetur, cum ait. Pulices etiam contritæ cum aqua sparæ necant. Quod priuatim Conyza habet. Poterant & alia repeti, sed ad eam quam cogitauimus rem satis hæc sunt. Nec nobis aliud modo propositum est, q̃ monere ex his quæ paulo ante dicta sunt, toto genere differre inter se Origanum omnem, & Conyzam omnem, Pliniumq; Cunilæ nomine in utraq; passim uti. Omitimus quod primum ille ait, Ligusticum, seu Panaces Cunilam a quibusdā dici. Falsum enim non multo post esse id ipse testatur. Quod autem lib. 20. cap. 15. ab eo dicitur, Cunilæ præter fatiuam plura sunt genera. &c. ad Origanum manifeste pertinet: præsertimque, quod de testudinibus cum serpentibus pugnaturs eo loco traditur: si Plutarcho credimus in naturalibus causis dicenti. ἡ δὲ χελὼν φάγει τὴν σάρκα τοῦ ἰχθὺς ὀρίανον ἰππῶν, quod & si idem penitus non sit, eandem tamen rationem habet. Quæ deinde statim ab hoc loco descripta ab eodem sunt. Est & alia Cunila a nostris appellata, a græcis Origanum Heraclæoticum, ad Origanū similiter pertinent. Cumq; plura Cunilæ genera fecisset, uni ex his omnia Conyza huius tribuit. Tamq; uagus in hoc Cunilæ nomine, incertusq; est, ut nihil nos ex decretis eius certum asserere audeamus. Quod autem coniicimus, huiusmodi esse. Origanum græci uocant notam omnibus herbam: & ut sit in gentibus, quibus semper & ubique non fuerunt eadem rerum nomina, eandem Conilam uocauerunt. Testisq; hic ipse in Origanis, sed multo certius in Theriacis suis Nicander dicens. ἀόρχητοι ἢ μνηστὰ πεντάτοις τιναίναν, ἢ τὴν καὶ ἡράκλειον ὀρίανον ἀπορίπτοναι. Quorum sensus est. Et corchorum clauso folio, & omnia sanantem Conilam, quam Herculeam Origanum appellant. Nihil antiquorum duorum scriptorum, ut uidetur, certiore fide confirmari poterat. Pro compertoq; est, Conilam antiquis græcis Origanum fuisse. Potuitq; Plinius eorum auctoritate Origanum Conilam uocare. Nescimus tamen, an Cunilam, quæ si latinis est quæ græcis Conyza, misceri, torrens ab eo non debuerat. Suspiciamusq; nos, quod est minimum inter duas has uoces discrimen (una siquidem litera uariant) causam Plinio dedisse, ut diuersas plantas eiusdem Cunilæ nomine rotiens misceret: cum tamen Origani græca uox, Conila per, o, latina uero Conyze, modo hæc illi respondeat, per, u, scribenda sit. In græca illa uoce certa omni asunt: in latina facile est ratiocinari, Cunilam. siue malis Cunilaginem appellare Conyzam hanc, aut illi similem fuisse. Est enim non Plinio tantum, uerum Columellæ, alijsq; scriptoribus frequens hæc uox. Pliniusque priuatim græcorum Conyza Cunilam manifeste appellauit libro decimo, capite. 10.

Cum ait. Non potest petris auelli polypus. Idem. Cunila admota, ab odore protinus resilit. Acceptum id ab Aristotele est libro quinto de historia animalium his uerbis idem docente.

ἡ δὲ οὐτε πολυπόδῳ ὅν τῳ μὲν προσέρχονται ὥστε καὶ ἀποσπασθῆναι, ἀλλ' ὑπομένειν ἀποτμηθῆναι, ἵνα δὲ τὸ καυτὸν προσέτιναι ὡς φασὶν ἡνδὲ ὁσφραίνεσθαι ἀφίσσιν. Quod ab hoc scriptore relictum, alterius auctoritate & testimonio addere placuit. Et ut meminissent legentes, non posse Conyzam teretiori & grauissimi odoris herbam, cum Origanis misceri: neq; si diuersarum gentium uoces sortuito concursu eundem sonum reddant, ideo eandem in illis rerum esse significationem. Fiunt enim in græcis & latinis multa huiusmodi: suum tamen in sua gente intellectum omnes habent. Dicimus id, quoniā si latinis Cunila est quæ græcis Conyza, non debuerat uicinitate nominis ad Origanum, quæ Conila græcis est, transferri, & cum illa misceri. Nec dicimus, p̄ comperito habere, latinam Cunilam græcam Conyzam esse. Verū illud testamur, ex quorū multis ea uox in usu est, in eam partem propensiores esse, & per, u, in principio scribendam: quem admodum cum Origanū ostendere uolumus, per, o, illam Cunilā, hanc Conilā dicentes. Pulicariam simpliciter in Aristotele quo diximus loco Conyzam uertit Theodorus gaza: factū ex euentu illi hoc nomine, quia, f. pulices enecet: alioquin in nomine nulla est pulicum ratio. Nobis Conyzam hanc magis placuit uocare: ut quarto uolumine descriptam, & Psyllon appellatam herbam, certius ex græco nomine Pulicariam appellemus. ἡ δὲ αὖτε græcis pulex est: & ἡ δὲ αὖτε herba a pulicibus uocat, q̄ insectis his similis femina habet parua, nigra, & tota pulicum figura. Erit ob eam causam duplex in hoc opere nobis Pulicaria, altera præcedente Conyze nomine signata, altera simpliciter a pulicibus nominata. Quemadmodum tunc etiam iterum a nobis dicitur. Habet Conyza hæc Pulicaris, quo in græcis modo leguntur, numerosas appellationes, fereq; omnes incertas: ideoq; non tractandas a nobis, præterq̄ Dinofmon: quæ uox a grauitate odoris illi facta est: & Pissam, quæ pix græcis est, a glutinoso lentore dictam: q̄d Plinius significauit dicens. Trita mellis odorē habet digitis tactu eius cohærentibus. Tria eius gēna Dioscor. numerat, maiorem, minoremq; & tertiam inter utraq; mediam: crassiore mollioreq; caule: folijs maioribus minore, minoribus uero maiore. Theophrastus alijs nominibus duo genera tantum Conyze facit. s. de plantarum historia uolumine, his uerbis. Conyze duo genera, mas altera, femina altera. Differentias inter se habent, quemadmodum & alia: quæ sic diuiduntur. Formina tenuiore folio, & constrictiore est, in uniuersamque minor. Mas maior est, crassiore caule, ramosior, & folium maius, pinguiusq; habet, & præter hoc florem magis splendens. Semen fert utraq; in uniuersumq; sero germinat & florēt. Nec nisi circa, aut post æstivum. Grauis masculæ odor, femine acrior. Quam ob causam contra uenenata utilis. Et hæc

Cunila
Conila.


Da Theophrasto dicta sic se habent. Quæ commentationibus his nostris placuit addere, ut duorum scriptorum concors eademq; historia Conyze cognosceretur: & si non isdem uerbis, neq; eodem modo ab utroq; omnia dicta fuerint. In Dioscoride autem quod ad floris colorem pertinet, qui duplex in communi græcorū sectione legitur, μῆλον ἢ ὑπόβαρτον luteus & subrufus, mutatum a nobis est: secundamq; illam uocē ὑπόπικρον, quod est, subamarum fecimus, luteum & subruffum, diuersos colores male coniungi & misceri sentientes: mox momentibus uetustissimis græcis & latinis codicibus, in quibus amarū adhuc manifeste legitur.



¶ *Parietaria.*

Sanci Peters frut.
Tag und nacht.

Herba hæc descripta
est supra in priori To
mo, folio 263. a. b.
& sequen.



¶ De F O E N I C V L O

R H A P S O D I A . III.

¶ Nomenclaturæ.

Græcè *μαράτρον*.

Latine Maratrum, Fœniculum.

Germanicè, *fenchel*.

F O E N I C V L V M quasi uulgo notissimum a Diosco. non pingit.

¶ De Fœniculi temperamento

ex Galeni L I B. VII.

Fœniculum tam ualenter excalcacit, ut ex tertio ordine excalcacientium cenferi promereatur: desiccatur uero non eque. Sed ipsum quispiam in hoc primi esse ordinis posuerit. Proinde lac procreat: quod si admodum desiccaret, non sane efficeret. Suffusus eadem ratione auxiliatur. Urinas, mensesq; ciet. Porro est & aliud Fœniculum, quod præ magnitudine Hippomaratum nuncupant: cuius radix ac semen amplius quam domestici de siccandi uim obdunt. Quocirca uentrem quoq; eo nomine sistere uidetur. Nec sane manifesta illis inesse uidetur astrictione. Huius non radix modo, sed & semen Cachryi simile est: potestq; & calculos frangere, & æruginosos sanare, mensesq; & urinas mouere: non tamen lac congerere sicut illud superius. Aliud est Hippomaratum, cuius semen rotundum est & acre, simile semini Coriandri, facultate quidem Hippomarato simile, sed debilius.

Ex P A V L O libro. 7.

μαράτρον θερμαίνει μὲν κατὰ τὴν τρίτην τάξιν. &c. id est, Maratrū calefacit in tertio ordine, desiccatur uero quasi in primo. Quapropter lac gignit, & oculorum suffusionibus auxiliatur.

Vires Fœniculi ex D I O S C O R. lib. 3.

Fœniculum, si herba edatur, aut semen cum pūsana bibatur, mammas **B** lacte replet. Cornæ decoctū, in renum doloribus subditū proficit, quippe quod urinam excitet. Contra serpentium ictus in uino conuenienter bibitur. Menses ciet. In febribus nauseam & stomachi feruorē, ex aqua frigida potum sedat. Contritæ radices, & cum melle illitæ, moribus cauum medent. Succus caule & folijs exprimitur, & in sole siccatus in medicamenta adiicitur, quæ ad excitandam oculorum aciem commode temperantur. Extrahitur etiam semine uiridi ramulisq; & radicibus prima germinatione incisis. In Iberia succum reddit gummi similem. Caulem medium dum herba floret rustici demetunt, igniq; admouent, quo facilis us ui calor exudans gummi remittat. Quod efficacius succo est ad medicamenta oculorum.

De Hippomaratro.

Hippomaratri radix menses imposita ciet, potaq; stranguariæ medetur.

Ventrem sistit, radice, aut semine poro. Contra serpentium morsus auxiliatur. Calculos comminuit. Regium morbum expurgat. Lactis abundantiam facit. Decoctum foliorum haustum, foeminas a partu purgat.

De alio H I P P O M A R A T R O

Tradit aliud Hippomaratri genus, longo, exili & angusto folio, semine Coriandri, rotundo, acri, & odorato. Excalcaciendi naturā habet, & uirib; Fœniculo respōdet. Ad oīa infirmius.

Ex lib. Galeni de facultatibus

Alimentorum secundo.

Sua nonnunq; sponte Fœniculum prouenit, ceu & Anethum. Seritur & in hortis. In condimentis assiduus Amethi usus, Fœniculi uero & in obsonijs. Apud nos enim hoc reponunt non secus ac Pyrethrum, ac Terebinthum condientes, ut in totum annum usui sit: quemadmodum & cepas, & rapas, & alia huiusmodi quædam in solo aceto, alia in oxhale asseruantes.

DESERT-
PILLO.
RHAPSODIA. V.

Nomenclaturæ.

GRÆCÆ

ἑρπιδος.
πύλον.

LATINÆ.

Serpillum.

GERMANICÆ.

Quendel.
Byenlin.
Hünertöl.
Wilde Boley.
Unser frauen bensfroe.
Hünertserb.

D

De generibus SER-
PILLI ex
Dioscor. LI
BRO. III.



DVORVM GENERVM EST. HORTENSIV-
um odore Sampsuchum imitatur, atq; in coronas addi solet. Cui a serpendo nomē
inditum est : quoniam si qua eius particula terram attingat, inibi radices demittet.
Folia & ramulos Origani habet, sed candidiores. In maceris multo procerius assurgit. Sylue-
stre Zygis appellatur, non serpit, sed in altitudinem increfcit, ramulos ædens tenues, furculo-
fos, folijs refertos longioribus quam Rutæ, & durioribus angustis. Flores iucunde olent, gu-
stanti acres. Radicis nullus usus. Nascitur in petris satiuo efficacius, atq; magis exalfaciens, &
ad medendi usum apius.

Serpilli explicatio per M. Vergilium.

Serpillum nouerunt, quæ urbes & agros incolunt gentes omnes. Pauci tamen syluestre a sa-
tuo discernere didicerunt : tam paratū ubiq; satiuū est, humana opera a syluestri & horridiore
illius aspectu, ad mitiorem & speciosorem habitū translatum. Quo uno habitu, & ramulorū
in firmitate, a syluestri differt. Fit enim in satiuo Serpillo, quod in urbanis & elegantioris uitæ
hominibus, ut per se rigentibus ramis stare nequeat, sed hortorum delictijs, & nimia humo ris
copia uireat quidem speciosius, infirmius tamen per terram serpat. Qua fortuna in urbibus o-
mnia fere sunt, quæ comparata agro sanitatis, uirium, patientiæ, aliorumq; uitæ laborum &
munerū minus habere ubicunq;prehenduntur. Neq; Herpillum a Græcis, & ex eo Serpil-

lum a latinis dictum est, quod per terrā simpliciter serpit, quæ fatiui nostra ætate fortuna est, sed q̃, ut Theophrastus ait lib. 6. de plantarum historia, proprium quoddam est ramulorū Serpilli incrementū. Priuatim enim possunt in quantam uoluerit aliquis longitudinem trahi, adiectio illis pedamento aliquo: aut si prope sepes plantetur: aut ex altiore loco aliquo deorsum dimittatur. Sic enim in longū protrahuntur: & ab hac plantæ in ramulis eius natura, q̃ in longū Serpillum latini & græci olus hoc nominauerunt. Syluestris contra illius quod Zygida hic ait uocari, nulla est nominis eius inuenta nobis ratio. Nisi forte a trutina, quam græci Zygon uocant, rectitudineq̃ eius ad rectitudinem ramulorū in syluestri Serpillo translata ea uox sit. Aut quia ramulis his natiuo lentore ad uinciendum, & uiliū usum aptis, in re rustica forte uteretur antiquitas, Zygis hoc Serpillum dictum fuerit: & quod eo iugarentur uites, quod *vitis* græci aliquando dicunt, in eadem significatione, in qua ligare & uincire passim latini utuntur. Syluestris Serpilli huius, quod tacuit hic scriptor, duo genera numerauit Theophrastus. Alterum Tymbræam, quod Tymbræam parem acrimoniam habet. Alterum quod odoratius & mollis sit. Hic autem nullam fore in medicina eorum diuersitatem sentiens, unius generis syluestre Serpillum dixit, & ex præcipuo discrimine a fatiua discerni monuit. Multa alia Theophrastus etiā de Serpillo dixit, qualia sunt. Longissime & speciosissime frondere Satiuū, si in puteum descendere dimittatur, podio eius impositū: nec aliud quodpiam genus eius est: plantarūq̃ Serpillum autumno plarūq̃, plantari etiā uere: amare domos & hortos: gaudereq̃ aquis & stercoreatione: præsertimq̃ ex iumentorum fimo: & meliorescere sæpius translatum.

Zygis.

Vires eius & iuuamenta, ex Dioscoride.

Menses trahit. Vrinam potu ciet. Torminibus, ruptis, uulsis & iocine ris in inflammationibus auxiliatur. Et aduersus serpentes potu, illitue. Capitis dolores mulcet coctum adiecto rosaceo, & madefactum in aceto. Maxime uero Phreniticis & Lethargicis conuenit. Cruentos uomitus sedat, succus drachmis quatuor ex aceto potus.

Ex Platina.

B

Serpillum a serpendo dicitur, tam apud nos, quam apud græcos. In montibus enim eadē ratione qua Sifimbrium longe ac late floret. Satiuum minus serpit. Aduersus serpentes efficax est. Capitis dolores decoctum ex aceto, & illitum tempori tollit.

Ex M A C R O.

Hoc ideo miscere cibis messoribus est mos, Ut si forte sopor fessos depresserit illos, Vermibus innocuis tuti requiescere possint. Pestiferos morsus bibitum iuuat, appositumq̃. Prouocat urinas, compescit tormina uentris. Splen iuuat admixto, si sæpe bibatur, aceto. Si mel prædictis iungatur, spina cruenta Iactantes, mire solet potus ille iuuare. Haustum cum uino, iecoris sedare dolorem Dicitur, hicq̃ solet producere menstrua potus.

Baptista Fiera.


Menstrua Serpillum, uesciæ pondera tabem Pectore ab infirmo, subtrahit igne suo.

Ex Columella lib. 12.

Thymum & transmarina Cunila, & Serpillum, magis aluearia curantibus, quam olitoribus, studiose conferuntur. Sed nos ea condimentorum causa (nam sunt quibusdam esculentis aptissima) non alienum putamus etiam in hortis habere locum: neq̃ pinguem, neq̃ stercoreatum, sed apicum desyderant: ut quæ macerrimo solo, per se maritimis præerumque regionibus nascuntur.

Verg. in Alexi.

Thestilis & rapido fessis messoribus æstu, Allia, Serpillumq̃ herbas contundit olentes.



De S C A B I O S A,
R H A P S O D I A. .VI.

A

SCABIOSAM herbam Pandectarius apud Dioscoridem ^{σεύβιον} interpretatur, id est, Steben: sed reclamante Hermolao Barbaro, cuius hæc in Corollario uerba sunt. Si Steba idem est quod Phleos, id quod uidetur afferere Plinius, errant qui Steben pro ea herba capiunt quæ uulgo Scabiosa uocatur, folio Erucæ hirsuto, non tamen aculeis hærente, cærulei floris, ex qua & scopæ fiunt. Sit autem Scabiosa, quæ ab Aëtio Psora dicitur, cuius uisæ fumo arborum Erucæ moriantur, non habeo cōpertū. Hæc Barbarus. Plura qui nosse uolet, consulat uulgaria Herbaria.

Scabiosæ I V V A M E N T A ex

P A N D E C T A R I O.

Fertur, q̃ S. Vrbani ad petitionem cuiusdam sororis suæ anhelantis super Scabiosæ uirtutes, quoniam ipsa continue utebatur, misit sibi infra scriptos uersus.

Vrbani pro se nescit precium Scabiosæ.

Nam purgat pectus quod comprimit ægra senectus.

Lenit pulmonem, purgat laterum regionem.

Apostema frangit, si locum bibita tangit.

Tribus uncta foris antracem liberat horis.

Herbæ huius meminimus supra priore Tomo, in Consolidarum descriptione, fol. 73. d.

B



Solidago.

Masslyeblin.
Scutellum.

C

Eupatorium.

Wild Salbey.



¶ De E V P A T O R I O ,
R H A P S O D I A . VII.

A

¶ Nomenclaturæ.

Græce, ὑπατόριον. ὑπατόριον. ὑπατίτις.

Latine, Eupatorium. Hepatorion. Hepatitis.

Germanice Barbarorum, Wild Salbey. Neotericorum, Odermenig.

E Historia E V P A T O R I I secundum
Dioscor. lib. 2.

E V P A T O R I V M, siue ut alijs placet Hepatorium, aut Hepa-
titis, fruticosa herba est, unum efferens caulem, lignosum, nigricantem,
rectum, tenue, hirsutum, cubitalem, interdum ampliorem. Folijs per in-
terualla Quinquefolij, aut Cannabis similibus, quinquepartito, aut am-
plius diuisis, nigricantibus, per ambitum ferratis. Semen medio caule
rumpit, pilosum, deorsum spectans, quod siccatū uestibus inhæret. Con-
trita huius folia, & cum fuillo adipe imposita, ulceribus quæ ægre cicatri-
cem trahunt, medentur. Herba, aut semen in uino potum, dysenteria, io-
cineris uitijs, & serpentium ictibus liberat. Nec desunt qui aberrantes, Ar-
temisiam hanc appellarint, cum tamen longe alia sit, uti exposuimus.

¶ Iudicia & opiniones quorundam doctissimorum

uirorum, de uero Eupatorio, & primo

Hermolai Barbari.

Eupatorium, & Eupatoria quoque dicitur. Regiam & hæc autoritatem habet, folijs plumo-
sis, modo caulis, flore candido, radice superuacua. Mauritani aliud Eupatorium demonstrant,
officinis penitus diuersum figura, sed effectū par, scapo exiguo, fere cubitali, folio Centauri mi-
noris, frutice odorato, sed flore magis, qui luteus ei est, radice superuacua. Passim nascitur.

B

Marcelli Vergilij Iudicium.

Fuerint quondam, & adhuc sunt, magnæ inter autores & medicos litis Eupatorium, & Ar-
gemone. Nec persuaderi adhuc possunt aliqui, non esse Argemonem Eupatorium: ex tam mul-
to tempore, tamque antiquæ fidei in medicina autoribus, ea multorum animis opinio infedit.
Licetque hic iam pridem in Anemone, & nunc in Eupatorio dixerit decipi plerisque, falsoque crede-
re Argemonem Eupatorium esse: non desinunt tamen quotidie pro ea re uiolenter aliqui cer-
tare. Verba eius in Anemone sunt, qualia poterunt uolentes cum liberis uidere: ea nunc etiam
repetita ab eo sunt. Nosque illorum memores, necessario locum in extremo hoc capite emenda-
uimus: & pro Artemisia, Argemonem uertimus. Quod enim hic ait, quosdam Artemisiam
hanc uocasse deceptos, alia enim est ut præmonstrauimus, in Artemisia non legitur, at in An-
emone manifeste id inuenitur. Sunt Dioscor. in Anemone uerba hæc. *ἡνιοὶ δὲ καὶ ἀνάρμονοι διορίσαν*
ἀπὸ τοῦ ἀγρίου ἀνιμώνος τὴν λεγομένην ἀργεμόνην, καὶ τὴν τοιαύτην μέλαινα. παρὶ ἧς ἐν ταῖς μέλαισιν ἰσχυρο-
ῖσιν διὰ τὴν ἀνθὸν ὁ μόχρεον φοινοῦν ὑπάρχον πλανῶνται τὴν ἀργεμόνην ὑπατόριον ὀνομάζοντες. &c.
Quorum sensus est, qui in Anemone redditus a nobis fuit: cui & hic responderet locus. Neque Ar-
temisiam, sed Argemonem falso inquit Diosco. credere quosdam Eupatorium esse. Neglexerūt
hoc alij interpretes, quod alioquin multifaciendum erat: ut quale uerū Eupatorium esset aliquan-
do cognosceretur. Vidimus nos in maioris ciuitatis nostræ Nosocomij hortis natam plantam,
quæ omnibus a Dioscor. traditis notis, ueram Eupatorium se ostenderet: præsertimque semine in
terram decliui, & postquam aruerat uestibus hgerente. Nihil in quotidiana multarū plantarū obserua-
tione certius antiquæ historiæ respondere aliqui mihi uisum est: furculosum genus, singularis
uirga, lignosa postquam aruit duricies, plumosa undique aspitata, color liuens magis quam niger, & folia
per interualla, sed contrarijs pediculis pendentia. Quod non penitus huic scriptori respondere
uidebatur: comparatio tantum erat, qua Cannabis, aut Quinquefolij folijs ea comparabatur.
Cætera naturæ & Dioscor. eadem omnia erant. Regiæ dignitatis herba Eupatorium etiam est,
ab Eupatore rege inuenta. Et quoniam iecori præcipue medeatur, quod græci ἥπαρ dicunt, ideo
Hepatorium, & Hepatitis ab aliquibus dicta.

C

Iudicium Nicolai L E O N I C E N I lib. de
Erroribus Medicorum.

Auicenna scribit, Eupatorium habere folia Cannabis, florem Nenufaris. Mesue idem Eupatorium folijs Centauræ minoris, floribus subcitris, longitudinis paucae constare. Serapio folijs Pentaphylli, aut Cannabis: florem autem non explicat. Fortunatum esse oporteat, qui diuinare uoluerit, quis nam ueriora retulerit: ac quod Medicus ille precabatur, qui medicinam forti commiserat, dii sua cuius remedia, quibus illa extraherent, secundarent, itidem a nobis orandum, ut bona fortuna in uerum incidamus autorem.

Hominis cuiusdam docti iudicium, L E O N I
C E N O respondens.

Nicolaus Leoniceus inter Medicos Italiae praestantissimus, libro de Erroribus Plinij & Auicennae, manifestissimum Medicorum Arabum, & omnium recentiorum in herba Eupatorio errorem monstrauit. Nam herba quam hodie Medici nostri Agrimoniam corrupte, pro Argemone, siue Argemonia uocant, eam uerum esse Eupatorium, ex Dioscor. descriptione facile probari potest, cum contra nemo, nisi iudicio penitus carens, Eupatorium esse, ostendere possit, quod pharmacopolae hodie sic uocant, quodque Auicenna, & Mesue describere. Nam pro Eupatorio, quidam uidentur herba Ambrosiana, uulgo dicta: alij uero quadam herba, quae iuxta aquas frequens reperitur: quarum nulla flores habet luteos, neque semen, quod cum maturuerit, uestibus inhaereat praetereuntium. Deinde nec ferratim interfecta folia, uelut Cannabis: quae omnia in Agrimoniam luce clarius uisunt. Quamquam autem Dioscorides Eupatorium quibusdam etiam uocari Hepaticum scribat, quasi ad hepar referendum sit, *ἡνepatίζον ἀπὸ τοῦ ὕδατος, ἡπαρ*, id est iecur, tamen ipsum ab inuentore Eupatore, quemadmodum Valerianam, Centauram, atque alias eiusmodi dictas potius putauerim. Quare quisquis est Mediorum, qui posthac Eupatorio uti uelit,

Agrimoniam
uerum Eupatorium.

Agrimoniam Eupatorii loco utatur confidenter. Quae autem sit Argemone, siue Artemon, ut Dioscorides uocat, non est meum definire. de prima enim specie apud Dioscoridem nihil adhuc certi possum statuisse. De altera uero opinor idem quod Leoniceus, esse eam, quam Argentariam recentiores, & Apium haemorrhoidarum uocant: a colore foliorum dicta fortasse Argemone, *ἀργυρέα*, id est, Argentea.

De S O L A N O,
RHAPSODIA .VIII.

A



B

Nomenclaturæ.

Græce, *σπύχνα*.

Latine, Solatrum. Solanus. Strychnos. Maurella,
uel Maurella a Macro. Vua lupina. Solaria. Vua
uulpis. Vua canina.

Germanice, *Kaschischant*.

Autorum placita de herba S O L A N O.

Dioscorides de quattuor generibus S O

L A N I lib. 2.

HOrtensium, seu urbanum Strychnon, Romani Solanum uocāt,
alijs Cacabulum, Aegyptij Allelo, Galli Scubulum, Aphri Astrismunim.
Frutex cibus idoneus, exilis, pusillus, multis concavus alis; folio nigro, ma-
iore quam Ocimi, & latiore; fructu rotundo, uiridi, qui post maturitatem
nigricat, aut fuluescit. Herba innocentis gustus. Natura ei refrigerandi.

C Est & aliud Solanum, quod peculiari nomine Halicacabon, id est, Vesficariam, aut Phyalida uocant; folijs antedicto latioribus. Cuius caules posteaquam adoleuerunt, humi prosternuntur, folliculis orbiculatis, fuluo intus acino, uesiculis simili, rotundo, læui. Quo coronarij utuntur, & corollas faciunt.

Solanum somniferum e Græcis aliqui Dircion appellant, alij Strychnon, alij Manicon, alij Dorycnion, alij Calliada, Romani Apollinarem minorem, alij Vlticanam herbam, aut Oplaginem, Daci Cicoliden, Pœni Cacabum. Fruticat multis ramis, densis, lignosis, fractu contumacibus pinguium foliorum, Cotonæq; mali similiū, plenis, flore grandi, rubro, fructu in folliculis crocato, radice longa, subrubro cortice uestita. Nasctur in faxis non procul a mari.

Strychnon, siue Solanū Manicon, aliqui Persion, alij Thryon appellare, alij Andron, alij Pentadryon, alij Enoron, quidam Orthogyon. Huic folium Erucae simile, maius aliquanto, satis ad spinam, quam Pedicula uocant, accedens. Caules a radice eximios emittit, decem, aut duodecim ulnerum altitudine adolentes, caput in cacumine Oliua maius, & latius, & ut Platani pillula, hirsutius. Florem nigrum. Postq; eo exuitur, racemus exit rotundus, niger, denis, aut duodenis acinis constans, similibus Hederæ corymbis, ut uuæ mollibus. Radice firmatur candida, crassa, caua, cubitali. Gignitur in montibus uento perflatis, maritimis foueis, & uagis.

D **Explanationes horum quatuor generum**
Solani, per HERMOLAVM
BARBARVM.

Strychnon, siue ut Galenus Trychnon, satium, quod & melan, hoc est, nigrum cognominant, a nostris Solanum dicitur, familiare cibis, in Aegypto maxime. Nihil mali corporibus esse predicit Xenocrates, cui hoc salutare non sit. Flos huic est candidus: acini, siue poma, potius herbacea, & quadamtenus aculeata, in quibus semen. Hoc Romæ uidimus in orto oratoris Galli.

Strychnon Halicacabon folijs Ocymi describitur a Plinio, commendatum quidem & hoc cibus ab aliquibus, licet hortense præferatur. Radicem Halicacabi bibunt, qui sunt uaticinandi callentes, qui furere ad confirmandam superstitionem aspici se uolunt. Aspidum naturæ in tantū aduersa hæc herba est, ut radice propius admota, soporentur.

Strychnon Hypnoticon, id est, soporiferum, ab alijs Morion, ab alijs Moly appellatum, coronarijs in Aegypto expetitur, inuitante similitudine florum Hederæ. Velocius hoc ad mortem, q; Opium. Inuenio & Strychnen, & Eubepaton, & Callion uocatam: nostri Vesficariam, a folliculis, uel quia uesicæ profit & calculis. Theodorus omnes Strychnos Vesficarias appellat. Radix huius sanguinis modo rubra Theophrasto candida, cum inarescit. Semen coccineū, folia mali Cotonæ, Lactucæ caprinæ: sed hirsuta, magno cespite, in rupibus sepulchretisq; nascitur. Genus hoc Dioscorides libro primo Alicacabum uocauit. Eademq; ad uerbum fere scripsit, quæ nunc in soporifero leguntur. Sed Alicacabus tamen uera est, quæ proximo capite superius descripta est, ut Galenus inquit. Laudant hoc a loco ad fruendum, & Tamarisco.

Strychnon Manicon, insaniosa herba: quæ & Doryon, siue potius Dorycnion uocabat: quæ cuspides in plijs eo tingerent, passim nascente. Alij Persion appellabant. foliū Erucae maiusculum, capite Gethyi maiore pilosioresque, ut Theophrastus scribit, qui hoc edant uideri sibi pulcherrimos affirmans. Hoc & coronarijs placebat. Erythron dicebāt, & Neurita qui nequiter occultabāt, ut inquit Plinius. Frutex est furculosus uerius q; herba, ut Plinius tradidit, folliculis magnis, latisq; acturbinatis, grandi intus acino: qui maturefcit Nouembri mense.

Eorundem dissertatio per M.

Vergilium.

Vesicarias in Theophrasti plantis Gaza Strychnos duas appellauit: sopores alteram, furores facientem alteram: quæ huic scriptori in quatuor eius generibus postremæ sunt. Videturque ex Plinio uolumine. 11. cap. 11. comune id nomen omnibus fecisse: cum tamen Plinius secundum eius genus tantum cognomento Halicacabum, Vesicariam uocer: causamque afferat, quod uesicæ & calculis prosit: in qua uis subscribentem sibi habet hunc scriptorem, qui *ὀψιπικρόν* ait Strychnon eum esse. Verum tamen dubitari facile potest, an alia nominis eius causa quondam fuerit, qualis in eo mox a nobis dicitur. Vesicarias, ut præmonstratum est, Strychnos omnes ille dixit. Celsus contra, ultimo secundi libri capite, cum numeraret quæ reprimunt simul & refrigerant, post multa his uerbis Solanum Strychnum uocauit. Siser, apium, Solanum, quam Strychnum Græci uocant: hanc intelligens, cui & a Dioscoride præcipua in refrigerando uis assignatur. Nosque latine rei antiquum autorem secuti, Solanum, non Vesicariam Strychnum hortenssem, siue satium diximus, quæ nigris folijs & in extrema maturitate nigro semine ab hoc & ab alijs describitur, pingui cultoque solo proueniens: cuius nostra ætate nullus in cibis usus est: & si hic hortense, satium, edendo esse & in cibo innocens dicat. Quibus consicere aliquis merito possit, fuisse quondam in sanitate aliquem eius usum. Solani huius. 9. de plantarum historia Theophrastus duo tantum facit genera, *ὑπνῶδης καὶ μινικῆς*, id est, quod soporem, & quod furorem gignit. Suntque de utroque multa ab eo dicta, quæ suis locis ex eius historia a nobis repetentur. Cæteri omnes, autore ut nos credimus Dioscoride, quatuor Strychnos deinceps numerauerunt, Satium, hortensemque hunc, & cibarium: quem omnes nigrum a colore fructus uocauerunt. Mox Halicacabum cognomento, quem priuatim nos Vesicariam a Plinio uocari credimus, rubente fructu, uæ acini figura, Tertium somnificum, quem fruticosum describit. Postremo infamiam facientem: diuersis in medicina etiam uiribus, quæ ab hoc scriptore statim patebunt. Obseruauimusque nos, ad refrigerandum plerumque usum Solani fuisse, & ex tam multis eius generibus Hortense ad eum usum maxime probasse antiquos. Cæteris enim maleficij periculum magis quam remedium inest. Facilis cognitu herba, nunquam deceptura incautos, si quas habent tor eius genera discretas folijs, fructu, coloreque notas diligentius obseruauerint. Vtut hortensis huius Solani succo Paulus Aegineta in primo ad refrigerandos in infantibus capitis ardores, quos Græci Syriasm uocauerunt.

Coronaria, quod hic, & Plinius testantur Vesicaria hæc quondam herba fuit. Damnarunt tamen ambo eius in cibis usum, nec ad coronas amasse ueteres aliud in ea uidentur, quam uesicæ, folliculosque illos qui per ambitum capitis ex coronis pendentes, grato spectaculo ruberent, turbinati, grandæque, & lsaici fistri, ex quo crepitacula pendeant, imaginem reddentes. Nascitur Vesicaria hæc multa in uineis, in Italia herba uerius quam frutex: pferatque Vesicæ illas Septembri mense colore primum uiridi, mox paulatim rubescere, turbinatas ut Plinius ait: semen Ciceris magnitudine intra se claudentes, rubro colore, nec nisi extremo Autumno maturescens: in nullo nostra ætate honore, aut usu. Vesicariæque nos credimus a uesicis his potius, quam quia prosit uesicæ. Et si Plinius id testetur dicta fuisse, *καὶ τῶν φαρμάκων*, etenim ex uesicis folliculisque his factum illi nomen est. Nec aliter herbam intuentibus uidebitur: tam similes animalium uesicis folliculi illi sunt.

¶ Serapion & Auicenna non alia, sed alijs uerbis eadem cum Dioscoride agunt, corruptis in æterim aliquot uocabulis. Ex Neothericis nemo rectius Hieronymo herbario uidetur de ea disseruisse. Cuius hæc fere sunt uerba.

Solanum trium generum habetur, quæ quidem notiora sunt. Primum mortiferum: cui uulgo nomen *Sollwurz*, suspicor esse Manicon, Dioscoridis speciem quartam. Secundum dictum Solanum rubrum, atque Germanis dicta, *Judenkirsen* oder *Schluten*. Tertium uulgatum, in omnibus opacis, & semitis obuiam, in quo hodie retinetur nomen Germanicum, *Nachtischen*.

Vires & iuuamenta quatuor generum SOLANI ex Dioscor.

Folia Solani hortensis ulceribus quæ serpunt, & ignibus sacris, conuenienter cum polline polentæ illinuntur. Aegilopia, capitisque dolores, trita & imposita sanant. Aestuanti stomacho auxiliantur. Parotidas, cum sale, detrita illitu discutiunt. Valet succus eius aduersus ignem sacrum, atque ulcera quæ serpunt, cum cerussa, rosaceo & argenti spuma, ad ægilopas cum pane, infantium adustioni, quam Syriasm uocant, cum rosaceo perfusus

C proffit. In collirijs, aquæ uel oui uicem exhibet, contra acutas fluxiones, suffufionesq;. Aurium dolori instillatus prodest. Mensium abundantia sistit, in uellere subditus. Succus fuluo gallinarum in domibus oberrantium fimo subactus, & linteo appositus, ægilopijs præstantaneo est remedio.

Vesicaria uim usumq; hortenſij Solani habet. Verum cibis nequaquã expetitur. Regium morbum purgat, semine poto. Et urinam pelli t. Ex utraq; herba succus extrahitur, qui siccatus in umbra reconditur, ad eadem ualens.

Radiciſ Solani ſomniferi cortex, in uino drachmæ pondere potus, ſomnificam uim habet, Opio mitiorem. Semen uehementer urinã cit. Corymbi duodecim, hydropicis dantur. Si quid numero adſciatur, alienationem mentis faciunt. Remedio est aqua copioſa muſſa, potui data. Succus paſtillis inferitur, & medicamentis quæ doloris leuamentum præbent. Decoctus in uino, ſi in ore contineatur, dentium doloribus auxiliatur. Radiciſ ſuccus, cum melle illitus, oculorum hebetudines tollit.

Radix Solani Manici drachmæ unius pondere pota ex uino, facit species uanas, imagineſq; non iniucundas obuerſari. Sed duplicatus hic modus, ad treis uſq; dies, mentis alienationem affert. Triplicatus, interimit. Remedio est aqua muſſa copioſius pota, & uomitione reiecta.

EX PLATEARIO.

D Solatrum, i. Morella, est frigida & ſicca in ſecundo gradu. Est autem diureticum aliquantulum. Valet contra opilationem Hepatis, & Splenis, & maxime contra Ictericam. Quando opilatur ſuperior porus Cistiſ ſellis, detur ſuccus in potu, uel ex ſucco eius, addito Zuccharo fiat ſyrupus. Vel quod melius est, dentur unc. ij. ſucci, cum quinq; ſcrupulis reubarbari. Contra apoſtema in Hepare, & in inteſtiniſ, & in ſtomacho, cum aqua hordei detur ſuccus eius. Quod Dioſcorides multum approbat. Contra caliditatem Hepatiſ penna intincta in ſucco eius, ſæpe ſuperponatur. Idem facito contra calidam podagram. Herba ipſa trita ſuperponatur: uel quod melius est, ſucco eius addatur acetum, uel agreſta, uel oleum roſarum. Contra calida apoſtemata in principio, ad repercuſſionem materiæ, herba ipſa trita ſuperponatur.

EX IO. VIGONIO.

Solatrum est frigidum & ſiccum in ſecundo, & ideo uirtutem habet ſtipſicandi, Auicenna natam dicit, uirtutem habere reſoluendi apoſtemata intrinſeca calida. Et ſuccus eius cum alijs rebus, ut infra dicitur, pruritu fracturarum medetur. Vnamquamq; ſimiliter complexionem calidam in ulceribus inductam remittendo, ulcetate particule magnopere opitulatur. Caleſtationibuſq; genitalium etiam ſubuenit.

EX Hippocrate, de ratione uictus.

Solanum in ſomnia prohibet.

EX HIERONYMO Herbario.

Solani aqua ſedat inflammata apoſtemata mammillarum.

Sudores elicit, mixta aquæ abſynthij.

Calidas anginas reprimat, ne ſtrangulent uelocius.

Plura apud Macrum de hac herba.

Pentaphyllon maius.



Gros Fünffing=
extraut.

¶ Herbæ hu=
ius descriptio /
nem uide prio=
re Tomo, folio
231. b. & seq.



Pentaphyllon minus.



Blein fünffingerkraut.

Genßblüm.



F R A G A R I A.



Erdbeerfrant.

C Fragariam Pentaphylli speciem, uide in prio-
re item Tomo, in descriptione Quinquefolij, fo-
lio, 231. & sequen. Rursus infra huius Tomi Ap-
pendice, quod planius Index eiusdem indicabit.



**De HYRVN
DINARIA,**
Teutonice
Schwalbenwurz.

MR H A P S O
D I A .IX.
V L T O M I N V S
adsequor, quæ HYRVNDI-
NARIA, latine, & uulgo
Schwalbenwurz uocatur, apud
doneos scriptores quæ nam sit;
quæ & ipsa præmorfa, decurtatq;
inferius radices trunco est, mul-
tis alijs tenuibus, albis, & graue-
olentibus radiculis adherentib.
admodum iniqua proportionē,
respondens herbæ quam germis-
nat, quæ tenuis prorsus uix cubi-
tum excedit, radice interim dua-
rum librarum pondo æquante:
qualem nuper unam & alteram
ipsum effodimus, in inculto q̃-
dam loco, nam ea potissimum
amat, non procul ab urbe no-
stra. Ad rupturas eius usum esse
empiricis audio; nec plura,

DE FRAGARIA.

RHAPSODIA .X.

Nomenclaturæ.

Græcicæ, *τριφυλλος* secundum Leonicenum.

Latinae, *Fragaria*. *Trifolium*.

Germanicæ, *Erdbeeraut*.

A

Herbæ huius
picturam ha-
bes supra fo-
lio prox. 35.

HERBA passim obuia, & in delicijs gulæ habita ueteribus, ut inquit Plinius. lib. 21. cap. 15. an Pentaphylli species sit quædam censenda, an potius Trifolium, satis superq; in dissertatione Pentaphylli demonstraui mus supra Tomo primo.

Ex IOANNE VIGONIO.

Fragaria est frigide complexionis: & succus eius cum uino granatorū, & modico aquæ rosacæ, apostematibus calidis, in principio & augmento opitulatur.

Ex HIERONYMO Herbario.

Fragariæ herbæ & succus & aqua destillata, medentur peripneumonia, tussi, lepræ, & morbo regio, si in ieiunio pota fuerit.

Eadem iniecta oculis ex rubore calentibus, mitigat calores.

Iuuamentum FRAGORVM.

Eadē Iuuamenta sunt & Fragorū, quorū aqua immodicos calores cohercet, Alcolam oris, ulcera, anginas, foetorem oris, & hepata incensa refrigerat.

Prouocat quoq; menstrua, & uulnera sordida purificat.

Oculorum collyrium est efficax, præsertim si nimio ex calore male habeant.

B

Herba Ropertī.



Storckenschnabel.

D

¶ Nomenclaturæ.

Græce, *ῥοδίων*.

Latinae, Geranion, Rostrum Ciconiæ, Herba Roberti, Robertiana, Gratia dei.

Germanicæ, Storkenschnabel. Gottsgnade.

HANC SIC INSCRIBI EX HERM. BARBA

rum Corollaris nuper obseruauimus, cuius in Geranio secundo, hæc sunt uerba. Geranion secundum medicis inutile, aliter a græcis, aliter a latinis describitur. Dioscorides & omnino Græci, folijs paulo candidioribus quam Maluæ, ramosum ex interuallis. Hanc ego aut eandem, aut omnino similem esse uideo cum ea, quam Gallia transalpina uulneribus & fistulis in potum commendant, & herbam Robertianam cognominant, coliculis rubentibus, flore paruo, subpurpureoq; ac cæteris notis omnibus quæ hoc loco a Diosc. Geranio reddunt, etiam si ab eo medicinæ aliena existimet. Quid enim prohibet, ignoratas eius uires olim fuisse? Hactenus Barbarus.

Nostrium uulgus Herbariorum uocat Gratiam Dei, & Rostrum Ciconiæ: partim ab similitudine & figura transumpto nomine, partim ab insigni eius effectu. Est autem quatuor generum, ut ab illis quidem accipio, & ipse quoq; oculis uidi. Primum quod ab Dioscoride alterum Geranion inscribit, caulibus minutis, & pilosis, sesquipedalibus, folijs Maluæ, floribus in gruum rostra desinentibus. Alterum genus quod in umbrosis, & nullibi non subpurpureo flore, odore graueolentum, caliculo et flore petroselinii, sed hirtis, rostroq; Ciconiæ similibus prouenit. Tertium quod in rectis, ruinosis, parietinisq; & circa mortuorum sepulchra sua sponte feritur, in uniuersum rubentibus caliculis, & excepto rubore a priori nihil diuersum. Quartum, minusculum, & humi repens, sed rostro prioribus per omnia simile. Appellabimus itaq; Robertianā, & rostrum Ciconiæ, uel ex Dioscoride Geranion, donec certiora alius quispiam attulerit. Certe qui Appendicis autor est, posterioris editionis Pandectarum, tametsi in operis sui præfatione, etiam attentum reddat lectorem, scilicet sese perscripturum de herbis, quæ Pandectararius aut nō attigerit, aut apud Medicos pro ignotis celebrentur, tamen in Robertiana pulchre hallucinatus uidetur. Verba eius adscripsi.

De herba Roberti. Quia apud famosos autores, in eorum receptis, hæc herba sæpe scripta reperit, & pauci aromatarij eam cognoscunt, multum laboraui, ut eam cognoscerem. Sed tandem repperi eam in Nicolao Florentino in sermone septimo. cap. 65. ubi nominat herbam Roberti, quæ est muscata maior. Et Matthæus de pedemontio pariter dixit mihi, quod herba Roberti est Basilicō maius, id est, illud quod habet folia ualde lata: et quod Basilicon, & herba muscata, sunt unum & idem. Et opinio sua mihi placet: ex quo cum Nicolao se concordat. Licet quidam Aromatarius papienfis amicus meus aliter sentiat: qui uult, quod sit quædam herba habens folia sicut pes columbrinus, & albiora ab una parte, id est, a parte demissa, quæ est uersus terram: a parte uero superiore sunt uiridia, sicut folia pedis colubini, & est in altitudine ad similitudinem illius.

EX HERM. BARBARO.

Nostri ut inquit Plinius, Geranion ostendunt Cicutæ folijs minutioribus, & caule breuius, rotundo, saporis & odoris iocundi. Verū hæc proprie Geranion nō est, sed Myrrhis: de qua post agemus: confusione orta, quod Geranion a quibusdam Myrrhis etiam dicatur, unde natum & illud sit, ut Geranion in latino Cicutaria nomen habeat: cum alioqui Cicutaria proprie Myrrhis esse uideat.

Quatuor genera Robertianæ.

E X M. V E R G. C O M M.

Geranion hæc est, in qua Gruini capitis imaginem in summo eius plantę capitulo contem-
plati Græci, nulla similitudine aptius rem indicare potuerunt. Vidimus nos alteram Geranion
paucis statim a radice prodeuntibus Maluę folijs, ut hic describit. Tum nudo surgente caule,
dimidij cubiti altitudine: crassoq; in caulis illius cacumine, folioso inuolucro tumentē, ex quo
per longitudinem ex altero latere dimidiati digiti longitudine acutus procedebat apex. Erantq;
in folliculo illo cum uiridi colores alij plures, præsertimq; cinereus: tam præsentī tōtius colli, ca-
pitūsq; & rostri Gruini imagine, ut aptiore pictura ostendi a peritissimo pictore animalis eius to-
ta ea pars non potuisset. Alteram, quæ Cicutæ folijs est, ipsi non uidimus. Obseruauimus tam-
en in antiquis scriptoribus, Plinioque præsertim, utriusq; huius herbæ misceri historiā. Nec sa-
tis cognosci in eo posse, Gruino ne collo & capite utraq; sit, an altera tantum. Id certe ex Diosco-
ride collegisse facile est, Cicutæ folijs alteram earum esse: ideoq; Cicutariam dici, & Myrrhida:
quonia & Myrrhis Cicutæ folio sit: quemadmodū hic quartū uolumine docebit. Cur aut pri-
orem Romani Echinasrum dixerint, non satis pro comperto nobis est. Quemadmodum in al-
tera per se patent Cicutaria & Gruina ex foliorum & Gruini capituli forma factę appellationes.
Longissime de utraq; Plinius uolumine. 26. capite. 12. agit. Poteruntq; in eo uolentes uidere, quā
nos paulo ante diximus, utriusq; Geranij historia uarietatem.

P. A E G I N E T A.

Geranion unum quidem folia Ane-
monę similia habet, & radicem esui ido-
neam. Hęc drachmę pondere in uino po-
ta, muliebrum locorum inflationes sol-
uit. Alterum nullum habet in medicina
usum.

Scheyffstraunt.



Herba hæc lincis tantum B
adūbrata, oblata no-
bis est, nec aliud quoq; nomen
succurrebat, typographo mihi
offerenti: cum alioqui multæ
sint eius generis in Germanico
herbarum nomenclaturæ quæ
aluum cient. Ut numerum er-
go adimpleret, & locum farci-
ret, adponere placuit, donec de
alijs eius nominibus certiores
fieremus.

Scolopendrium.



Ergzung.

¶ De S C O L O P E N D R I O ,
R H A P S O D I A . XII .

A

¶ Nomenclaturæ.

Græce, *καπλίνιον*.

Latine, Scolopendrium.

Germanice, *Wirtzung*.

IN E X E G E S I nostra, quam Operi a tergo adiecimus, tres de-
scriptiones Dioscoridis respondere Scolopendrio diximus: atq; ita eorū
habebant ueteres quidā Commentarij quos habemus, scilicet Phyllitum,
Asplenion, & Hemionitidem. Verū utra propius respondeat nostrę Sco-
lopendrio, apud Dioscoridem uidere licebit: locus est lib. 3. Nobis incli-
nat animus, Asplenion uocari apud Dioscoridē uel Hemionitidē. Non
temere enim suspicari possumus, uel unam etiam & eandem herbā esse,
id quod & Marcel. quoq; Vergilius affirmat. Quamq; de Phyllitide ali-
quid prælagit animus, habet enim & hæc folia uiridia, fena, aut septena,
quæ parte anteriore leuia cernuntur, a tergo autem pensiles quasi uermi-
culos ostendunt. In umbrosis quoq; & opacis hortorū ambulatio-
nibus emicat, gustu acerbo, & neq; caulem, neq; semen pro-
fert. quę omnia licet & de Asplenio, & Hemionitide ue-
re dicantur, tamen quod in Phyllitide de pensili-
bus quasi a dorso hęrentibus uermiculis af-
fertur, cum nostra plane Scolopen-
drio conuenit. Similiter seru-
pum nobis iniicit, quod a-
pud Galenum
quoq; & Paulum, diuersa illarum capita, tum ius-
uamenta legimus. Quare contenti, loca tan-
tum & nomina indicasse, ad Dioscor.
Pliniū, & reliquos scriptores remit-
timus, & suū cuiq; iudi-
cium deferimus.

B

Garyophyllata.



Benedicitenwurz.

¶ Garyophyllata, Benedicten frant.


GARYOPHYLLATA, ut inquit Ianuensis, est planta similis Agrimonie, cuius radix odorem habet Garyophyllorum. Dicta a quibusdam Sanamunda, & Pes leporis. Quamquam alia est Pes leporis. Et rursus, Pes leporis apud quosdam uocatur Garyophyllata, & Sanamunda. In qua sententia uideo esse et Hermolaum Barbarum, qui de utraque in Corollario Lagopi, id est, leporini Pedis, sic inquit. Lagopus, quasi Pes leporis. Sane & similis ei est aspectu. Proinde haud probarim eorum sententiam, qui Garyophyllatam dictam uulgo rentur in opacis montanis gigni solitam, non in segetibus, ut Lagopus.

Calida est, & sicca herba, ut existimat Albertus, in secundo ordine: proinde uires habet consumendi, dissoluendi, & confortandi.

Ad uulnera, & fistulas pectoris persanandas mirum in modum presidio est.

Herwurz.

B



¶ Radix passim prostrans rhizotomis, sed mihi plane ignota. Attingit nonnihil de ea Hieronymus Tragus, quemadmodum infra in Annotationibus eius leges folio. 161. a. Herba est magnis ut Lappago folijs.

C

De LILIORVM diuersis generibus,

RHAPSODIA .XIII.

Nomenclaturæ.

Græce, *κρίνον*.Latine, *Lilium*.Teutonice, *Gilgen*.EX HERMOLAI BARBARI
COROLLARIO.

LILIVM GRÆCI CRINON, SED FRV-
ticem eius Crinoniam, quasi Liliarium, ut uiolarium, & rosarium appellant. nam Lilileta, rose-
ta, uioletaq; aliud sunt, ut constat. Lilium e lunonis lacte natum, Græci perhibent, resperfa ter-
ra, dum Hercule dormienti uberibus admoto, mox post suctum digresso, late finxit. Ob id Li-
lium a nostris Iunonia rosa dictum uideri potest. Philinus a quibusdam Ion uocari quod sit Li-
lium existimat. Ambrosiam Corinthi Nicander, & Aphrodites Charma, hoc est, quasi Vene-
ris uolupiam cognominari a quibusdam cecinit. In Co insula, ex Alexandri statua enatam in ca-
pite Ambrosiam, Carystius, quæ nihil aliud sit quam Lilium, memoriæ proditum reliquit. Nas-
citur e lachryma sua Lilium, inarescente cum defluxit, uelut Olusarum. Lilij quadruplex gen-
us in Theophrasto. Primi, flos Vere cum Viola sæpe alba, pauloue postea erumpit. Hoc ab eo
proprie Crinon, hoc est, Lilium uocatur. Alterum genus Lirium appellat, uere quidem omni-
no florens, uerum serius cum Narcisso. Forteq; hoc sit quod a Plinio Lilium trans maria nun-
cupatum est. Tertium ætate floret, & Cerinthum priuatim uocari puto: quamquam & alias res
Cerinthus significat: ut inferius liquebit. Quartum genus, quod item Lirium Græci nominant,
Autumno floret: emicatq; primis hyemibus. Est & rubens Liliū, differens (ut arbitror) a pur-
pureo, uisum a nobis Patavij in Felicis orto. Probatissimum in Antiochia, & Laodicea Syria:
mox Phaselide: quartum locum obtinente quod in Italia nascitur. Hoc genus proprie Crinon
a Græcis uocari, & florem eius Cynorhodon, autor est Plinius. Hoc & Hippocrates accepit,
cum rubentia Cynorhoda feminarum purgationibus cōmendat in uino. Lilia purpurea & ar-
te fiunt, maceratis in facie uini scapis antequam serantur mense Martio, & in scrobe circumfusi
eadem fæce: in quem usum scapos arefcentes colligunt Iulio mense, Lilia in fumo suspendentes.
Caule gemino Purpurea uisuntur aliquando, carnosiore tantum radice, maiorisq; bulbi, calix
herbaceus. Post æsturum & æquinoctium autumnij florent Purpurea: quorum genus unum
uocant Narcissum: cui uidelicet in radice sunt folia. Calices, ut diximus herbacei, cætera eadem
quæ candidis. Albo nihil est fecundius, una radice quinquagenos sæpe nutriendos bulbos. Li-
lium Rosæ nobilitate proximum. Ideoq; Iunonis rosa dicitur. Nulli florum proceritas maior, in-
terim cubitorum trium: languido semper collo, & oneri suo impar: candor eximius, folijs
foris striatis, & ab angustijs in latitudinem paulatim se laxantibus, calathi effigie, resupinis per
ambitum labris, tenuiq; filo & semine stantibus in medio croceis. Ita odor, colorque duplexq;
alius calicis, alius staminis. Differentia angusta. Raro duplex caulis in Lilio. Singulis caulibus
Lilia modo singula, modo plura sustinentur: quod & rarius est. Panditis, uel detractum paren-
ti, etiam si tristius & exilius. Lilio simile in Aegypti palustribus gignitur, sed folijs copiosis, co-
lore admodum uirentibus dispositis, & quasi uno uersu cōditis, ad mulieris profluvia, & fracturas
medicis questū Crinthus, de qua scribere distulimus, & Rhithacæ, siue ut Aristoteles, Crithacæ
significat: quæ & Sādaraca appellat, & a Dioscoride Cerāchemos, libro q̄nto, ex arborū succo,
gummi mō genita & uerno rore. Vnde Vernigini quoq; uulgo nomen. De hac & in Propole nō
nihil diximus, africi flatu minor austri, nigrior, aquilonibus melior, & rubens. Plurimū in Græ-
cis nucibus, apū cibo apissima dū operantur: q̄ sæpe inuenitur in fauorum inanitatibus seposi-
tus, amari saporis, & humore plenus, Menecrates, sed nemo præter eum, ut inq̄t Plinius, autor
est, Erithacem, aut Cerinthum florem esse futuræ mellationis indicium. Est & Cerinthe quæ uo-
catur herba propter apes ferenda, folio candido, incuruo, cubitalis, capite concauo,
mellis succum habente: cuius gramen Virgilius esse dixit ignobile. Quæ nomi-
num uicinitas, fortasse Menecratem fefellit. Nam & Aristoteles Ce-
rinthi florem ad hunc usum citat in libro de animalibus: quan-
q̄ in eo non Cerinthus, sed mendose scribitur,
calynthrus.

Alia differētia LILIORVM ex THEO

PHRASTO lib.6.cap.6.

Lilia omnia differentia inter se distant. Vnicaulia in uniuersum fere asurgunt, bicaulia raro. Quod coeli, terręq; rationi fortasse attribuendum est. Singulis caulibus, alias unum Lilium, alias plura exeunt: pars enim postrema effundit, sed hæc rariora. Radice copiosa, carnosa, orbiculata adhæret. Fructus detractus germinat, et Lilium reddit. Verum minus facit, & lachryma cæcum quoddam confluuium, quod etiam serunt, ut dictum est.

Plura ad hanc rē in priori Tomo cap. de Narcisso martio, quę poterunt uolentes consulerē.

PLINIVS de differentiis & generibus, &

nobilitate Liliorum, lib.21. cap.5.

Lilium rosę nobilitate proximum est, & quidem cognatione unguentū, oleiq; quod lirinon appellatur. Et impositum etiam maxime rosas decet, medio prouenit earum incipiens. Nec ullis florum excellentias maior. Interdum cubitorum trium, languido semper collo, & non sufficiente capitis oneri. Candor eius eximius, folijs foris striatis, & ab angustijs in latitudinem paulatim sese laxantibus effigie calathi, resupinis per ambitum labris, tenuiq; filo & semine stantibus in medio crocis. Ita odor colorq; duplex, ut alius calycis, alius staminis, differētia angusta. In unguenti uero oleiq; usu, folia non spernuntur. Est flos non dissimilis illi in herba quam Conuoluolum uocāt, nascens per fruteta, nullo odore, nec crocis intus candorem tantum referens, ac ueluti rudimentum naturę lilia facere considentis. Alba lilia iisdem omnibus modis seruntur, quibus rosa. Et hoc amplius lachryma sua, ut hipposelinum, nihilq; est fecundius, una radice quinquagenos sæpe emittente bulbos. Est & rubens lilium, quod Græci crinon uocant. Alij florem eius cynorhodon. Laudatissimum in Antiochia & Laodicea Syrię, mox in Phaselide. Quartum locum obtinet in Italia nascens. Sunt & purpurea lilia, aliquando gemino caule, carnosiore tantum radice, maiorisq; bulbi, sed unius: Narcissum uocant. Huius alterum genus flore candido, calyce purpureo. Differentia a lilijs est & hæc, narcissis folia in radice sunt, probatissimis in Licie montibus. Tertio generi cætera eadem. Calyx herbaceus. Omnes serotini. Post arcturum enim florent, aut per æquinoctium autumnū. Inuenta est in his & ratio inferendi, monstrificis hominū ingenijs. Colligunt namq; mense Iulio scapi arescentes, liliacq; suspendunt in fumo. Dein nudantibus se nodulis, in facie nigri uini, uel gręci, mense Martio macerant, ut colorem accipiant, atq; ita in scrobiculis seruntur, heminis fecis circumfusus. Sic fiunt purpurea lilia: mirumq; ita tingi aliquid, ut nascatur infectum.

Rubens liliū.
B

Purpurea lilia.
Narcissus qd.

Vide ad hoc
Varronē de
rerustica. ca.
35. Et Palladiū
Februario mē
se.

LILII Temperamentum ex GALE

N O libro septimo Simplic.

Lilij flos temperaturam mistam obtinet, partim ex tenui, partim ex terrena substantia, ex qua utiq; habet, ut gustu sit amara, partim ex aqua, eaq; temperata. Itaq; etiam quod ex eo fitur oleum, citra morsum digerendi simulq; emolliendi facultatem obtinet. Vnde fit, ut uteri duriciebus sit apertissimum. Porro radix, foliaq; per se trita, desiccant, & abstergunt, & digerunt moderare. Proinde quoq; ambustis competunt. Siquidem hæc quoq; moderate desiccantem extergentemq; facultatem postulant. Radicem ergo tostam, ac deinde cum rosaceo contritam, ambustis, quoad obducatur cicatrix imponunt: quippe cum aliqui & aliorum ulcerum omnium bonum sit inducendę cicatrici remedium. Quin etiam, uteros mollit, mensesq; prouocat. Folia uero præcoquentes, & ipsa ad obducendam usq; cicatricem imponunt, non in ambustionibus dumtaxat, sed alijs quoq; uulneribus. Sed & sunt qui aceto ea condientes, ad uulnera suo tempore utantur. Plus tamen inest abstergentis facultatis in radice quam in folijs, quamquam tamen nec in ea ipsa multum insunt, sicut prædiximus. Nam primi ordinis abstergentium est medicaminum. Itaq; cum aut uirilgines, aut psoam, aut lepram, aut achoras, aut aliquid id genus extergere uolumus, commiscemus illi aliquid aliorum medicaminum ualidius extergentium, cuiusmodi est mel. Cæterum si id moderate illi ac conuenienter admisceatur, & ad neruorum diuisiones competit, & ad alia uniuersa quę ualenter exiccati postulant absq; morfu. Imposuimus uero etiam quandoq; & foliorum succum cum aceto, & melle coctum. Quumq; paribus succi plus utroq; erat, eratq; insigne medicamen ad omnia ea quę exiccati postulant, absq; morfu ceu uulnera omnium ingentia, & maxime quę in capitibus musculorū eueniunt;

Cum ea quæ nimis mollia sunt & diuturna, atque ægre ad cicatricem perducuntur. Sed hæc iam ad medicamentorum componendorum insitutum attinent, a quo quantum licet abstinere in præsentiarum adnitor. Cæterum rerum ipsarum natura sæpenumero ut attingam adigit, celeriter uero relinquenda sunt, atq; ad propositum reuertendum.

V I R E S & I V V A M E N T A

ex Dioscor. lib. 3.

Lilia coronamenti se dedunt, Liria a quibusdā uocata. E quibus unguentum temperatur, quod aliqui Lirinum, alij Sulinum appellant. Neruos, & priuatim uulnæ duricies emolliens.

Folia herbæ illita, contra serpentium ictus auxiliantur.

Feruefacta, ambustis proficiunt.

Aceto condita, uulneribus opitulantur.

Succus adiecto melle, aut aceto, in greo uase coquitur, conuenienti medicamento uetustati ulcerum, & ad recentia uulnera.

Inassata radix, & ex rosaceo trita igni, ambusta sanat.

Vuluam emollit.

Menses ciet.

Vlcera cicatrice obducit.

Cum melle detrita, neruis præcis, luxatisq; medetur.

Vitilignes, furfures, & lepras emendat.

Vlceraq; in capite manantia expurgat.

D Abstergit faciem, & erugat.

Teritur in aceto, cum Hyoscyami folijs, & farina tritici, mulcendis testium inflammationibus.

Semen potum, morsibus serpentium aduersatur.


Ignibus sacris semen, & folia cum uino illinuntur.

Tradunt & rubra esse Lilia. In Syria autem & Pisidia Pamphiliæ, efficacissima unguentis nascuntur.

EX A P V L E I O.

Ad percussum serpentis, herbæ Lilij bulbum conterito, & in potu dabis ipsum etiam bulbum tritum, morsui apponas, sanabitur.

Ad luxum. Herbæ Lilij folia, tusa & imposita efficaciter sanant: & si tumor fuerit, sedat.



Acorus.

Gelwasser Gilgen,

¶ Acoro flores aureos, croceosq; attribuunt, Iridi coelestes: & uocatur
Græce χρυσόκρονον.
 Latine, herba Venerea, uel radix Nautica, & Gladiol⁹.
 Germanice, Goldgilgen/Trachenwurtzel.

¶ A C O R I descriptio ex Dioscor.
 libro Primo.

A C O R V S folia Iridis habet, angustiora tamē. Radices non dis-
 similes, complicatas, nō in rectum, sed obliquum tendentes, & summo ces-
 pite sparsas, geniculis interceptas, albicantes, gustu acres, odore non in-
 gratas. Optimum est densum, candidum, plenum, non exesum, odoratū:
 cuiusmodi Colchidicum, & Galaticum; quod Aspletion dicunt.

A C O R V M Plinianum lib. 25. cap. 13.

Acorus Iridis folia habet, angustiora tamen & longiore pediculo, ra-
 dices nigras, minusq; uenenosas, cætero & has similes Iridis, gustu acres,
 odore nō ingratas, ructu faciles. Optimæ Ponticæ, dein Galaticæ, mox
 Creticæ. Sed primę in Colchide iuxta Phasin amnē, & ubicunq; in aquo-
 sis. Recentibus uirus maius quam uetustis. Creticę candidiores Ponticis.
 Siccantur utribus in umbra digitalibus frustis. Nec nō inueniuntur qui
 Oxymyrsinæ radicem Acoron uocāt: ideoq; quidam hanc Acoron agri-
 on uocare malunt. Vis ei ad calfaciendū extenuandūq; efficax, contra
 suffusiones & caligines oculorū succo eiusdem poro, contraq; serpentes.

D De Temperamento A C O R I ex Gal. lib. 6.

Acorum. Huius utimur radice, quę gustu acri est, & modice amaro, odoreq; non iniucun-
 do. Itaq; facultatis calidæ est, & consistentiæ tenuis. Huic consentaneum est, ut urinam moueat,
 & lienes induratos iuuert: tum Ceratoidis crassiciem detergeat, simul atq; extenuet, sed ad hoc
 melior est ipsius succus. O naino uero siccificum esse clarū est. Et sane ordinis esto tertij in uro-
 q; in calfaciendo scilicet, & desiccando.

V I R E S & Iuuamenta ex Dioscoride.

Radici uis calfactoria.

Decoctum potu urinam cit.

Prodest lateris doloribus, & iocineris, atq; pectoris.

Item torminibus, uulsis, ruptis. Lienem absumit.

Vrinæ stillicidio, & serpentum ictibus auxiliatur.

Ad muliebres infessus Iridis modo utiliter imponitur.

Oculorum caligines succo discutit.

Antidotis radix magno usu commiscetur.

E X A P V L E I O.

Ne apes examinent & diffugiant, herbam Venereā in uase apum sus-
 pensam habeto, & nunquam seducentur. Hęc herba raro inuenitur; nec
 eam scire quis poterit, nisi cum flosculum emiserit.

Ad dysenteriam & stranguriam, herbæ Venereę radicem ex aqua de
 coctam ad tertias dabis bibere per triduum, mirifice urinam deducet.

Fortasse aliā
 existimauit
 Acorum quā
 hodie habet
 in omnibus
 palustribus &
 pratis. Nam
 illa non raro
 inuenta est.

De APIIS, & PETROSELINO,
RHAPSODIA .XIII.

AP I I genera apud Dioscor. sunt Eleoselinon, Oreoselinon, Petroselinon, Olusatrum, & Smyrniun: quæ omnia quid reipsa sint, apud Dioscor. uidere te malim: proinde & locum indico, qui est apud eundem lib. 3. cap. 76. Ruellianæ editionis. Nam quædam in hīs etiam parum cōperta nobis sunt, & dissimulare maluimus quod nescimus, quā impudenter nostram ignorantiam prostituere. Quamquam si Pandectario credimus, tot erunt illius species quot uulgati Apīj, & floris et caulīū similitudines. Nam illi etiam Cerifoliū, et Nasturcium, ex Apiorū genere sunt.

Plin. lib. 20.
cap. 11. lib. 19
17. 7. & s. The
ophrast. li. 8.

¶ De errore Medicorum in Apīs, & Petroselino, uide infra Annotationem Nicolai Leonici, & huic respondentem Pandulphi Collinutij alteram non minus eruditam, Item Ioannis Mainardi unam & alteram super eadem re.

De SELINI Temperamento ex Gal. lib. 9.

Selinon. i. Apium usq̃adeo calidum est, ut et urinam & menses ciat. Flatus quoq̃ discutit, & magis quoq̃ semen quam herba ipsa. Sed & Oreoselini, & Hipposelini similis uis est: uerum Hipposelinon imbecillius est, Oreoselinon ualentius.

Ex eodem, lib. Alimentorum. 2.

Apium, Equapium, Sium, Smyrnium, quod Romani Olusatrum uocant, omnia hæc urinae ciendæ potestatem habent. Apium inter cætera familiarissimum est, & ori, stomachoq̃ gratissimum, Equapium, et Sium insuauiora. Nam Smyrnium insuauitate caret. Ideoq̃ Romę plurimum uenditur, acrius, longeq̃ calidius quam Apium. Quin & aliquam odoris uim habet. Quapropter & Apio, Sioq̃ efficacius urinā mouet. Ad hæc mulieribus menses prouocat. Veris tempore caulē producit, qui crudus edendo est, haud aliter quam folia, quæ sola per hyemē, circa caulem retinet, sicut & Apium. Tandem uero caule accedente, tota planta iucundior redditur, siue cruda, siue cocta edatur, siue ex oleo & garo, siue uinum, siue acetum libeat adijcere. Nonnulli cum aceto & garo tantum edunt, ueluti Apium: alij paululum affundunt olei, Sium & Equapium nō nisi cocta sumuntur. Vtrumq̃ enim insuauē, si crudum edatur, appareret. Sunt uero etiam qui Apium, Smyrniumq̃ Lactucæ iungentes folijs, ita esitent. Etenim cum Lactuca insipida, & fatua quædam res sit, præterea frigidi succi, gratius, commodiusq̃ cum acrium aliquo sumitur. Hac ergo de causa, quidam etiam Erucae, Porriq̃ folia ipsi admiscunt. Sunt qui & Ocymī. Quod porro nos Smyrniū, Romę nunc passim ab omnibus, nō hoc nomine, sed Olusatru appellat. Et fortasse quispiam omnino ne numerandū quidem inter alimenta ipsum censeat uti, nec Sium, nec Equapium: cum sint huiusmodi omnium ciborū obsonia duntaxat: quæ admodum & cepa, et allium, & porrū, & ampeloprasum, & simpliciter omnia acria. Ad hoc genus pertinent Ruta, Hyssopum, Origanum, Fœniculum, Coriandrum, de quibus in commentarijs obsonatorijs tractatur, qui ad medicos quodammodo et cocos cōmuniter quidē illi spectant: proprius tamen utriq̃ finis est, ac propositū. Siquidē nos ut profint cibi in primis, non ut delecent curamus: & uoluptatem si quando quærimus, utilitati eam cogimus seruire. Nam in nonnullis magnum ad cruditatem momentum affert edendi insuauitas. Ideoq̃ modice talia condire satius fuerit. Cocorum uero laucias, atq̃ cupedias prauis apparatibus instructas, ut uulgo passim utuntur, cruditas magis quam laudabilis concoctio excipere consueuit.

Ex Paulo AEGINETA lib. 7.

Selinon intantum calefacit, ut & urinam moueat, & menses. Quin & flatus quoq̃ discutit maxime uero semen.

Vires eius & Iuuamenta ex Dioscor. lib. 3.

Satiuum Apium ad eadem quæ Corianum conuenit. Inflammationibus oculorum cum pane, aut polenta illinitur. Aestuantem stomachum mulcet. Mammarū duriciam reprimi. Vrinam ciet, siue crudum, siue co-

Citum edatur, Decoctum eius, radicisq; potu, uenenorū noxæ resistit; quū uomitiones excitet.

Aluum cohibet.

Semen uehementius urinam pellit.

Contra serpentium uenena, aut epotam argenti spumam, auxiliatur.

Inflationes discutit.

Ammiscetur medicamentis quæ dolorum leuamēta præstant, Theriacis quoq; ac tussis remedijs.

☞ De Petroselino, & quomodo Petroselinon nostrum sit
 Apium uulgare, uide infra in Commentarijs lo.
 Mainardi, & Collinurj, & fol. 21. b.

V De IACEA nigra, uel Morfu Diabolici, teut. 266. ff.

A L E R I A N A E herbæ in radice similis est quæ Morfus diabolici ab Herbarijs uocatur, cætera tamen dissimilia: an eius quoddam genus sit, siue aliud quiddam, ex probatis scriptoribus affirmare non ualeo,

necq; quibus alijs nomenclaturis appelletur: nisi quod in Barbarorum commentarijs lego, Morsum diaboli dictum, eo quod præmorsam inferne radicem gerit, quam a cacodæmone fabulantur, extemplo ubi nasci cœperit, uel fodi, præcerpi: ne in usum ueniat uitæ humanæ.

Quod perinde uerum esse credo ut illud quod de fibris nis testibus nugantur, testes ab ipsis euelli, et ab se abijci, quum uenatu urgeantur, uidelicet ne hominibus remedio sint: qd tamē Dioscor. credi debere, dicit esse nouissimum. Cætera infra lege apud Hieronymum Herbarium.



¶ De GLADIOLo, quæ hodie celebratur in offi
cinis pro Spatula foetida, uulgo Schwertlin.

R H A P S O D I A . XIII.

¶ Ex DIOSCOR. LIB. . III.

Xiphion, aliqui Anaſtorion, alijs Phafganon, alijs Machæronion, alijs Arion uocant, Romani Gladiolum, quidam Genitalem. No men inde accepit, quod folium gladij præbeat ſpeciem. Iridi ſimile erat, niſi minus & anguſtius uideretur, & gladij modo mucronatum, neruo ſumq;. In caulem exit cubitalem, in quo purpurei flores, in ordinem dige ſti, inter ſe diſtant. Rotundo ſemine, radicibus geminis, una bulborum modo ſuper alteram inſidente. Quarum inferior gracilis eſt, ſuperna ube rior. Naſcitur in aruiſ. Pars ſuperior radicis cum thure illita, admiſto ui no, ſpicula & aculeos e corpore extrahit. Panoſ cum lolij farina & hydro melite diſcutit. Qua de re huiuſmodi emplaſtris inferi ſolet. Menſes impo ſita trahit. Superiori radice ex uino pota, Venerem ſtimulari, & inferiore ſumpta ſterileſcere tradunt. Superiorem quoq; utiliter infantium enterò celis, cum aqua potui dari præcipiunt.

Vires & iuua
menta herbę.

EX BARBARI COROL.

Xiphion, a Theodoro dicitur Pugio. Floret uerè, cum Viola nigra. Falſo pleriq; arbitrant Xiphion eandem eſſe, quæ & Lonchitis. Sed illa in ſiccaneis, hæc in humidis naſcitur. Sunt & alia diſcrimina, quæ notari poſſint uolentibus. Haber hæc & radicem ad nucis auellanae ſimili tudinem ſimbriatam, quæ effodi ante meſſes oportet, & in umbra ſiccari. Videtur hæc & Phaf ganon, & Machæronion, hoc eſt, Enliſ uocari; radice, ut Theophrastus inquit, dulci, decocta, & cõmendata panificijs, ſi tria farinae admiſceatur. Vnde Machæronij paſtilli fortaſſe orũ habu ere, quos tertio Kalendas octobres uulguſ elitar. Item rotunda, & ſine cortice capillata fibris, ut Gethyum. Scolopendræ in herbã eam frequentes conueniunt. Eſt & compoſitionis cuiuſda in medicina uiridis nomen Machæron, ad morbos articulares, & Iſchiada. Habet & Xiphias piſ cis, quem Gladiolũ interpretantur, duo, ut inquit Ariſtoteles habes roſtra, ſed denubus carens.

B

Paſtilli Ma
chæronij.

EX M. VERG. COMM.

Hæc eſt Gladiolus illa, cultellaro folio herba, cui a principio ſtatim Iridis folia hic compa ruit; princeps in hoc foliorum genere, & quæ prima huiuſcemodi ſimilitudinis notam cæteris dederit: ideoq; tot gladiorum appellationibus diuerſis locis indicata. Florere hanc uere cum Oenanthe, nigra Viola, Helychryſo, Limonia, Anemone, & Hyacintho Theoph. ait. Vocatq; & ipſe Xiphion, Plinius multis locis Gladiolum: quo tũ loco ex pfeſſo de ea agit. 25. uolum. ca pite. 11. Xiphion, & Phafganon græcis nominibus eam appellat. Nec de folio eius aliud tradit, q̃ cum primum ex terra prodit gladij oſtendere ſpeciem. Hic ultra addidit, Iridi ſimile eſſe, bre uius tamẽ & anguſtius *καὶ ἀνέφωτον μακρότερον*. In quo uidendum eſt, an in mucronem deſinens di cendum ſit, an decurrat mucronis: quales cultelli aliquando in incendiis tũ uſum fabricantur. Vtrũq; enim *ἀνέφωτον* ſignificare ex diuerſa propoſitionis eius ui poteſt: & quod *ἀνέφωτον*. i. in acu tulum deſatum eſt, & cui ex acumine ſuo ablarum aliqd fuerit: ut *ἀνέφωτον* Thucydides ait, & in græ cis multa alia inueniuntur. Pro duabus deinde radicibus eius reuocanda legentibus in hunc lo cum erunt, quæ in Teſticultis duabus plantis ſuperiore uolumine dicta a nobis fuerunt. Nec ali ter in Gladiolo hac duas inueniri radices, q̃ in bulboliſ pleriq; alijs, in quibus præteriti aũ bul bus & radix inferior ſemper eſt: genitaq; ex ſe alia cedit ipſa, donec tertio, aut quarto anno tota pereat. Auellaniſ Plinius eas comparauit: hic naturæ notas magis ſecutus, bulbuloſ paruos uocauit. Diſcrepant in natalibus eius Dioſcorides & Plinius magnopere. Hic in aruiſ, ille in hu midis: alter in genere *ἀπορρυφίων*, quæ qualia ſunt ſuperiore libro dictum a nobis eſt, poſuit: alter in aquoſis & paluſtribus. Poteſt tamen uterq; quod uerũ ſit dixiſſe: nam poſſunt arua humida eſſe. Dioſc. præterea in aruiſ maxime naſci dicẽs, nõ negauit penitus poſſe etiã in aquoſis naſci.

E 2




De HERBA
Fullonum.


Rhaphodia .XV.

Magdelgeer.
Breüswurz.

AB vulgarib. herbarijs inscribitur herba Fullonū, uel herba Saponaria, ea uidelicet, quę in prophetis nominatur herba Borith. Alijs aut Isatis, aut quędam eius species iudicatur. Quamquam neutrum horum mihi probatur. Verum in Synonymis de hac plura. Neque enim in animo est, scrupulosis omnia hic persequi.

Synnauo/oder vna
 serfawē Nantel.
 Herba uulne
 raria, cui no
 mē fecit Pedē
 leonis, & Leō
 topodion Hie
 ronym⁹ herba
 rius. Verū Di
 oscor. descri
 ptioni non re
 sponder.






Braun
Fleischblum.

Weyßs fleyschblüm.



¶ Huic florī nomen indiū a graphgo
accepimus cū pingeret, nec plura
rimari licuit, herba alioqui
passim crescens, in
pratīs præcipue,
uulgo nota.

E 2



Sancti Jacobi blām.

Latīnum nomen nos
fugit.


Experientia tamen id
didicimus, fistulas cura-
re, & ne ultra serpant pro-
hibere, tunsa & imposita.

Vulneribus item miris-
sime medetur, & ad quæq;
interanea prodest.



Negelblum
lin.

Dendernegelin.



Hos flores, sunt qui Garyophyllum esse contendunt: sed falso, meo iudicio. Existimamus autem genus esse Keiri, uel Violarum altilium, ut Barbarus uocat. Nec ullum eorum effectuum comper tum habeo, præterquam quod in coronas adduntur, & in hortorum delicijs habentur, odoriferi. Cæterum de Garyophyllis, et quod sint reuera Garyophylli, infraquire ex annotationibus Schæleri, & Hieronymi Tragi: & in tertio Tomo cum libello nostro Synonymorum nonnihil de hijs agemus

¶ De Rosmarino, dicta Libanotis grece,
Germanice, Rosmarin.

A

R H A P S O D I A. .XVII.

LIBANOTIDIS tametsi quatuor genera distinxerunt Gale-
nus et Paulus Aegineta, tamen quarta hodie tantummodo nota herbarijs
est, uidelicet coronaria: de qua hæc est apud Dioscoridē descriptio lib. 3.

Rosmarinum, quo Coronarij utunt, ramos mittit tenues, & circa eos
folia minuta, densa, longa, exilia, subter incaua, superne uirentia, graui o-
dore. Excalfactoria ui præditum est. Regium sanat morbum, si decoctum
in aqua, ante exercitationes bibatur: & ubi laborans exercitationi se credi-
derit, in balnea descendat, & merum potet. Acopis, Gleucinoq; unguen-
to misceri debet.

De TEMPERAMENTO Liba-
notidis ex GALENO.

Libanotides tres sunt. Vna sterilis, duæ fructum ferentes. Omnes ue-
ro eiusdem facultatis, emollientis, & digerentis. Succus tum radice, tum
herbæ mistus melli, obtusam oculorum aciem ab humorum crassitudine
emendat. Porro eius Libanotidis quæ ad coronas utilis est, quam

Romani Rosmarinum nominant, decoctum, Regio mor-

bo laborantes potum adiuuat. omnes enim Libanoti-

des abstergentis & incidentis facultatis par-
ticipes sunt.

Ex Paulo AEGINETA.

Libanotides tres quidem infrugiferæ sunt, duæ uero fecundæ, abster-
gentis, incisive, digerētis, et emollientis potentie. Harum omnium succus
cum melle mistus, amblyopias, et humorum crassitudinē emendat,

Ceterum eius cuius ad coronas est usus, decoctū,

Regio morbo affectos adiuuat.

B

C

De M A I O R O N A .

R H A P S O D I A .XVII.

¶ Nomenclaturæ.

Græce, *σάμψυχος, τριφυλλος, ἀμάρacus.*

Latine, Samsfuchus, Amaracus, Maiorona.

Germanice, *Mejoron.*

F

¶ Maioronæ declinatio ex Dioscoride.

Ruticosa herba Samsfuchum est, serpit per terram, hirtis et circinatis folijs, Nepetæ similibus, uel Calaminthæ, odoratissima,

Ex P L I N I O descriptio alia

lib. 21. cap. 11. et. 22.

Amaracum Diocles medicus, et Sicula gens appellauere, quod Aegyptus, et Syria Samsfuchū. Serit utroq; genere, et semine, et ramo, uiuacius prædictis, et odore melius. Copiosum Amaraco, æque quam Abrotono semen: sed Abrotono radix una, et alte descendens, cæteris in summò terræ leuiter hærens. In Cypro laudatissimum et odoratissimum.

Ex Serapione dict. Mercenius.

Mercenius est herba, habens uirgas extensas super faciē terræ, in suo ortu: & habet folia parua, rotunda: super quæ est borra fere similis folijs Calaminthæ, habentis folia subtilia: & habet odorem bonum. Quæ omnia prorsus Dioscoridi respondent.

D

De A M A R A C I Temperamento ex

G A L E N O lib. 6. Simplic.

Amaracus excalfacit nō infrennue, non ualde autem desiccet: sed in caliditate quidē tertij est ordinis, in siccitate uero secundi.

V I R E S eius et Iuuamenta.

Succus decocti potus conuenit incipientibus hydropicis, et ijs quos urinae difficultas aut tormina excutiant.

Illita ex melle arida folia, suggillata tollunt.

Menses subdita in pefso trahunt.

Contra scorpionis ictum ex aceto et sale illinuntur.

Luxatis tumoribus carato excepta imponuntur. Aduersus oculorum inflammationes, tumoresq; cum polline polentæ illini prodest. Acopis, malagmaticsq; calefaciendi gratia commiscetur.

Ex P L I N I O lib. 21. cap. 22.

Samsfuchum scorpionibus aduersatur, ex aceto & sale illitum. Menstruis quoq; multum confert, illitum. Cohibet & oculorum epiphoras cum polenta. Succus decocti, tormina discutit. Et urinis & hydropicis utile. Mouet etiam narium sternutamenta. Fit ex eo oleū quod Samsfuchinum dicitur, aut amaracinum, ad excalfaciēdos emolliendosq; nervos. Et uulvas calefacit. Et folia suggillatis cum melle, et luxatis cum cera profunt.

Ex V I G O N I O .

Maiorona calida & sicca est, habetq; uirtutem consumptiuam, & excitatiuam cum ingenti calefactione. Et propterea epilepticis, spasmosis nariibus odorata, summum gaudium & iuuamentum prestat. Et eius decoctio naribus attracta, cōfortat cerebrū ipsum, ab humorib. frigidis purgando.



DeLAPPIS.
Teuronicæ/ Elemen.



C

De uarijs generibus LAPPARVM,

RHAPSODIA .XVIII.

Ex Commentario M. Vergilij.

C

Ognitu & inuentu facilē, in legumina, & in frumentaria legere Aparinē sua descripti one Theophrastus & Diosc. fecerunt: ipsa etiam tenaci nexu prætereuntium uestibus hærens, & quale hic descriptit semen ostendens in medio umbilicatum, ad cognoscendā se, suiq; contemplationem uolentes etiam conuertit. Persequuntur eam quatuordecim Maiō & Iunio mensibus manū, messioriq; falce agricolæ, pestem satis suis eam sentientes, nihilq; apricis & pinguibus agris frequentius nascitur. Copiosior tū inter legumina q̃ inter frumenta inuenitur. Nouerunt calamitatem suā rustici. Nomen tū, & maleficiū eius causam ignorant. Et ut in similibus sit, quorum ignoratur nomen, Lappam uocant. Quæ uoce non in Aparine tū, sed in cunctis quorum marura semina uestibus prætereuntium in hærent, ignari utuntur. Quæ sane multa sunt: & inter alia Eupatorium etiam, & quo suo loco dicemus. Ex quo factum est, ut non ætate nostra tū, sed antiq; etiā temporibus parum certa in huiusmodi fuerit nominum ratio. Arcionq; Lappam tū aliq; dixerint, aliq; Aparinem hanc, aliq; plures alias, quarum semen aut q̃a asperit, amarū uē, aut cuspidatū est uestibus hæret: quasi ad faciendum genus & nomē una hæc nota satis esset.

Corollarium HERMOLAI BARBARI

de eadem re.

Aparine quam nostri & Lappam uocant, Hippocrates Philistion, & Phileterion quoq; ut Galenus putat. Non euidens, sed occultus in ea illos maturefcit, & intra se germinat semen: uelut animalia quæ in sepiant, ut uiperæ. Nascitur in frumentario agro, inter Lentem præcipue, item pratis, hortisq; Ramosa hæc & hirsuta, quinis senisq; in orbem circa ramos, folijs per interualla, Semen subdulce, Omphacocarpon a Plinio, Galeno, & Paulo Aegineta dicitur. Nisi quis Omphalocarpon ex Dioscoride legi malit, ab umbilici similitudine, quam semen præfert. Philanthropos uero dicta est hæc a nonnullis herba, quia uelut amici solent, comitantium lacrimis obhæreat. Aliud floris genus est, quod in Parthis nasci scribit Apollodorus, Philadelphū appellatum: ex argumento, q̃ rami eius ex interuallo sponte cōeant, ceu amantes: post digrediantur, concipiant, atq; pariant. Huius tenuissimis uirgis reticulatim compositis, atq; ita confectis, hortorum septa impenetrabili compage fieri.

D

Verba DIOSCOR. de APARINE.

Aparinen aliqui Ampelocarpon, aliq; Omphacocarpon, nonnulli Philanthropon uocant, ramosam herbam & quadrangulā, ex interuallis orbiculato foliorum ambitu, ut in Rubia. Flos albus: semen durum, rotundum, concauum, album, umbilici figura, asperitate uestium tenaci. Ea partem colicæ uice utuntur, ad eximendos e lacte pilos. Seminis caulium ac foliorum succus, potu contra uiperarum, phalangiorumq; morsus auxiliatur. Infusa aurium dolori medetur. Herba cum axungia trita strumas discutit.

Plinius de APARINE libro. 27. cap. 5.

Aparinen aliqui omphacocarpon, aliq; philanthropon uocant, ramosam, hirsutam, quinis senisq; in orbem circa ramos folijs per interualla: Semen rotundum, durū, concauum, subdulce. Nascitur in frumentario agro, aut hortis pratisue, asperitate etiam uestiū tenaci. Efficax contra serpentes, semine potu ex uino drachma: & contra phalangia. Sanguinis abundantiam ex uulneribus imprimunt folia imposita, succus auribus infunditur.

De temperamento Aparines ex Paulo.

Aparine, quam aliq; philanthropō, aliq; omphacocarpon cognomināt, mediocriter abstergit & calefacit: habet autē & aliquid partium tenuium.

Omphacocarpon.
Philanthropon.
Philadelphos

¶ De L A P P A M A I O R E.

A

De Lappa maiore, quæ uocatur Bardana maior, proluxa, sed admodum erudita est dissertatio apud Hermolaum Barbarum in Corollario Arcij: & nos in priori T O M O paulisper attigimus Rhapsodia. III. de Vngula Caballina, olim exactam differentiam daturi horum omnium, id est, Vngulæ caballinæ, Personatig, Petasitig, Arcij, atq; Arcij, ubi prioris Tomi errata recognouerimus. Cætera ex Appendice, & Hieronymo pete.

¶ De L A P P A quæ *ῥάδιον* græce uocatur, hi

storia D I O S C O R I D I S.

Xanthion aliqui Phasganon, alij Antithesion, alij Chascanon, alij Choeradolethron, alij & hanc Aparinem nominant, Latini Lappam. Nascitur læto & pingui solo, & lacubus exiccatis, caule cubitali, angulofo, pingui, prodeuntibus ex eo crebris alis. Folia Attriplicis habet infecta, Nasturtium odore imitantia, fructum grandis Oliuæ modo rotundum, & ut Platani pilula spinosum, qui contactu uestibus adhærescit. Is ante collectus quam perfecte siccescat, tunditur, & fictili uase reconditur. Flauos autem facit capillos, si acetabuli instar tepida aqua madescat, mox caput nitro ante perfrictum illinatur. Alij in uino tundunt, & ita asseruant. Semen apurissime tumoribus imponitur.

Explanatio Xanthij per H E R M O L A V M

B A R B A R V M.


Xanthion, & Phasganion uocatur a Galeno & Paulo, Phasganon a Dioscoride, Philanthropos ab Aëtio, nunc Lappa inuersa, & minor a nostris. Non uidetur quibusdam Xanthion ab Aparina superius descripta differre. Sed cur obsecro Dioscor. & Galenus, & cæteri diuersas habuere, duobus locis seorsum de ijs prodentes? Quid quod in omnibus græcis exemplaribus, Aparina ex interuallo stellata pingitur quasi Rubia? Xanthium multo aliter ostenditur, folio Attriplicis, uel ut quidam scribunt, etiam Solani.

B

Marcelli Vergilij alia distinctio Lapparum.

Plura Lapparum genera, folio, semine & natali solo diuersa, obseruatumq; a nobis est, quæ cumq; hamatis uncis, aculeatisq; & uestium tenacibus feminibus plantæ sunt, in græcis & latinis eodem aliquando nomine indicari: in illis Aparines, in nostris Lappæ. Quæ ueluti generis uox omnibus his est. Inter eas & Xanthion hæc est, numeratis ab hoc scriptore notis satis cognoscenda: sic dicta a græcis *ῥάδιον τριχὴν πονί*, id est, flauum capillum facit. Habet & alias appellatiões, sed nobis parum certas, & ob id alijs relictas. Circa rusticas domos, pingui ut hic ait, sed frequentius humido solo nascitur. Idq; est quod hic ait, arescentibus paludibus. Paludes enim appellat loca etiam, in quibus per hyemem aqua fuerit, æstate uero aruerint. Omnium autem notarum quæ Xanthio huic a Dioscoride tribuuntur, nulla certior fructu eius est. Dico autem fructum Lappam, in qua semen est: quem figura grandis Oliuæ, & aculeatū hic describens, facillimam eius deprehensionem fecit, Sed nihil frequentius præmonstratis nascitur locis.

De Meliloto, uulgo dicta *Steintlee*.
R H A P S O D I A .XVI.



MELILOTVM semper existi mai herbam illam Trifoliorum generis, cui nomen *Steintlee*, atq; ea a multis annis ab hominibus medicæ rei peritis demonstrata nobis est: etiam si Simon ille lanuensis, idem uideatur sentire: cuius uerba sunt. Melilotum, nomen compositum a melle, & loto, quod est Trifolium. Nam ipsum sine dubio uidetur esse species Trifolij: cuius flos est melini coloris. Et Dioscorides duas eius species asserit. Vnam, cuius odor est bonus, crocei coloris. Aliam, quæ magis Fœnogræco est similis. Et Plinius Sertulam campanam uocat. Hæc lanuensis ille. Nos illam pinximus, quæ Fœnogræco similior est, sed minorem. Nam maiorem nescio quomodo neglexerit pictor, ut appingere eam non licuerit.


De Sertula campana locus est apud Dioscoridem libro tertio: ubi poterunt qui uolent, Barbari Corollarium, & Marcelli Vergilij Commentariū excutere. Meminit & Plinius.

De C A R D V I S.
RHAPSODIA .XVII.



De Carduorum differentijs necdum nos explicare ualemus . Quare in aliud tempus eorum descriptiones, & designationes referuamus. Attigerunt tamē quēdam de illis infra Leonicens, P. Collinutius, Hieronymus Herbarius, Iacobus de Manlijs & reliqui, de quibus ludicem scrutari te uolumus.

Zartendysfel.




ſechdyſtel.




Acetofa.

Vnifolium.

De Acetofa
require descri
ptionem La-
pachi.



Saurampfer.



Linblatt.

¶ Hanc Delium quendam
nobis optarim explanare.

☾ De Herba Trinitatis.
Dreyfaltigeyr blümlin.



☾ Trinitatis & herbam & florem uocatam uulgo existimo, ob flosculos quos habet tricolores, quibus nihil iucundius, nihilq; magis admirabile. Quo autem ab Dioscoride inscripta nomine sit, necdum comperi.

◻ M A L V A E.

Bappelen.


◻ DeMaluis lege Rhapsiodiam. xxxv. supra Tomo
priori, folio. 197. a.

Gensbappel.



Malua e-
quina.

Rossbapelen.





¶ De N A S T V R T I O ,
R H A P S O D I A . XX.

¶ Nomenclaturæ.

Græcè, κάδαμον. κυνάρδαμον. κύριον.

Latine, Nasturtium, Cardamum,
Cynocardamum.

Teutonicè, Bressen.

¶ Descriptio Nasturtij ex P L 12

N I O lib. 19. cap. 9. &

lib. 20. cap. 13.

N A S T V R T I V M nomen accæpit, a nariū tormento. Et inde uigoris significatio, puer bio id uocabulum usurpauit, ueluti torporem excitantis. In Arabia miræ amplitudinis dicitur gigni. Duo eius gênera, album & nigrum.

Ex Corollario B A R B A R I de
Nasturtio.

Nasturtium die quinto enascitur: duorum generum, mite, ac syluestre. Prioris quoq; ratio duplex, albi, & nigri. Nomen ei a narium tormento, uigoremq; uel prouerbio significat, iubente Nasturtium mandendum inerubus, quasi torporem exciter, animumq; obuacuet, contra uenerem inhibeat: q̃q; Dioscorides accendi eam putet. Miræ amplitudinis in Arabia dicitur gigni. Nasturtium herbis reliquis succum adimit iuxta satis, quod & apud Aristophanem poetam legitur. Hanc Græci non modo Cardamum, sed etiam Cardamida uocant, ut Galenus inquit, & Hippocrates Sauridion, a Sinapis, quod & Saurion dicitur, similiter dicit. Milesium Nasturtium ueteribus landatissimum fuisse, Iulius Pollux autor est. Persas id cū sale mensis apponere solitos, cebre est, cum principio frugalitatem amplecterent, mox aucto imperio, in omne genus luxus prolapsi.

De ratione nominis Nasturtij

ex M. V E R G I L I O.

Eius plures quondam, ut uidetur, appellationes fuerunt: sed omnes ex eodem principio, & ab eadem Cardami appellatione, excepta Hiberide, quæ agreste Nasturtium est, ut in .i. uolumine diximus, in Dioscoridis commentationes has irreperunt. Cynocardamon enim, & Cardamantice solo nomine statim Cardamon indicant. Hiberis uero, ut hic paulo ante dixit, & ut nos autore Paulo Aegineta nunc confirmauimus, agreste Nasturtium est. Has ipsas uoces omnes, Apuleius etiam in Cardamo numerauit: inuicem sibi ideo respondentes, quoniam inter satium & agreste Nasturtium maxima similitudo partium & uirū omnium sit. Ob eamq; causam uagis appellationibus inter se utuntur. Notum nunc olus ubiq; Nasturtium est. Contra uenenata præcipue usus eo Nicander: usus & hic ipse contra Cenchridis uenenum, quemadmodū tunc copiosius docebimus: usus & Paulus Aegineta, Græcorumq; medici omnes totiens, & in tam multis, ut non contemnendam medicinæ partem solum Nasturtium expleat.

B

Hiberis.

G



C

De satū Nasturtij ex P A L L A D I I mense
Februario.

Hoc mense Nasturtium constat, & omni tempore esse ponendum loco quali placebit, & coelo. Fimum non desyderat. Humorem quamuis diligat, tamen deesse non curat. Si cum Lactuca seratur, nasci fertur egrege.

¶ P L A C I T A Barbarorum de Nasturtio.

¶ H I S T O R I A N A S T V R T I I secundum S E

R A P I O N E M. Cap. 355.

Nasturtium est triplex: scilicet Commune, notum. Secundum Nasturtium tectorum. Et tertium orientale Nasturtium. Nasturtium tectorum, est planta habens folia stricta, longa duobus digitis, & in summitate acuta, scissa, & pinguia, quæ extenduntur super terram: & habet in medio uirgam subtilem, longam palmis duobus, habentem paucos ramulos, super quos sunt uoluti pili, habentes summitatem depressam, in quibus est semen latum, simile semini Nasturtij: cuius figura est sicut figura Rutellæ fuscæ, ita est depressum: & ideo græce appellatur *ταλάφιον*, eo quod significat lingua græca depressum. Et habet florem, cuius color declinat ad albedinem: & nascitur in uis, siue parietibus domorum. Nasturtium orientale, est planta longa circa duo brachia, habens ramos subtilem & multos, in quibus sunt folia, a duobus lateribus, similia folijs Scitaragi, nisi quia sunt albiora, & molliora: & in summitatibus ramorum sunt capitella, similia capitellis plantæ Actis: & habet flores albos.

Sententiā P A N D E C T A R I I de Nasturtijs.

Nasturtium multorum generum est. Est enim quod Cardamū dicitur uulgatum, & est Nasturtium aquaticum, uel Babylonium, quod Latini uocant Senecion, uel Apiū aque, uel Cardamum agreste, de quo est apud Serap. cap. 333.

D E Cardami temperamento.

Cardami semen potentia est urendi, sicut Synapi.

Vires eius & iuuamenta ex Dioscoride.

D Omnia semen est acre. Excalfacit, Stomacho aduersatur. Aluū turbat. Tineas excutit. Lienem imminuit. Partus examināt. Vrinam cit. Venerem stimulat. Synapis & Eruca simile intelligitur. Lepras & impetigines abstergit. Illitum cum melle, lienem extenuat. Fauos expurgat. Pulmonum uitia extrahit, sorbitionibus incoctum. Serpentiū uenenis potum resistit, atq; eas suffitu fugat. Capillorum defluuia cohibet. Carbunculos ad suppurationem perducit & rumpit. Coxendicibus cum polenta commode ex aceto illinit. Tumores collectionesq; discutit. Emittere furunculos, illitū cum muria. Herbæ ad omnia eademe, effectus lice tminor.

E X P L I N I O de eodem.

Nasturtium Venerem inhihet. Animum exacuit. Aluum purgat. Detrahit bilem, potum in aqua decem denariorum pondus. Cum lomento strumis illitū, opertumq; Brassica, præclare medetur. Nigris capitis uitia purgat. Visum clarificat. Cōmotas mentes sedat ex aceto sumpit. Lienem ex uino potum, uel cum fico. Tussim ex melle si quotidie ieiuni sumāt. Semen ex uino omnia intestinorum parialia expellit, efficacius addito Mastastro. Prodest & contra suspiria, & tussim cum Origano, & uino dulci. Pectoris doloribus decoctum in lacte caprino. Panos discutit cum pice: extrahitq; corpori aculeos, & maculas illitum cum aceto. Contra carcinomata adijcitur ouorum album. Et lienibus illinitur ex aceto. Infantibus uero e melle utilissime. Scitius adijcit hoc serpentes fugare, scorpionibus resistere. Capitis dolores contritum, & alopecias emendare, addito synapi, grauitatem aurium trito imposito auribus cum fico. Dentium dolores infuso in aureis succo. Porriginem, & ulcera capitis cum adipe anserum. Furunculos concoquit cum fermento. Carbunculos ad suppurationem perducit & rumpit. Phagedænas ulcerum expurgat cum melle. Coxendicibus & lumbis cum polenta ex aceto illinitur. Item licheni. Item unguibus scabris, quippe natura eius caustica est. Optimum autem Babylonium, Syluestri uero ad omnia effectus maior.

EX PL A T I N A E lib.1. de Honeſta uoluptate.

Hoc, ut peculiari cibo Perſæ utebantur, ut inquit Xenophon, qui ſub Cyro militabant. Nimi-
us eius uſus, & Erucae nocet, moderatus prodeſt. Nam & animum exacuit, & aluum purgat, ac
bilem detrahit. Valeret item ad plurimos medicinarum uſus.

A

Nafurtium
Perſarum mi-
litum cibus.

EX PL A T E A R I O.

Nafurtium eſt calidum & ſiccum in quarto gradu. Semen eius præci-
pue competit uſui medicinæ. Vnde cum reperitur eius receptio, ſemen de-
bet poni, non herba. Semen collectum, in multa efficacia per quinque an-
nos ſeruatur. Herba uidetur eſſe magnæ efficacig: exiccata modice, uirtu-
tem habet diſſoluendi, & conſumendi, ex qualitatibus ſuis.

Contra paralyſim linguæ ualet, ſemen maſticatum, & in ore tentum.

Humiditates etiam aliorum membrorum, & cerebri præſertim defi-
cat, comeſta, uel in ſacculo ſuperpoſita.

In lethargia fit ſternutamentum ex puluere ſeminis eius.

Vuam relaxatam ſiccatur gargarisma eius, & ficuum ſiccatur. Contra Ili-
acam quoque paſſionem, ex frigida cauſſa ſemen eius in ſacculo, & in uino
decoctum ſuperponitur.

Ad eadẽ, & contra ſtranguriam, herba ipſa decocta in uino & oleo ſup-
Egreſſum anum reprimi pulvis ſeminis illitus. (ponitur.

EX V I G O N I O.

Nafurtium eſt calidæ & ſiccæ complexionis in tertio. Et uirtus eius eſt manurare apoſtoma-
ta frigida. Et ſemen eius cum aceto decoctum diſſoluit ſtophulas.

B

EX A P V L E I O.

Ad capitis uitia, et porrigines, & furfures herbæ Nafurtij ſemen mi-
xtum cum adipe anſerino, & tritum inunge.

Herbam Nafurtium, & Pulegium ex aqua decoctum, bibere dato, e-
mendabis & diſcuties cruditatem.

H I E R. H E R B.

Aqua Nafurtij tumores gingiuarum reprimi. Et lumbricos uentris interimit. Paroi-
das mire ſanat, & uariolas.

De Altero N A S T V R T I O, ſcilicet Aquatico.

Coliculus cubitalis Senectio eſt, quadamtenus rubens, contiguus in-
uicẽ, exiguiſque folijs Erucae modo in extremitatibus incifuris diuiſis, ſed
longe minoribus quam Eruca. Luteis floribus, cito dehiſcentibus, & in
pappos deſiſtẽtibus. Vnde & ἀπρὸς τοὺς dictũ eſt, quod uere ſcilicet, flores hu-
mani capilli modo in eo caneſcant. Radix illi eſt inutilis. Naſcitur plærũ
que circa urbes, & oppida, in aggeribus murorũ & ſeptis. Poſteriores fere
omnes aquaticum Nafurtium interpretantur. Et Germanice, Brunnſſen.

Dioſco. lib. 4.

V I R E S eius & Iuuamenta.

Refrigerant cum folijs flores: eaque ob cauſſam impoſita utraq; ſimul em-
plaſtri mō per ſe, aut ex uino dulci, teſtiũ, & ſedis inflammationes ſanāt. Cũ
thuris aut polline, nō alijs tñ uulnerib. cunctis, ſed neruorũ etiã medentũ.

Poſſunt idẽ præterea per ſe Senectiois pappi, ex aceto emplaſtri mo-
do impoſiti. Recentes contra poti ſtrangulant.

Totus enim caulis in aqua elixus, mox in mulſo potus, bilioſos ſtoma-
chi dolores ſanat.

Eischmüng.



DE M E N T I S,
R H A P S O D I A . XXI.

A

MENTARVM differētiās omnes, nemo rectius distinxit Hic
ronymo herbario, cuius infra Commentarium consule, a calce
Appendicis.

Mentæ nomenclaturæ secundum

Dioscor. lib. 3.

Hedyosmon sativum alij Mintham, alij Calaminthan. Latini Mentam
uocant, alij Nepetā, Aegyptij Tis, alij Perxo, alij Macetho. Cognita her-
ba est. Calfaciendi, adstringendi, atq; exiccandi uim habet.

Platina lib. Obsoniorum.

Menta suauissimi odoris herba est. Hanc fuisse puellam a Plutone amatam, ferunt poete,
uersamq; in herbam sui nominis a Proserpina, cuius pellex erat. Hinc præterea Mentulam di-
ctam, quasi donum amorum, uel quasi meritā, uel quod mensam grato odore percurrat. Eccir-
rat enim hæc herba, propter inflammationem & humiditatem, demortuam Venerem. Hanc
obrem crediderim, ueteres exercitus duces uetuisse militem, quem castum uolebant, unde et ca-
stra sunt dicta, hac herba uelci. Appetentiam inducit Menta, & obesos a marcescentia conseruat;
lætum cor reddit, stomachum iuuat, lumbricos interficit. Contra morsum canis rabiosi ualet
plurimum. Seritur Menta æquinoctio uerno; melius tamen furculo uenit quam semine. Humi-
do minus gaudet. Aestate uiret, hyeme flauescit. Semel sata, diutina ætate durat. Est & Menta-
strum, syluestre genus, quod ut Viris propagatur.

Virtutes
Mentes.

De M E N T A E temperamento ex Galeno.

Hedyosmos, alij uero Minthen odoratam nuncupant. Est enim & alia quædam Mintha nō
odorata, quam Calaminthen appellant. Vtræq; gustu acri, & facultate calida est, ex tertio ordi-
ne excalfaciunt. Infirmitior est tamen Menta odorata quam Calamintha, minus excalfacit.
Ut autem in uniuersum dicam, hæc ceu syluestris quædam est, illa ceu domestica. Quam obrem
sane, ob eam quæ ex cultu accedit humiditatem, mediocriter item ad Venerem excitat; id quod
omnibus accidit quæ humiditatem semicoctam, & flatuosam continent. Ob talem ipsius her-
bæ temperaturam, in abscessibus ea quidem cum polëta mista utuntur; id quod in Calamintha
facere nequeas; propterea, quod ualentius tum excalfaciat, tum deficet, quam id genus po-
ssint. Habet uero etiam quiddam amarum in se & acerbum. Illa quidem lumbricos interficit, a-
cerbitate uero si cum oxycrato bibatur, recentes sanguinis refectiones reprimat. Substantiæ est
ut si qua alia herba partium tenuium.

B

V I R E S eius & iuuamenta ex Dioscoride.

Sistit sanguinem, potō ex aceto succo. Tineas in uentre teretes enecat,
Venerem stimulat. Singultus, uomitiones, cholera scq; sedant, terni ramu-
li cum acidi granati succo poti. Suppurationes discutit, si cum polenta il-
linatur. Imposita fronti, capitis dolores mulcet. Mammæ si tendantur, aut
lacte turgant, compescit. Cum sale, canū morfibz illinitur. Aurium do-
loribus cum aqua mulsa subuenit. Vuluæ ante coitum admota, concepti-
oni resistit. Linguae scabriciem conficta læuigat. Coire lac, densariq; in
caseum non patitur, si folia potionibus lactis immergant. In summa, sto-
macho utilis est. Et in condimentis peculiarem gratiam habet.

Verba P L I N I I quæ supra mutuatus est Pla-

tina lib. 19. cap. 9.

Eodem tempore seritur Menta planta; uel si nondum germinat, spon-
gia. Minus hæc humido gaudet. Aestate uiret, hyeme flauescit. Genus ei-
us syluestre Mentastrum est. Et hoc propagatur ut uitis, uel si inuersi ra-
mi serantur. Mentæ nomen suauitatis odoris apud Græcos mutauit, cum

C alioquin Minta uocaretur, unde ueteres nostri nomen declinauerunt. Grato Minta mentas odore percurrit in rusticis dapibus. Semel sata, diutina ætate durat. Congruit Pulegio, cuius natura in carnarijs reflorescens sæpius dicta est. Hæc quoq; seruantur simili genere, Mentam dico, Pulegiumq; & Nepitam.

EXPLINIO lib. 20. cap. 12.

Mentæ ipsius odor animum excitat, & sapor auiditatem in cibis: ideo in mammarum mixtura familiares ipsæ accessere, ut coire, densareq; lac non patiantur. Quare lactis potionibus additur, ne huius coagulati potu frangulentur. Data in aqua & mulso, eadem ui resistere & generationi creditur, cohibendo genitalia densari. Aequè maribus ac fœminis sistit sanguinem, & purgationes fœminarum inhihet. Cum amylo ex aqua pota, cæliacorum impetus, syriation, & uomicas uulua curauit. Illa & iocinerum uitia ternis obolis ex mulso datis. Item sanguinem excreantibus in sorbitionem. Ulcera in capite infantium mire sanat. Arterias humidas siccat, siccas adstringit. Pituitas corruptas purgat in mulso & aqua. Voci succus sub certamine utilis duntaxat, & qui gargarizatur uua tumente, adiecta ruta & coriandro ex lacte. Vtilis & contra tonsillas cum alumine, lingua asperæ cum melle. Ad conuulsa intus per se, uitijq; pulmonis. Singultus & uomitiones sistit cum succo granati, ut Democritus monstrat. Recentis succus narium uitia. Spiritus subductos emendat. Ipsa trita choleras in aceto quidem pota. Sanguinis fluxiones intus. Ileum etiam imposta cum polenta, & si mamme tendantur. Illinitur & temporibus in capitis dolore. Sumitur & contra scolopendras, & scorpiones marinos, & ad serpentes. Epiphoris illinitur, & omnibus in capite eruptionibus, item sedis uitij. Impetigines quoq; uel si teneatur tantum, prohibet. Auribus cum mulso instillatur. Aiunt & lieni mederi eam in horto gustatam, ita ne uelatur: si is qui momorderit, dicat se lieni mederi, per dies noue. Aride quoq; farinæ tribus digitis apprehensam, et stomachi dolorē sedare in aqua: et similiter aspersa in potionem, uentris animalia expellere.

APVLEIVS de Menta.

Ad ignem sacrum herbæ Mentæ succus expressus, adiecto sulphure et aceto de penna inunctus, sine mora dolorem sedat.

De Mentastro secunda specie Mentæ,

Ex Dioscoride lib. 3.

Syluestrem Mentam Latini Mentastrum uocant, hirsutius folio, & prorsus maiore quam Syfymbrj, grauiore odore. Quare minus ad sanorum usus expetitur.

DE CALAMINTHA, tertia specie Mentæ.

EX DIOSCORIDIS Libro Tertio.

Ex Calaminthæ generibus, quædam montibus familiaris, folia Ocimi habens, incana, surculos aridos, & caules angulosos, purpureum florem. Altera Pulegio similis est, sed maior. Quam syluestre Pulegium ideo ap-

pellarunt, quod odore ipsum æmuletur. Nepetam Latini uocitant. Ter-
tia Mentaſtro cognata eſt, folijs oblongioribus, caule & ramis maioribus
quam ſuperioris, ſed uiribus inefficior. Omnium folia guſtu feruentia
& acria. Radix ſuperuacua. Naſciſcitur in campeſtribus, aſperis, & aquoſis.
Potu, aut illitu demorſis a ſerpente opitulatur.

Decoctum potu menſes et urinas expellit.

Ruptis, conuulſis, orthopnœæ, torminibus, cholerae, rigoribusque
auxiliatur.

Regium morbum expurgat.

Præſumpta in uino uenenis reſiſtit.

Tineas, cæteraq; interaneorū animalia, cum ſale & melle pota, enecat.

Nec ſecus cocta, crudaue ſi teratur.

Elephanticos eſitata adiuuat, ſi poſtea ſerum lactis ebibatur.

Folia detrita ſi in uellere ſubſciantur, menſes extrahunt, & partus enecat.

Accenſa, aut ſubſtrata ſerpentes fugant.

Nigris cicatricibus candorem reddunt, in uino cocta & illita.

Sugillata tollunt.

Calamintha iſchiadicis imponitur, ut concretum humorē euocet, ſum-
mam cutem exurens.

Vermes necat ſuccus auribus inſtillatus.


EXBARBARI COROLL.

Calaminthā, noſtri fere Nepitā appellant, etiamſi Dioſcor. ſpeciem eius unā priuatim Nepi-
tam uocari tradat. Proſius tāta inter Mentam, Mentaſtrū, & Nepitā ſocietas eſt, ut mirū non ſit
miſceri qñq; ab autoribus earū & ſpēs & noīa. Alioqn & qd modo Pulegiū officinis & ruribus
uocat, haud plane ſcias Calaminthæ genus ſit, an uerū Pulegiū. Nepita etā non ſata naſciſcitur. Ca-
lamithā græce Cæretā quoq; dictā fuiſſe, teſtis eſt Strabo: qui nōnullos ſcribit exiſtimare, Lacedæ-
moniā ab Homero non cætoeſſam a magnitudine, ſed cætoeſſam a Calaminthæ copia uocari.

EXM. VERG. COMM.

Congenerem aliqui, ſimilem tantum aliqui Mentæ Calaminthem, quam nos Nepetā dixi-
mus, in græcis fecerunt. Subſcribitque illorum ſententiæ, nomen quod coniunctam ſibi habet
Mentam. Habent contra poſteriores illi figuram, qua Mentæ ſimilem faciunt: naturam uero
& uires, qui ſui generis herbam eſſe dicūt. Triplicem hanc Dioſcorides ait: diuerſisq; notis inui-
cem ſeparat, ſed nō facile cognoscendis: tanta trium generū ſimilitudo eſt. Plinius unum tantū
conſtituit genus lib. 20. cap. 14. Nepetamq; id uocat. Nicander in theriacis ſuis duo tantū, & ali-
ter Calaminthes gñā cognouiſſe uidetur, aquaticū, paluſtreq; alterum: montanū uero alterum:
haud ſane, quia montanā Calaminthē ille dicat, ſed cum aquaticā & riguis gaudentē dixit, pro-
prium ſignaſſe genus uidetur: cui diuerſum montanū, & in ſiccis naſcēs ſit. Verſiculi eius ſunt.
τῆμος δὲ ποταμῶσι πολυπύργιος κατακίνας ὀφρύλλιν καλὰ μινθὴν ὀπάτω χαιτώλαιαν. πολλὰ γὰρ λιβάδι παρὰ
ἵναισι ἀμφὶτι χύλα ἔρεται. ἀγροῦλοισι ἀγαλλορῶνα ποταμῶσιν. Quorum ſenſus eſt. Sumito tunc cir-
ca reſonantis fluminis uortices comofam frondentem Calaminthem: Copioſa enim prope a-
quarum ſcatebras, & circa labra earum naſcitur, fluminibus gaudens. Ex quibus pro comperto
habendum eſt, Nicandro duo hæc tantū genera eſſe, locis in quibus naſcuntur diſtincta. Hic ta-
men ex foliorū, ramulorum, florum, & odoris diuerſis notis ſua genera ſeparat. Non facile, ut
diximus, inuenienda & cognoscenda: rara eſt nataliū mixtura, & naturæ cognatio. Apuleius,
quicūq; ille fuit, in cōmentario, qd de aliquot herbis reliquit, Nepetā hanc ait montanam Men-
tam a græcis dici, a Magis ſanguinem Hammonis, ab Italīs Nepetam montanam.

¶ Herba sylvestris, ignoti
nominis.



Sanguinaria.


Blutkraut.

¶ Sunt herbe nō pauce, sunt
 q̃ radices, sunt lapides & gem
 mæ, quæ singula Sanguinaria
 dici possunt. Hæc tamen her
 ba uulgo Sanguinaria uocat̃,
 nā rubet, & succus eius ut pur
 pura tingit. Alias Soldanella.
 Nascitur stercorarijs.



Waltheysfr.

¶ Descriptio
nē huius her-
bæ habes su-
pra Tomo
priorē, folio.
191. inter hepa-
ticas.



Artemisia.

Buct.

¶ Herba hec
descripta est
supra Tomo
priori, fol.
285. a.



Raponeoli.

82

Kepünglin.



De P O L Y P O D I O,

A

R H A P S O D I A . . . X X I I .

Nomenclaturæ

Græce, πολυπόδιον.

Latine, Filicula. Filix arbor.

Germanice, Engelsüß. Baumfar.

De ratione nominis ex M. V E R

G I L I I Commentarijs.

F

Olia Romanis Filiculā, Græcis pilosæ cauernosæq; acetabulorū modo radices Polypodium fecerunt: exiguum herbam: ideoq; diminuto nomine ab utraque gente appellatam. Folia enim (quod hic: Theophrastus, Plinius, latinique & græci fere omnes testantur) Filici similia habet: radices autem pilosas, minimi digiti crassitudine. Sed quod marinis Polypis cognominem plantam fecit, per longitudinem certis interuallis dispositi concaui tumores, eadem specie et natura usu quo in polypis acetabula uidentur, fuerunt. Neq; enim a multitudine pedū, quos nullo habet ut polypum, Polypodium græci herbam nominauerunt, sed quoniam polypo, quæ diximus nora similis est, sic quondam uocata fuit: nulla alia q̃ exigui polypi significatione. Diminutum siquidem a polypo nomen Polypodium est. Facile intelliget quod dicimus, qui oculatus testis radicis eius fuerit. Videbit enim qualem nos diximus crassitudine, & uillositate radicem: mox in ea apertos & concauos tumores quosdam, quibus nititur & hæret: non aliter q̃ in mari polypi acetabulis suis hærent, sugunt, & quæ coeperunt tenent. Qualia autem Acetabula sint, & unde ad multas naturæ partes id nomen transierit, in Acetabulo herba, & alibi longius diximus. Idque est quod Plinius uicesimo sexto uolumine ait. Radix crassitudine digiti minimi, acetabulis cauernosa, ceu polyporum cirri. Felici descriptione usus, rei quam ante eum Theophrastus, & hic scriptor isdem fere uerbis tradiderant. Theophrasti uerba libro nono de plantarum historia sunt, quo loco de radicum diuersitate agit, hæc. ἡ δὲ τοῦ πολυπόδου ἁλῶσα καὶ ἔχουσα κοτυλιόσας, ὥσπερ αἱ τοῦ πολυπόδου πλατάναι, κατὰ τὴν δὲ κάτω, πολλὸν ἔχει ὅμοιον τῇ πτερίδι τῇ μεγάλῃ καὶ φέται ἐν ταῖς πέτραις. Quorū sensus est. Pilosa aut Polypodij radix, acetabula habens, qualia polyporū cirri habent: purgat per inferna. Foliū maiori Filici simile habet, & in petris nascitur. Hic non tam manifeste rem describit: sed cum dixisset habere Polypodij radicem cirros polypo similes, cogitanda legentibus reliquit acetabula: quæ necessario eos sequuntur, & sine quibus in polypis cirri esse nō possunt. Alioquin differunt a Cirris Acetabula. Illi enim tota polyporum flagella sunt: hæc autem in flagellis & cirris his cauernosæ concauitates, quibus id animal nititur, apprehendit, & apprehensa exsugit. Et hæc tota Polypodij nominis ratio in græcis, & causa fuit. Romani, quæ certius & in aperto magis erant folia contemplati, Filiculam uocauerunt. Testatur q; id Plinius, eodem loco dicens. Detrahit bilem Polypodium, quam nostrī Filiculam uocant. Similis enim Filici est. Sed multo certius ante eum. M. Cato operis sui de re rustica capite centesimo quinquagesimo octauo, qui cum familiam rusticam doceret, quo modo alium deicere oporteat, plura simul coqui iubebat: frustum de perna Brassicæ, & Betæ, cum radice sua coliculis: tum Filiculæ paulum, Polypodium hanc intelligens: cui, testantibus id cunctis alijs, egregia in purgando uis est. Polirrhizon, id est, multiradicem uocari hic etiam ait, ut paulo ante diximus, a copia radicū: quod nomen accreuisse nos illi credimus ex pilositate eius. Nasci in petris tantum Theophrastus ait. Omnes alijs tamen ultra petras in arborum, præsertim quercuum truncis prouenire etiam tradiderunt Probanq; officinæ, ex quercu magis, q̃ ex petris, aut alijs arboribus. Plinius sub arboribus uetustis nasci ait. Cæteri uero in, non sub arboribus. Addidit ille tamen uetustatem necessariam Polypodij natalibus. Inter corticis enim rimas nascitur, quas uetustiores tñ arbores amissō iuuentutis humore & læuore ducunt.

B

Cirri
Acetabula.

Descriptio Polypodij ex Dioscoride lib. 2.

Polypodion aliqui Scolopendrion, alij Pterin, alij Polyrhizon, Latini Filiculam uocant. Nascitur in muscosis petris, & uetustis arborum caudibus, præsertim Quercuum, palmi altitudine, Filici similis, sub hirsuta, nō tenui perinde diuifura. Radix pilosa, in qua continentur cirri, ceu polyporum, crassitudine digiti minimi, coloris intus herbacei, austera aliquantum, & gustu subdulcis.

H

C

Descriptio eius quæ Dryopteris uocatur,
priori non absimilis, ex eodem

Dioscor. lib. 2.

Dryopteris aliqui Pterion, alij Nymphaeam Pterin nominant. Nas-
citur in uerum roborem musco, Filici similis, multo minore foliorum in-
cisura, radicibus inuicem implexis, hirsutis, gustu acerbis, in dulcedinem
uergentibus.

Textus Plinij de utraq; lib. 27. cap. 9.

Filicis duo genera, nec florem habent, nec semen. Pterin greci uocant,
alij Blechnon: cuius ex una radice quamplures exeunt filices, bina etiam
cubita excedentes longitudine, non graues odore. Hanc marem existimant.
Alterum genus Thelypteris Greci uocant, alij Nymphaea Pterin. Est autem
non singularis atque fruticosa, breuior, molliorque & densior, folijs ad radi-
cem canaliculata. Vtriusque radice sues pinguescunt. Folia utriusque laterib.
pinnata, unde nomen greci imposuere. Radices utriusque longe in obliquum,
nigre, precipue cum inaruerunt. Siccari autem eas sole oportet. Nascuntur
ubique, sed maxime frigido solo. Effodi debent uergentibus occidentibus. V-
sus radices in trimatu tantum, neque ante, neque postea. Pellunt interaneorum
animalia. Ex his tineas cum melle. Caetera ex uino dulci triduo potae. V-
traque stomacho inutilissima. Aluum soluit, primo bilem trahens, mox aquam.
Melius tineas cum scamonijs pari pondere. Radix eius duum obo-
lorum pondere ex aqua, post unius diei abstinentiam bibitur, melle pre-
gustato contra rheumatismos. Neutra danda foeminis: quoniam graui-
dis abortum, caeteris sterilitatem facit. Farina earum ulceribus tetris insper-
gitur. Lumentorum quoque ceruicibus. Folia omicem necant, serpentem
non recipiunt. Ideo sub sterni utile est in his locis suspectis. Vt etiam fu-
gant nidore. Fecere medici huius quoque herbae discrimen. Optima Mace-
donica est, secunda Cassiopica.

De temperamento Filicis ex GALENO

lib. 5. Simplicium.

Filix radicem habet maxime utilem. Latum enim lumbicum interficit, si quis eam quatuor
drachmis in melicrato ebeat. Ad eundem modum partum usum quidem necare, mortuum
autem eijcere, mirum non est. Est enim amara, paulum habens adstrictionis. Quamobrem ul-
ceribus imposita, uim habet ualenter desiccandi. Non tamen mordax est. Similem uim habet et
Thelypteris nominata.

VIRES & Iuuamenta Polypodij ex

Dioscor. lib. 2.

Purgandi uim habet. Coquitur cum gallina, aut piscibus, aut Beta, aut
Malua ad aluum soluendam.

Aridae farina aquae mulsae insparsa, detrahit bilem et pituitam.

Trita luxatis efficaciter illinitur, et aduersus digitorum fissuras.

DE DRYOPTERIS

Dryopteris Psilotum est cum radicibus trita. Illinitur enim primum,
usque dum sudorem euocet; mox sudor abluitur, & recens imponitur.



¶ De Filicib. haftenusex scri-
ptum sententia. Penitus ue-
ro rem nobis expendentibus,
Quirinus & peritus, & fidedi-
gnus herbarius, quatuor no-
bis eius genera demonstrauit.
Primum Polypodium, Engels-
fuß. Secundum Dryopteris,
Flein Waldsar / oder Eychsar.
Tertium syluestrem Filicem al-
titudine quatuor, aut sex cubi-
torum, locis nemorosis proue-
nientem, teuto. groß Waldsar.
& Quartum Saxifragae gene-
ris, teuto. Roter steinbrech / oder
Maupfesser / oder Siensar ge-
nant, quæ fere omnia in so-
lis, & herba ipsa conueniunt,
tantum in radicibus uariant:
quarum singulas & uidimus,
& gustauimus. Nam Polypo-
dij dulcis est, Dryopteris acer-
bior, syluestris amarior: tanti
dulcoris, ut ppter ea sues, qui
illa afficiuntur, omnem etiam
circa terram subruant, quo eis
uesci liceat. Quinta quoq; spe-
cies, quam supra sub Tanacetii
nomine descripsimus in prio-
re Tomo, nescio an in hoc al-
bum referri debeat. Sunt enim
qui & hanc Filicem uocant, &
uulgari nomine Reysfar.

Genera
Filicis

Supra priore
Tomo, fol.
250. & seq.

C

De S A L V I A, R H A P S O D I A .XXIII.

Nomenclaturæ

Græce, *ἑλελίφακον. ἑλελίφορον.*

Latine, Saluia. Elaphoboscus..

Germanice, Salbey.

Saluia, ut inquit Hermolâus Barbarus, sic dicta est, tum quod salutâris est, & multis accõ-
moda morbis: tum quod ad prolem facit contempiendam. Nam in Aegÿpti inquit Copto,
multis pestilentia sublatâ, coactæ sunt mulieres, huius herbæ succo ad conceptum uti.

Saluiam esse Tussilaginis alteram speciem, ideo libenter Dioscoridi, Plinio, et Apuleio cre-
dimus, quia foliorum canicis, rugæ, redolentia, & reliquæ notæ respondent. Quamq; quæ sit
illa uera ac genuina Tussilago, mihi certe compertum non est. Nec id mirum. Nam flore & cau-
le confestim ubi apparuerit, exiit, disperitq; e conspectu. Quod autẽ ab Theophrasto Spha-
celo comparatur, cuius quidẽ species ab ipso creditur, ideo nullam pugnantiam habet, quia
nihil obstat, unam & eandẽ herbam, diuersis alijs in figura & similitudine posse æquipara-
ri: ut pulchre etiã adnotauit Marcellus Vergilius. Sed iam autores ipsos potius loquentes
audiamus.

Saluiæ *ἑλελίφακον* ex Dioscoride lib. 3.

Saluia frutex est ramosus, longus, uirgas habens quadrangulas, et ca-
nas: folia mali cotonei effigie, sed longiora, asperiora, crassiora, et quæ sen-
sim attritarum quasi uestium scabriciem referant, hirsuta, subalbida, per-
quam iucundo odore, sed graui. Semen sumis in caulibus syluestri Ormi-
nio simile gerit. Et in asperis nascitur.

S A L V I A Plinia lib. 22. cap. 25.

D Nostri qui nunc sunt Herbarij, Elelisphacon Græce, Latine Saluiam
uocant. Mentẽ similem, canam, odoratam. Plura lege lib. 26. cap. 6.

Comparatio S P H A C E L I, et Saluiæ,
ex Theophrasto lib. 6. cap. 2.

Sphacelus, & Saluia inter se distant, quasi alterum urbanum, alterum
genus syluestre dixeris. Sphacelo foliũ leuius, contractius, minusq; squal-
lens: Saluiæ scabrius.

Apuleius de S A L V I A.

Quidam græcorum Cission, siue Ciosmin, alijs Elisphacon appellau-
re, Itali Saluiam, alijs Tussilaginem uocant. Elelisphacos agrestis grauioris
est odoris: usualis uero, quæ est boni odoris ac leuioris, Saluia uocatur.
Est igitur frutex, siue sarmentum in longitudinem porrectum, subalbidũ,
uirgis maioribus, folijs paulo asperis, odoris boni: et fructu sine semine in
summitate ramorum similior, minor agresti. Nascitur asperis locis. Et est
uirtutis redarguentis cum acrimonia: quæ deniq; pro Dictamno uenenu
sæpe ejcit.

De S A L V I A E temperamento
ex Gal. lib. 6.

Elelisphacos euidenter excafcacit, ac leuiter subastringit.

V I R E S & iuuamenta ex Dioscoride.

Menses cit, & urinas decoctum foliorum, ramorumq; pctum.
Partus extrahit.

Pastinacæ marinæ ictibus auxiliatur.

Vulnerum sanguinem cohibet.

Tetra ulcera purgat.

Testium pruritus sedant rami, folia si decoctione foueantur.

Addit Plinius, quod ulcerū, & auriū uermes quoq; extrahit.

Nec alia fere Serapion Arabs.

EX A P V L E I O.

Ad pruriginem circa anum Saluſa decoquitur, & de ea aqua inferiores
partes fomentantur: & sedat pruriginem summe.

Ex Macro, quæ in Dioscor. non habentur.

Saluſia, cui nomen Elelisphacos est apud Argos,

Cum multa lecoris prodest potata querelis.

Cum uino succus tepidus sumitur huius

Compeſcit uentrem, tussim, laterisq; dolorem.

EX P L A T I N A E obſoniorum lib. 3.

Saluſia calida et sicca, in multis condimentis utimur. Nec mirum cum
herba sit salutaris. Nā et contra paralyſim ualeat, & dentibus illita prodest,
et serpentum uenenosus morſus sedat.

E V P A T O R I I descriptionem, si lubet, huc referas, quam
habes supra eodem Tomo, folio. 27.

C

¶ D E V A L E R I A N A ,
R H A P S O D I A . X X I I I .

¶ Nomenclaturæ.

Græce, *πυρία* *valeriana*

Latine, Valeriana. Amanilla. Herba benedicta
valentiana.

Germanice, Baldrian. Dennenmarck. Bagentraut.

¶ Descriptio P H V ex Dioscoride
lib. Primo.

P H V, quod aliqui sylvestre Nardum appellat, nascitur in Ponto ; folio Olusarii, aut Elaphobosci, caule cubitali, aut altiore, leui, cauo, molli, in purpurâ uergente, geniculis intercepto. Floribus Narcisso proximis, maioribus, teneris, et in albicâte purpureis. Radice superius ad digiti minoris crassitudinē, ex obliquo uillosa, in nigri Veratri, aut lunci odorati modū, capillamentis inuicem contextis, flauescētibus, odoratis, cum quadam odoris grauitate Nardum æmulantibus.

E X M. V E R G. C O M M.

Quam pro Dioscoridis Phu, ætatis nostræ Herbarij ostendunt. s. Valerianam herbam, son geminor ea est quæ ab hoc scriptore describitur. Nec omnes omnino utriusq; inuicem sibi respondent notæ, quæ tamen præcipue a Dioscoride numerantur, conuolutæ glomeris modo, & ut Plinius ait, uillosæ radices, earumq; Nardi odor, & albicans in caule purpura, in nostra pariter sentiuntur. Credimusq; nos, ut in animalibus etiam sit, quæ non eadem mole corporis, ingenijq; sui natura ubiq; nascunt, in alieno orbe cœli, aut terræ beneficio, Phu hanc proceriorem nasci. Quoniam & in nostro orbe cubitalis aliquando uisa fuerit.

De Temperamento P H V ex G A

L E N O lib. 8.

D Phu odorata quodammodo est huius herbæ radix, Nardo uiribus similis, sed tamen ad plerq; infirmior. Vrinam mouet plus quam aut Indica, aut Syriaca Nardus, perinde ut Gallica.

V I R E S & luuamenta ex Dioscor.

Excalcificat.

Vrinam mouet, si sicca potui detur.

Decoctum eadem præstare potest.

Ad lateris etiam dolorem efficax.

Menses ciet.

Antidosis inferitur.

Adulteratur radice Rusci ammixta : sed maleficiū deprehenditur, quoniam hæc dura est, & frangenti contumax, sine ulla odoris gratia.

DE VERA

HERBARVM cognitione

A P P E N D I X,

cui sequentiā insunt,

- 1 Exegesis omnium Simplicium Dioscoridæ,
& quomodo ijs quæ in Officinis seruan-
tur respondeant.
- 2 Scriboni Largi Medici uetustissimi, de Sim-
plicibus fragmentum.
- 3 Io. Mainardi Ferrarien. Medici nostri secu-
li clarissimi, Annotationes aliquot Sim-
plicium, e scriptis eius extractæ.
- 4 Nicolaus Leonicenus de falsâ quarundā her-
barum inscriptione a Plinio.
- 5 Pandulphus Collinutius de interpretatione
Simplicium quæ sunt apud Plinium, calu-
nijs Leoniceni respondens.
- 6 Leonardi Fuchsj, Principis Brandenburg.
Medici Annotationes de Simplicibus, a
medicis hæctenus perperam intellectis, &
æstimatis.
- 7 Generosi Comitris Hermannii a Nuenar cen-
suræ aliæ Herbarum super eadem re.
- 8 Do. Bernardi Schylleri Medici iudicium de
Cariophyllis.
- 9 Hieronymi Tragi medici dissertationes fere
quinquaginta, de herbarum quarundam
nomenclaturis.
- 10 Marci Gatinariæ medici quondā Ticinen.
Annotatio una & altera de Tarxaco, Ci-
corea, Iua, Esula, & Soldanella.
- 11 Iacobi de Manlijs Alexādrini, interpretatio
Simplicium, secundū ritum Officinarū.
- 12 Hieronymi herbarij Apodixis Germanica,
ex qua facile uulgares herbas omnes lice-
bit perdiscere.

¶ E X E G E M A omnium Simplicium

A

quæ sunt apud Dioscoridem: & collatio eorundem cum ijs quæ in Officinis habentur.

¶ Ex Primo Dioscor. L I B R O .



R I S tameris Illirica inscribatur, & in primis probatur, tamen & in Italia habetur. Et consensu omnium est radix alba, digituli crassitudine. Quæ ab officinis Irios, gignendi casu, pro nominatio usurpatur.

Dioswurz.

A C O R V S, quæ & Venerea, ab Officinis quoque Acorus uocatur. M E O N, ab Officinis Meu. Exhibent enim tenellas quasdam radicales aromaticas. Quamquam sint, qui pro Radice interpretentur, quæ ab agyrtis circumfertur, & uulgo Beerwurz uocatur: cuius admodum feracem Hungariam prædicant: & quantum apparet, Anethi syluestris folijs & caulibus non dissimilis. Quod doctioribus propono discutiendum. De Ostetricio autem plane non consentio: tameris & ea sententia suos habeat asecclas. Nihil enim illi conuenit cum Anetho: neque radices habet tenues, sed crassas, & interdum ingentes pugnos æquantes.

Gelwasser
Gilgen.
μεν
Meu.

C Y P E R V S. Cyperi herbam non uidi, neque in officinis habetur. Radicis hodie usus notus est tantummodo, quam ipsi interpretantur, Wildengalgen. Sunt tamen qui ex Plinio interpretantur, odoratum, angulosum, uel triangularem luncum. Et ex Celso, lego odoratum, & quadratum luncum.

κύπερος.
Wilder
Galgen.

C A R D A M O M V M. Et hodie in Officinis peregrinum aroma celebre habetur sub nomine Cardamomi. Sic enim Arabes appellare maluerunt.

B
καρδάμωμον
Cardamoms
lin.

Commentarius noster quem habemus, pro spica N A R D I interpretatur Nardum: consentientibus & Officinis, quibus ego Pseudonardum potius nostratem crediderim. Sunt enim nouem species Nardi, quas ex Plinio collegit Barbarus.

νάρδος ἰνδική
συριακή

C E L T I C V M Nardum nascitur in Liguriæ alpibus, & ab incolis regionis suæ Gallica appellata est, nostra Lauendula, si Vergilio credimus. Et ego plane consentio. Nihil enim in toto Dioscoride descriptum lego quod illi repugnet. Quamque Officinæ Spicā Celticā interpretentur.

κελτική
Lauendula.

M O N T A N V M Nardum non ualeo conijcere quæ sit. Sed neque Commentarii aliquid huius rei certum demonstrant.

νάρδος ὀρενική
τολκαίτος νίρος
ἀσπρον

A S A R V M uulgo notissimum, Germanice Haselwurz. Mirum, quomodo non & illius nomenclatura uitata est & adulterata a barbaris. Ita uocant Baccare.

Baccare.

P H V, uel Cretica Nardus, sine controuersia nostra est Valeriana, Baldrian/oder Dennenmarck. Quod autem paulo minor nostra apparet quam descriptio habet apud Dioscoridē, regionis & influentiæ culpa est, non rei ignorantia.

ροή
Valeriana.

C MALABATHRVM. Distinguit huius tria genera Barbarus, uerum tertium cognitū tantummodo Medicis & officinis, id quod passim ostenditur, satis amplum, folio nucis iuglandis, sed aridum, subpallidum, & multo solidius. Ipsi Folium appellant, aut Folium Indum: quod inde adfertur.

DE CASSIA nihil pronunciamus: cum de ea adhuc apud iudicem lis sit, Lege autem Leonardi fuchsij propo. 12. de Errorib. Medicorū, pretereā Leoniceum, & Mainardum.

CINNAMOMVM notum est sub nomine Canellæ apud mercatores & Italos. De germine tantum controuersia est. Item de loco ubi proueniat. Consule fabulas Philostrati de Apollonijs uita, Item Plinium, & Theophrastum.

A M O M I semen in officinis seruatur eodem nomine.

Radix Costi.

C O S T V S. Pro triplici illo Dioscoridis Costo, Officinæ amarum tantum Costum exhibent.

σχοίνος
Squinantum

Odoratus I V N C V S in Aphrica & Asia nascitur, Cornelius Celsus Iuncum rotundum uocat: ut alius intelligatur ab angulari & quadrato. De quo supra in Cypero diximus. In Officinis instar straminis, sed bene, & nescio quid aromaticum redolentis, reconditum habetur, sub barbaro nomine Squinantij: feruntq; Camelorum esse cibū in Arabia.

Calamus.

καλαμος ἀρωματικός. Calamus aromaticus, uel myrsificos. i. unguentarius, & duratus, quamquam Plutarchus etiam arabicum Calamum interpretatur, ne ab Officinis etiam alio nomine appellatur.

ἐλάσμιον

B A L S A M V M nomine tantum notum, uerum propter eius precium inmensum, ab officinis exoletum. Xylobalsamum tamen seruatur.

δάρδιανος
Darlian.

A S P A L A T H V S. Radicis usus tantummodo habetur, a Maribus sub nomine Darlian.

βύβιν
Vinea.
Moschos.
Xyloaloes

B R I O N, id est, Muscus, Officinarum Vinea. Verum aliud est Moschos, Gazellæ fanies, preciosissimum illud odoris genus.

ξύλαλον, lignum est quod ex Arabia & India deportatur, ut inquit Dioscor. Medicorum uulgus Xyloalōen concorditer uocat, uel Aetio quoq; Autore.

νάρκαφτον

N A R C A P H T V M ex India defertur corticosum, simile Sycomori libro: quod iucundi odoris gratia sufficit. In nostratibus Officinis necdum uidi, sed & uocabulum quoq; incertum.

λάκκην
Lacca, uide
Dialacca.

C A N C A M V M arabici ligni lachryma est, Myrrhæ quodammodo similis, olidi gustus: quam ad suffimenta usurpant. pharmacopolarum est Lacca. Vide Dialacca.

κύπριν

C Y P H I Thymiamatis compositio est, dicata Dijs, qua abunde Aegyptij sacerdotes utebantur olim. Ab nostris officinis in usu non habetur, sed ne a Doctoribus quoq; scribitur.

C R O C V S meminini non notissimus.

Crocomagna, olei crocini fex, Instructiores officinæ reconditum ha-

bent:& autor Luminaris maioris non improbat.

HELENIVM nostra est Campanica Enula: de qua in Herbario nostro plura.

ὁμφάκινον ἔλαιον, oleum quod ex in maturis oliuis exprimitur, ab communi oleo in latrijs seorsum seruatur.

ἔλαιον ἐκ τῆς ἀγριᾶς ἐλαίας, oleum quod syluestres oliuæ fundunt.

σικυώνιον ἔλαιον, Sicyonium oleum. Vtebatur eo in aliquot malis antiquitatibus: nunc ex usu dispersit.

ELEOMEL in Palmyris Syriæ, ut inquit Dioscor. ex quodā caudice manat, crassius melle, sapore dulci. Commentarius noster uetustissimus quem habemus, pro Manna interpretatur: quod an ita habeat, per occasionem discutiendum relinquimus ijs, qui de origine Mannæ commentarios hodie scripserunt. Nam nos ad alia properamus, nec commẽtarium scribimus, sed nuda tantum nomina interpretamur.

Cicinū oleū e Cici arbore in Aegypto copiosa, ubi sine igne & aqua, aspersum tantum sale, exprimitur. Cibis scœdum: luminibus lucernarū, propter nimiam pinguedinem, ineptum. Vergilius diligens sane scriptor, pro Phaselo interpretatur. Sed nos in scriptis Rhapsodijis pro oleo de Cataputia maiore inuenimus. Ex Officinis hodie exoleuit.

Amygdalinum oleum, uel Metopium, duorum generum, hodie seruatur, & de dulcibus, & de amaris Amygdalis.

Oleum Balaninum secundum Hermolaum e Myrobalanis, uel Aegyptia Glande: secus Pandectarius scriptor, qui pro granis Ben, uel Benhen appellat. Hodie in usu non habetur.

Oleum Hyoscyami in priuato usu habetur podagricis.

Oleum de grano Cnidio, id est, de Cocco gnidio, ne illud quoque in usu habetur.

ἔλαιον κνίκινον, id est, e Cnico herba, uel Cartamo, effectū a superiore non diuersum.

Oleum Rhaphani, admodum protritum plebēis oleum.

Oleum Melanthinum, oleum de Nigella, uel Git, exoletum.

Oleum Sinapinum habetur in usu.

Oleum Myrteum, uel Myrtinum, & Italiæ quondā celebre, habetur in officinis.

Oleum Laurinum, uulgatum & celebre.

Oleum Lentiscinum, Oleum e Lentisco Græci σχίνον uocant, nam σχίνος iuncus est. Fit autem ex gummi Lentisci.

Mastichinum oleum, e Mastiche.

Oleum Rosaceum, quod extra myropolia etiam uulguis conficit, habeturque in usu, Rosæ oleo in Sole maceratis, & in uitro repositis.

Mel Rosaceum, quod eodem modo maceratur, & excoquitur.

ELATINVM OLEVUM e palma Elate, quā nostri Palmam abietem uocant.

A

ἐλέμιον
Enula Cam
pana.

ἐλαυρομήλο

κνίκινον ἔλαιον

Phaselus.
Oleum de Ca
taputia.
ἀμυγδαλίνον
B

καλλάνιον
Myrobalani
Grana Ben.

ἔλαιον ὑοσκούμα
νον

ῥαφάνιον

μελάνθινον

σινάπινον

μύρτινον

λάφρινον

σχίνινον

μαστίχινον

ῥοδαίνον

ῥοσένιδλ

ῥοδαμίδα

ῥοσένονιγ.

ἐλάτινον

C

Oleum Melinum, quod ex malis Citonijs fit & struteis.

Oleum Oenanthinum, fit ex flore uitis Labruscæ.

Telinum oleum, id est, e Fœnogreco, nobilissimo semine.

Sampsuchinum oleum, ex Amaraco, uel Maiorona.

Ocimum oleum, ex folijs Basiliconis.

Abrotinum oleum, quod fit ex Abrotono.

Anethinum oleum, in usu hodie habetur inter anodina.

Sufinum oleum, uel Lirinum, uel Liliorum alborum, quo nihil fami-
liarius parturientibus.

Oleum Narcissinum non conficitur hodie. Sed neq; de flore satis con-
uenit scriptoribus: ut in nostro Narcisso scripsimus, & infra quedam ad-
notauimus.

κρόκινον ἔλαιον ab autore Luminis maioris inter uulgata & commoda olea
recensetur.

Oleum Cyprinum neglectum, atq; hodie minime in usu.

Irium, uel Irinum oleum quod, fit ex Iride Illyrica.

γλῶκκινον ἔλαιον, exoletum.

ἀμαρδίνον, idem oleum quod paulo ante Sampsuchinum uocauit: sed ali-
am eius componendi rationem ex Coacorum consuetudine docet.

Megalinum oleum etiam Dioscoridis tempore exoleuerat, ut ipse in-
quit, ante sua tempora alioqui cantatissimum.

Hedychroon, & Hedychrum, a coloris hylaritate sic dictum, idem ui-
detur esse cum Amaracino, ut inquit Barbarus: nisi quod nomen hoc
proprie habet in Co, ubi nobilissimum olim parabatur. Quamquam est
& Theriaces eius nominis compositio: de quo alias in Pandectis nostris.

Metopium ex Galbano unguentum: sic dictum, ab ligno ex quo desu-
dat, quod Metopium uocatur, ut inquit Dioscor. Liquor, uel potius la-
chryma Metopij hodie seruator. Vnguenti usus nullus.

Mendesium, eo loco ubi Mendes, id est, caper colitur, ut inquit Barba-
rus: peregrinum Germaniæ.

Staete uocatur pinguedo recentis Myrrhæ, cum exigua aqua tuscæ, &
organo expressæ. Ea perquã odorata ac preciosa est. Sic dicta, ἀπὸ τοῦ στάζειν,
id est, stillando. Plinius simpliciter Myrrham sponte sudantem dixit: &
est gummi quod Storacem liquidam hodie uocant, quo ad poma odoris
fera & suffitus utuntur.

Cinnamominū unguentū, olim ad prodigium usq; in precio habitū.

Nardinum, uel Spicatum, sceminis Romanis, & precipue prædiuiti-
bus olim familiare. Vel potius Nardus pistica illa, cuius Euangelistæ me-
minerunt, si Barbaro credimus.

Malabathrinum, uel Foliatum, uidelicet quod e succo Folij eius no-
minis conficitur. Peregrinum, & exoletum.

Iasminum, sed aliud forte quam nostrum Violaceū. Quod inde con-
ijcio, quod apud Persas ex albis tantū uiolis confici solitum est, ut inquit

οὐρανθίνον

τέλινον

σαμψύχινον

ἀνέθινον

συσκινον

Gilgendl.

καρχύστινον

Violwurzgöl.

μεγαλίνον

ἡδύχρονον

D

μετόπιον

μενδύστινον

στακτί

Storax.

κινναμώμινον

νάρδινον

Nardus Pi-
stica.

μαλαβάρθρινον

ιασμινον

Dioscor. Sed & alia nostratibus conficiendi ratio est.

M Y R R H A nusquam non obuia in officinis, sed adulterina, teste Mainardo, Leonicensi, & Leonardo Fuchsio: ut infra leges.

S T Y R A X lachryma est arboris, malo Cotoneæ similis. Sed myro-

polæ mutata litera, Storacem appellant.

Gallicen lachryma est Saracenicæ arboris. Habetur in officinis, sed sub nomine Bdellij Iudaici.

T H V S notum. Sed sunt eius aliquot genera. Est enim Masculum: quod sic a specie testiu uocant, mammosum, cum herente lachryma priore consecuta. Plura de hoc Barbarus in Corollario. Officinæ tamen inter Thus & Olibanum differentiam faciunt. De quo in nostro Lexico, secundum sententiam Barbarorum & neotericorum.

Cortex Thuris & ipse sua iuuamenta habet, ex gummi notus & liquore, cui interdum mixtus inuenitur. Quamquã Vergilio magis placet corticosum Thus, idq; pro Cortice Thuris. Quod enim in eo laudatur, & medicinæ inseruit, Thus est: quo nisi turgeat cortex, inutilis erit.

Manna Thuris quid sit, infra ex commentarijs Leonicensi, Mainardi, & D. Leonardi Fuchsj petendum censemus: qui copiose admodum de ea, & differentia eius ab Saccharo differuerunt. Nam perplexior est controuersia, quam quæ paucis explicari queat.

Fuligo Thuris, an aliquibus in usu sit, nescio.

P I N V S & Picea, generi eidẽ distribuitur, sed specie differunt. Quia Picea pinguior atq; tenuior est folijs, sed minus alta, ac recta: præterea conum minorem, & magis algentem, nucleos quoq; resina perfusos obtinet. Lege Barbari Corollarium: similiter Vergilij annotationes.

Pinex nuces, de quarum differentia uide Vergilij commentariis: quamquam omnes sint notissimæ.

L E N T I S C V S arbor Germaniæ nostræ peregrina, Italiæ tamen familiaris. Mastychen destillat, notum gummi.

Refina lentiscina, Mastyx.

Refina Terebinthina.

P I X nihil aliud est quam fluxus combustior in tæda sua resinæ.

Pix sicca, uel spissa, ab Officinis Colophoniam: tamen si Dioscor. etiam li quidam illam Colophoniam uocat.

Bitumen: alias ab Officinis, Iudaicum Bitumen.

Babylonij Bituminis colamen, colore candidum. Inuenitur enim & nigrum. Ignoratur ab Officinis. Quanquam sint qui oleo Petroleo pro ea utantur: q; simili modo ex stagnantibus colligitur.

C V P R E S S V S & in Italia, & in Gallijs prouenit tantum, Germaniæ & frigidioribus climatibus ignota. Genera eius uide apud Dioscor. & cõmentarios. Galbulæ tantũ eius nuces a nobis in usu habentur.

I V N I P E R V S duorum generum, ut inquit Dioscor. Resudat ex eo gummi, quod Sandaracam, uel Vermicem hodie uocamus.

A

Myrra

Styrax

Bdellium.

Thus masculum.

Olibanum.

Manna de Thuris

Picea.

B

Mastyx.

Carpentum

Juden lym.

Oleum Petroleum.

Galbulæ.

- Seuenbaum. *εράβος*, Sabina. Alias Sauina. Nota.
 C *κιδρεος* arbor magna, ut ferunt, ex qua picem colligunt, quæ Cedria uocatur. Officinæ tamen Pegulam uocant.
 Cedria. Cedrides, Cedri fructus.
 Pegula. *ΛΑΥΡΥΜ* fructicantem uidi in nostra Germania: sed ad iustam & natiuam altitudinem nunquam excrefcere, neq; baccas parturire.
 Lorbeer. *Λαυρίδης*, Bacce Lauri, notiffimæ.
πλάτανος P L A T A N V S peregrina Germaniæ. Audiui, qui Romæ uiderint, & Florentiæ.
μελία F R A X I N V S, uel Melia, germanice, *Eschbaum*.
 Alberbaum. P O P V L V S duorum generum, alba, & nigra. Gummi exstillat nigra, quod Succinum, uel Electrum uocamus, barbære Charabe. Ita enim quibusdam placet. Vide Barbari commentarios.
 Electrum. Charabe. *μάκρη* M A C E R omnium consensu officinarum est Macis.
πτιλία Vlmus.
κάλαμος, Harundo. Nota, Genera eius innumera lege ex Barbari Corollario.
πάπυρος Papyrus ignota hodie.
μυρίκα M Y R I C A, seu Tamarix. Haud dubium quin sit uulgaris Tamariscus.
 D E R I C A æque famosa arbor, Tamarici similis, sed longe minor: cuius flore apes reprobum mel efficiunt. Germanice *Heyd*, scoparū generis.
κακαλίσ A C A C A L I S quadam tenus etiam Myricæ similis. Quam ipse nondum cognoui.
ράμνος Rhamnus trium generum habetur.
άλυμος, Halimus.
 P A L I V R V S frutex aculeatus, durus: cuius semen pingue & fuliginosum inuenitur. Vergilio, cognati frutices, senticosi sunt, Cynosbates, Rhamnus, Paliurus, & Oxyacantha.
ξενύκανθε Acuta S P I N A, Officinæ Berberis.
 Rubus Canis. Respondet & huic uulgatæ Berberis descriptio apud Dioscor. & huius plane generis est. In commentario quodam reperi, Rubum Canis differre ab Cynorhodo, uel Rosa canina: quia hæc spongiosas habeat circa fruticem, illa uero minime.
αύπρος L I G V S T R V M, a Mauris Alkana.
φιλλυρία T I L I A Lucorum ornamentum.
 Cistus, ignota mihi.
ιποκίστις H Y P O C I S T I S, barbarorū Hypoquistidos, quod sic appellant.
λάδον L A D A N V M in Officinis uidere licet: sed illi Lapdanum pronunciant, uel Laudanum, non Ladanum.
καίαιος H E B A E N V S iuxta omnia signa & notas quibus hanc describunt Hermolaus Barb. & Plinius, apparet quiddam habere nostro Guaiaco simile, aut certe eius generis esse: sed non habeo, cur id certo affirmem.

ROS A. Nota omnibus.

Pasulli rosei, id est, Trochisti

L I C I V M, alias Pyxacantha, arbor spinosa, ut inquit Dioscor. Hodie succum quoque eodem nomine uocant: qui in usu habetur.

A C A C I A succus spinæ crescentis in Aegypto. Refudat ex eo gummi quod Officinæ gummi Arabicum, Celsus sine eiptheto Gummi appellat. Vulgus Medicorum hodie ignorat quid sit Acacia, & pruna illa syluestria quæ in spinis proueniunt, pro uera Acacia interpretantur, graui errore: cum ipsi prorsus Dioscor. descriptio non respondeat. Sed de his alias.

A M V R C A expressæ oliuæ recrementum est.

ἄμυρ, latine Vitis, frutex qui circa fluuenta prouenit, passim notus: quam seminis tantum usum præferunt myropolæ, herbæ non adeo.

S A L I X & ipsa ut uulgo nota, ita multorum generum.

Oleaster, syluestris olea: sed non est horum ferax Germania.

Colymbades, oliuæ conditæ, & gulosæ diuitum delitiæ.

Aethiopie oleæ lachryma, forte id quod hodie gummi Elemi uocant.

Rhus opsoniorum, Rhus coriaria, ab Officinis omnibus Sumach uocatur, Italiæ frequens.

Quercus, Glans, Fagus, Ilex, Castanea, Galla, omnes notæ arbores, & noti fructus.

P A L M A M Aegyptus habet, sed non sola. nã & Romæ habetur. Fructus Palmarum Dactyli, & Thebaicæ Palmulæ, Tamarindi.

Malum punicum, seu Malogranatum, trium generum. Sunt enim dulcia, uinosa, & acida.

C Y T I N V S, Mali punici flos.

Malicerium, Mali punici putamen.

Balaustium idem fortasse quod Cytinus.

M Y R T V S, Italiæ nota.

Myrtidanum, uirgultum & soboles Myrti. Vide Barbari Corollariū.

C E R A S I A, alias Cerasa: quorum gummi in usu habetur.

S I L I Q V A, Maurorū Charliob, siue Charamulium sic enim officinæ uocant.

M A L V S. De Malorum multifarijs generibus, uide Corollarium Barbari super hoc loco.

Mala Cotonea, nota sunt. Vocantur & Cydonia, & Chrysomela.

Melomela, sic a sapore melleo dicta.

Orbiculata mala, siue Epirotica, ex figura orbis in rotunditatē acta.

Syluestria mala, acerba, agrestia.

Perfica poma, notissima, & multorum generum. Quanquam Galeus libro secundo alimentorum differentiam facit inter Perfica, & Perseam, diuersaque capitula de utraque habet.

Armeniaca, siue Præcocia mihi uidentur, quæ prima omnium uenalia habent.

A

ῥόδον

Gummi Arabicum,

ἄμυρ

κελυβάδης

Elemi,

Sumach;

Dactyli.

Tamarindi.

ῥόα

B

κύτινος

ἀπὸ τῆς ῥόας

μυρτίνα

Carliob;

μάλια

C Persica exilia, & Prunorum fere generis, sed dulcissima.
Citrin *δψελ.* Medica mala, Cedromela, Citrea, Mala Hesperidum, poma Citri, in officinis habentur, & ipsa nota.

P Y R O R V M genera ut sunt multifaria, ita passim etiam notissima.

αχράς **P**yrastrium, uel syluestre Pyrum.

M E S P I L V S nota, sed duorum generum. Est enim quæ Merola Italice, a Mauris Zaur, uel Zarur: & uulgata, quæ Setanium; cuius fructus Estula a nonnullis uocantur.

L O T V S. Nec ea unius generis habetur. In Italiam translata fertur, sed admodum rara. Est & herba Lotus, de qua infra.

Cornus, Italice Corneiol.

Sorba nota.

P R V N V S nota arbor, *πολυγυῖς*. Supra etiam inter syluestria Pruna constituimus. Celebrantur hodie inter præcipua Damascena: & in myro polis Prunorum resina.

A R B V T V S, Vnedo, coriarijs notissima. Habetur in Italia frequentior, ubi fructus eius Cerasa marina uocatur.

Amigdalæ duplices sunt, & Amargæ, & Dulces. Dulces Germaniæ familiariores.

Fisticum. **P I S T A C I V M,** Officinæ Fisticum. Fructus in officinis habetur:

D arbor Germaniæ peregrina est.

N V C E S Iuglandes, tam notæ, ut Sueuis occasio prouerbij fuerint.

Nuces Auellanae, Nuces ponticæ, & ipsæ quoque nemini non notæ. Vide Barbari Corollarium.

M O R V S nemini non notissima.

F I C V S, & Sycomorus notæ, tum in primis Italiæ.

Perseam uideo quosdam pro Persica nostra interpretari.

ιέρπιο **I B E R I S** officinarum Vicetoxicum. Nascitur circa inculta, & uiarum diuerticula, admodum familiaris Italiæ. Radici & odor & sapor Nasturtij. Vnde Barbarus ex Antigone non inepte, syluestre Nasturtium interpretatur.

E *¶* Ex Secundo Dioscoridis **L I B.**
E R I N A C E V S quidam fluminalis, uel marinus: quidam terrestris. Terrestris passim notus.

Purpuræ, Buccinæ, Ionix, Myaces, Tellinæ, & quicquid est piscium generis, mihi plane ignotæ sunt, nec ullius rei tam imperitus sum, quam Piscibus nomina diffinire.

C O C H L E A, quæ & Domiporta, nota.

Blactæ Byzantiae. Conchula Indica, hic apud Dioscor. *βυζ.* Suspicio esse Blactas Byzantias, quas hodie Officinæ sic uocant,

καρκίνος **C A N C E R** & ipse propter gulæ titillationem, commensalioribus non ignotus.

S C O R P I O Terrestris, Italiæ notissimus.

De Dracone marino, Scolopendra, Torpedine nihil compertum habeo, nec notiora nomina quæ pro illis reponā. Tamen si Torpedo crebro in usu sit Galeno.

V I P E R A a Mauris Trigo, & græce *ἰχθυόνα*, uulgo Amarafsa Italice.

CHRISTOPHORI HEGENDORF

fini, in quorundam Piscium nomenclatur

ras genuinas, Annotatiuncule aliquot.

D V M hæc scriberemus, incidimus casu in Progymnasmata doctissimi uiri Hegendorfini. Nam cū eodem munere fungamur pueros docendi, & domesticis nostris adulescentibus illius progymnasmata interpretaremur, oblatus est nobis locus de Piscibus: qui quoniam pulcre nobis facere uidebatur ad præsentem locū Dioscori, de Piscibus, commentario nostro ad uerbum inseruimus.

A N G U I L L A E.

De Anguillis non est quod diu dubitemus. uocabulum enim nullum aptius, nullū accomodatius ijs Piscibus, quos Anguillarum nomine donamus, inuenire possemus. Plin. lib. ix. cap. xxi. Anguillæ, inquit, octonīs uiuunt annis, durant & sine aqua senis diebus, aquilone spirante, austro paucioribus. At hyemem eædem in exigua aqua non tolerant, nec in turbida, adeoq; circa uergilias maxime capiuntur, pascuntur noctibus. Exanimis piscium solæ non fluitant.

Anguilla.

B

D E M U L L O.

Mullum uocamus ein Barne, de quo pisce Plin. ita scribit lib. ix. cap. 17. Ex reliqua nobilitate & gratia maxima & copia Mullis, sicut magnitudo modica, binasq; libras ponderis raro exuperant, nec in uiuarijs piscinis crescunt. Septentrionalis tantum hos, & proxima occidentis parte gignit Oceanus. Cetera eorum genera plura. Nam & alga uescuntur & ostreis & limo, & aliorum piscium carne. Barba gemina insigniuntur inferiori labro, &c. Quæ descriptio, an non nostris piscibus, quos Barmen uocamus quadret, nemo non intelliget. Porro quem latini uocant Mullum, græci *πρίλαν* appellant, Aufonius uocat Barbum, Germani ein Barb.

Mullus.
Barbus.

D E C A N C R I S.

Pisces, quos hodie uocamus Cancrones, Cancri ueri sunt, si Plinij in libro nono, cap. 21. descriptionem spectabimus. Et sunt, qui Cancros, quibus nos utimur, Camuros appellent, quod genus esse Cancrorum Athenæus libro sexto dipnosopistarum scribit. Porro de uarijs nihil reperio apud scriptores. Est uox a germanico sermone sumpta. nam germani dicunt, ein Vor. Tum Fundulus dictus uidetur, quod in fundo aquæ natet. Rubiculi a rubicundis oculis nomen acceperunt. Hæc uocabula noua sunt, nouorum & Germanorum Piscium. Perca plane semigermanum est uocabulum, ein Perse. Nec mirū, uocabula tam barbara irrepisse in linguam latinam, quando uocabula alia dari nequeant: quod aut

Cancrones.

Camuri.

Fundulus.

Rubiculus.

Perca.

plæriq; pisces ueteribus ignoti fuerint, aut quod nos ueterum uocabula, quod plane credo, fugiunt.

D E L V C I O.

Piscis uento
duratus.

De Lucio quoq; non ita multū in authoribus reperitur. At dum piscem uentoduratum dicimus, est periphrasis, qua quemlibet piscem uento duratum, designare possumus, ut est stockfish, schollen. Carpo quoq; semigermanum est, nec de pisce hoc aliquid literis est proditum. Hæc uocabula Piscium propterea excussi, ut iuuentus uideret, quam in Piscibus exprimendis, & ieiuni & inopes simus: sed ut iuuentuti faciamus gratū, aliquot uersus ex Mosella Aufonij adscribemus, quibus aliquot piscium genera, bellissime describuntur.

Squamigeri gregis ede choros, liquidocq; sub alueo
Differe cæruleos fluitanteis amne cætuas.

Squameus herbosas Capito inter lucet harenas,

Viscera præ teneris fartim congestus aristis,

Nec duraturus post bina trigoria mensis,

Purpureisq; Salar, stellatus tergora guttis,

Et nullo spinæ nociturus acumine Redo,

Effugientq; oculos celeri leuis umbra natatu.

Tucq; per obliqui fauces uexate Sarauī,

Qua bis terna fremunt scopulosis ostia pilis,

Cum defluxisti famæ maioris in amnem

Liberior, laxos exerceas Barba natatus,

Tu melior peiore æuo, tibi contigit omni

Spirantum ex numero non inlaudata senectus.

Nec te puniceo rutilantem uiscere Salmo

Transierim, late cuius uagæ uerbera caudæ

Gurgite de medio summas referuntur in undas,

Occultus placido cum proditur æquore pulsus:

Tu loricate squamosus pectore, frontem

Lubricus, & dubiæ facturus fercula cœnæ,

Tempora longarum fers incorrupte morarum,

Præsignis maculis capitis, cui prodiga nutat

Aluius, opimatoq; fluens abdomine uenter.

Quæq; per Illyricum per stagna binominis Istri

Spumarum indicij caperis Mustella natantum,

In nostrum subuecta fretum, ne lata Mosellæ

Flumina tam celebri defraudarentur alumno.

Quis te naturæ pinxit color: atra superne

Puncta notant tergum, qua luthea circuit irīs,

Lubrica cæruleus perducit tergora fucus,

Corporis ad medium fartim pinguefcis, at illinc

Vsq; sub extremam squallet cutis arida caudam.

A

Nec te delitias menfarum Perca filebo
 Amnigenos inter pisces, dignande marinis
 Solus puniceis facilis contendere Mullis.
 Namq; & gustus iners, solidoq; in corpore partes,
 Segmentis cœeunt, sed dissociantur aristis.
 Hic etiam latior risus prænominis cultor
 Stagnorum querulis uis infestissima ramis
 Lucius obscuras ulua, cœnoq; lacunas
 Obsidet; hic nullos menfarum lectus ad usus,
 Feruet humosis olido nidore popinis.
 Quis non & uirides uolgi solatia Tincas
 Norit; & Alburnos prædam puerilibus hamis,
 Stridentesq; focis obsonia plebis Alaustas.
 Teq; inter species geminas, neutrumq; & utrumq;
 Quin nec dum Salmo, nec iam Salar, ambiguusq;
 Amborum medio Sario intercepto sub æuo.
 Tu quoq; flumineas inter memorande cohortes
 Gobio, non maior geminis sine pollice palmis,
 Præpinguis, teres, ouipera congestior aluo,
 Propexiq; iubas imitatus Gobio Barbi.

PASTINACA Germanici maris piscis.

Roç.

SEPIA Piscis cuius ossibus hodie utuntur aurifabri & argentarij,
 ad aurum subinde fundendum. Meminit eius sepiissime Celsus.

Os Sepiæ.

CASTOR, uel Fiber, amphibion animal; cuius testiculos in Officiis
 uocant, Castorium.

Bibergeyl.

B

Silurum sunt qui pro Sturione interpretentur. Verum id non ita habere,
 contra affirmat Vergilius.

Sturio.

Mustela, Ranæ, Feles, notæ.

Cerrus, uel *εμπίς* quid sit, ignoro.

Mēnas an probe interpretatus sit Theodorus Gaza pro Aleculis, uide
 de Vergilij commentarium super hunc locum.

Aleculæ.

GARVM omne quod ex Piscibus, carnibusq; maceratis liquamen
 est. Salmora.

Cimices qui in cubilibus enascuntur, notiores quam commodiores.

κόπρις

Millepede, Multipede, Centipede, *μυλλεπίδες*, nullibi non in humidis &
 aquosis nascentes. Græci a liuido colore. etiam *ὄνους*, i. asinos uocauerunt;
 qd nomen Germanis hodie mansit. Nam & illi teutonice sic uocāt, *Spel*.

Wentelen.

σίλφην τοῖς ἀποκοπίοις, Blactæ pistrinariæ, quæ in pistrinis inueniuntur.

Beymmuch.

PVLMO NES Marinos nouerunt qui ad mare habitant, & uident
 mirabilia eius in profundo.

Suillus & agnitus pulmo, noti.

Pulmo Vulpis. Vſus eius ad Loh; quod ab eo sic inscribitur. Loh de
 pulmone uulpis.

B

C Afininum I E C V R, Genitale Cerui, Vngula asini, lichen es equorum, Vngula caprarum, Iecur caprinum, apri, canis rabiosi, ueteres Solee ueteramentariorum, nota omnia.

Iecur Mergi, Gallinæ, Gallinacei, Oua, Cicadæ, Locustæ, nota.

O S S I F R A C V S septimum Aquilæ genus.

Galerita, A. Gelsij Cassita.

H Y R V N D O, nuncia uera Veris, malegrata auicula, ut est in pro- uerbio.

Rasura Ebo-
ris.

Eboris scabiem Officinæ uocant, Eboris ramenta, uel rasuram.

ἄσφαλτος, Talus fuillus.

ἐλάφου κίρας
κάμπαι

C O R N V Cerui. Rasura eius in usu habetur.

Eruca quæ in oleribus gignuntur, notæ.

C A N T H A R I D E S ad ciendas uescicas in Officinis seruant, notæ.

Buprestis, Cantharidum generis.

S A L A M A N D R A, Lacertæ genus iners, uarium, quod frustra creditum est ignibus non uri. Italiæ nota.

ἀράχνη

Araueus multorum generum. De quo uide Barbari Cor.

Σεψὶς

L A C E R T A ubiq; nascens, & notissimus uermis.

σείψ

Seps, Lacertæ genus, sed uenenosum, ut placet Nieandro.

σκίλλιον

S C I N C V S male ab Officinis Stincus. Vocatur & terrestris Cro-

δ

codryllus. Ostenduntur in officinis parui pisciculi ex Nilo flumine.

Terreni V E R M E S, Intestina Terræ, Lumbrici, noti.

μυροδά

M V S araneus, muris magnitudine animal, & mustelina specie. In Italia uenenatus eorum ictus.

Mures qui in domibus oberrant, noti. Plura eorum genera, Alpini, Pontici, Glyres; & in his generibus diuerso colore & forma.

Lac notum.

Lac Schistum, uel Scissile, concreta eius pars, & casealis.

D E C A S E I S, & eorum generibus, uide Barb. Cor.

ἵππαι

H I P P A C E caseus equinus, alimentum rusticorum.

κοῦτρον e pinguiissimo lacte fit: uel spuma lactis concretior. A boue sic nominatum, quia e bubulo lacte potissimum fit.

Succidæ L A N A E, lana impura, sordida, nondum elota, uel purgata.

C O A G V L V M leporis, notum.

Adipis genera fere omnia in Officinis habentur. Medullæ quoq; & quedam fellis genera.

T R I T I C V M uulgo Frumentum. De quo uide doctissimam An- notationem Hermol. lib. Corollariorum.

H O R D E V M, alias Lutum Vulcani.

Zythum, Courmi, genera Ceruifiæ.

Zea priuatim a latinis semen est: & est genus frumenti quod uulgo Spel- tam dicimus.

κρίνον
Gryph

C R I M N V M crassior est Zea, triticeaq; farina, ex qua pultem fa-

ciunt: fortasse latine Cremor.

O L Y R A uulgo & Italice Secale, frumenti genus, sed minus nutrit A
ens quam Zea. Latine hodie Siligo, Quamquam refragetur Columella.
De quo uide Vergilij commentarium.

A T H E R A ex Zea tenuissime molita, sorbitio, quasi liquida pulvis
cula, infantibus conueniens.

T R A C V M frugem non noui. Neq; *εργάμων* quoq; geniculatum. Ali
oqui inter Vicia segetis ad instar Auenæ nasci dicitur, dependentibus lo
cistis. ut innuit Dioscor. uel lolijs, ut Plinius describit.

O R Y Z A frugum generis, Hordeum Galaticum, uulgo Rizum, pa
rati & quotidiani in sanitate usus.

ῥυζ.
Rizum.
χόνδρος

H A L I C A fit ex Zea: quam Dicoccum uocamus. Alias Far.

M I L I V M notum.

κίχρη
ήλυσος

Panicum, Milio simile.

S E S A M V M peregrinum hodie & incelebre.

D E L O L I O uide infra Hieronymi Tragi Annotationē priuatam.

A M Y L V M ex eo appellatum est, quod sine mola fiat. Ab officinis
Amydum. Notum.

ῤαψιμύελ.

Fœnogræcum notum.

L I N V M, cuius & oleum & semen Officinis est in usu.

ἐρίωνος

C I C E R, Germanice *ÿpserbſen*.

F A B A nota.

B

Faba Aegyptia, peregrina: radix tamen quibusdam in Officinis in ca
leolas secta habetur.

L E N S, alias Lenticula, nota.

P H A S E L V S, Germanice *pheseln*.

φασίλιας

E R V V M an sit Vicia, certo non habeo quod dicam, & cum de hac
re questionem mihi mouisset Io. Sinapius, amicus noster, & ipse quoq;
rei Medicæ apprime peritus, mutum me reperit. Quod ideo scribimus,
ut & alijs præbeamus ansam disquirendi. Alioqui Mauri interpretantur
pro suo Almelic. Et Commentarius noster, quem ex Feticchio Medico
habuimus, Bononiæ Mocka dici interpretabatur. Galenus etiam Apha
cen pro Vicia interpretatur.

L V P I N I in Officinis seruantur: quibusdam in locis Germaniæ sa
ti crebro, quibusdam infelicitè proueniunt.

ſeygbonen.

R A P V M notum uulgo, *ῥάπια* græce.

Rapa syluestria, quæ longiora, caule breui, & Rhaphani figuram imi
tantia, semine intus candido, duplo maioris quam Papaueris.

Buniada ignorant Officinæ, inquit Barbarus, & syluestris Rapi semi
ne eius uice utuntur, quamq; facile cognosci poterat. Est enim syluestri
Rapo semen & nigrius & maius quam Buniadis.

R H A P H A N V M Celsus uocat Radiculam, & alij quoq; Radic
cem, Habetur multorum generum, quemadmodum & Rapa: & iuxta

ῥαπίδι.

Cccli & regionis influentiam, figurā longitudinis & rotunditatis mutat.

Sed syluestris Rhaphanus meo iudicio est, quo Officinæ utuntur. Germanicæ, Meerrettich.

Mägelwurcz.

ο μαγανωρον

Saurama
pfler.

Rumex proprus multorum generum est. Primū Oxylapathon, id est, acutum Lapathium uocant Officinæ. Secundū hortense. Tertium agreste, & rotundum Lapathium. Quartū, quod Dioscor. Oxalidā, & Officinæ Acetosam uocant. Vulgo herba Brūsta. Est & Hippolapathon Rumex qui nascitur in aquosis. Vide de hoc Herbarium.

LAMP SANA Brassicæ generis. Alias Napium. Pedali altitudine, foliorum trium, quæ ei hirsuta sunt.

De Bunio Napi genere, incertus sum, ideo nihil pronuncio.

B L I T V M, uel Blitus, ignauum & notum olus.

Bappelster.

απράφνηστο

Scheissmilt.

M A L V A multi generis nota.

A T R I P L E X, olus aureum, duplici differentia habetur, Agreste, & Hortense satium.

Quæ uulgo S P I N A C H I A hodie, Atriplex Hispaniensis dicta est quondā: eo quod ab Hispania primū allata ad alias exterarum nationes.

B R A S S I C A E tria genera habentur. Primum, caulis uulgatus, domesticus. Secundum ignotum. Tertium marinum: quod esse Soldomellam, in Soldomellæ descriptione monstrabimus infra.

D

B E T A, τιτλον.

Bürgel.

ανδράκιν, id est, comestibilis illa Portulaca, nota est. Syluestrem non uidi.

A S P A R A G I in agro Moguntino crebriores proueniunt, ubi etiam edendo sunt, & in delictijs habentur.

ἀργυράσπον, id est, Plantago, per omnes suas differentias nemini non cognitissimum.

Canella.

S I V M, sub nomine Laueris Officinis est in usu. Alias herba Canelula, in acetarijs aquis potissime nascens.

Sischmüng.

Sisymbriū, Mentha aquatica ab Officinis, uel Balsamita: sic dicta, quod facillime in Mentham degenerat culta.

Sisymbrium alterum non uideo quid tamen aliud possit esse, quam Senetion, uel Nasturtium aquaticum: consentientibus etiam Commentarijs aliquot, quos habuimus: quamquā alibi etiam describat hanc Dioscor.

Cretamus.

fenick marin.

C R I T H M V M, Crithmon, uel Batis, id est quod Officinæ omnes Cretamum uocant. Est autem Cretamus Feniculum marinum.

Eanen süß.

C O R O N O P V S, Pes Coruinus, uel Cornicis: descripta est a nobis in primo Tomo Herbarij, sub hoc nomine.

σόνχορ

Cicerbita, seu Sonchus, aliq Cichoriū uocant, Rostrū est porcinū, quod hodie sic uocant in Officinis. Vide de hoc infra Añotationē Leoniceni.

σίριρ

Intybus, uel Intybum: nam utrunq; apud Pliniū & scriptores legitur. Longa est controuersia de Intybis: sed breuiter sic docti. Intybum agreste est Cichorium, uel Cicorea, ut uocant Officinæ, eaq; satia. Rursum satia duplex, Latifolium, Lactuce simile: quod Endiuia uocamus. Alterū

Endiuia.

folio angustiori, subamarum: quod tamen quo nomine baptizare rite de beam, non habeo. Addit Commentariolus noster, quem habemus. Notandum, cum Celsus de Intybo loquitur, de domestica intelligi debet. Quando uero de Ambubeia, Cicorea estimari debet. Plura de hoc infra.

Condrilla & scribitur & fertur folio similis esse Intybis & Cichorij: sed nemo mihi demonstrare ualuit. Meminit huius infra Hier. medicus.

κενδρίλλα

κερόυνθε

C V C V R B I T A. Hoc opus, hic labor est. Et uehementer hic erratur, nedum in nominibus, uerum etiam in re. Erroris causa: quia res non uidimus. Commentarius noster Bononien. sic distinguit. Cucurbita uulgo Succa est Italice, & notissima: Cucumis Italiae tantummodo notus, Germaniæ nequaquam. Melones sunt quæ uocantur Stapones, & Melo-pepones in figura & quantitate. Cum enim rotundæ figuræ sint, & mali effigiem referunt, Melo-pepones: cum autem magnitudine in longitudinem processerunt, Pepones uocantur. Torum hoc genus a Medicis Melones appellantur. De Citrino Cucumere, quem alij Citriolum, alij Citrullum, uulgo Citrion, quo in acetarijs & Monestris utuntur, non fit mentio apud Dioscor. Vide Barbari Corollarium super hoc loco.

Succa.
Cucumis.
Melones.
Stapones.
Melo-pepo-
nes.
Pepones.

L A C T V C A est duplex, domestica, & satiuæ, nota. Quamquam & illa multorum generum, atque aliter in Italijs, aliter in frigidiore solo prouenit. Syluestris (ut inquit Dioscor.) satiuæ similis est, sed longior caulis, & candidiora folia, quibus succus inest: ex quibus diuino, illud fortasse esse quod Scariolam, uel Taraxacon uocamus.

βρίδαξ
Lactich.

L E P I D I O N, uel Bifacutum, ignoratur nostra ætate, nec Commentarij aliquid certum indicant.

B

λεπιδιον

S C A N D I X, uel Scanaria herba. Hæc inquit Vergilius, hodie ab herbarijs ignoratur: & quam illi modo Scandicem appellant, latiore, & quasi Betæ folio est. Antiquitas autem, ut in re nota fit, nullas eius certas notas tradiderunt. Verumtamen ut ex multis conijcere licet, tenui & capillato folio est. Plinius lib. 21. cap. 15. inter sponte nascentes numerauit: coniunxit illi, ut uerisimile est, congeneres plures alias, quæ omnes tenui folio, & capillaceo sunt: præsertimque Caucalim, & Tragopogona: quæ a capillamentis, quæ pro folijs habet, Coma dicta est a Græcis. Ob quam causam non ab re penitus fuerit, similem in foliorum figura illis credere.

Coma.

C A V C A L I S, non est Coronopus, ut quidam falso existimant, sed Dauci generis, eiusque figuram, incisionem foliorum, umbellam adeo referens, ut a quibusdam Daucus credatur.

καυκαλίσ

E R V C A ideo dicta est *ερυμας* græce, quoniam commendet iura. Ad dicitur Lactuæ in acetarijs, & altera ab altera contemperatur.

ερυμας

O C I M V M Officinæ pro Basilicone interpretantur.

οκίμω

O R O B A N C H E. Ex maleficio, ut inquit Vergilius, nomen illi fecit antiquitas. Et quoniam fruges, legumina, Eruumque præsertim circum ligando se necet, Eruiagina dicta est: id enim Orobanche græcis significat.

οροβάνχη

Eruiagina.

Barbula hirci, breui caule, folijs Croci, radice longa, dulci, supina, ma-

τραγοσώγιον

C gno super caulē calyce, & cuius summo semen nigrum dependet. Italice, Barba de predt.

ὄρνιθος γαλον

ORNITHOGALVM. Ferunt uihil uilius, neq; frequentius habere agros, sed ego plane non uidi, quod equidem meminerim.

T V B E R A rorundæ radices sunt, sine caule, sine folijs flauescētes: quæ Vere fodiuntur, & cocta eduntur. Zuneſta tarenſola Italice.

σμύλαξ

Smilax Phasioli genus, scdm̄ Barbarū, reclamante tamē M. Vergilio. M E D I C A alia est a malis Cedromelis, quæ paulo ante libro primo egimus, herba, non fructus. Quidam iactant in Italia satam se uidisse, specie qua hic eam describit Dioscor. Mihi coruo rarior est albo.

κάρδαμον

S I N A P I ubiq; cibus admisceē, gratissimo obſoniorū condimento. Nasturtium Lactucæ temperamentum in acetarijs & obſonijs.

θλάσπιν

T H L A S P I. De ea infra consule Commentarios Mainardi. Neq; enim hodie agnoscitur.

ἱρίον

De Drabi prorsus nihil habeo, aut quod dicam, aut quod diuinem. Irionem interpretatus est Ruellius Erysimon. An inter fruges censerī debeat, uel inter olera potius, consule Commentarium Vergilij. Eruculam nobilem intrpretari audio, & admodum procliuem esse Bononiæ circa muros in loco qui dicitur, El marca. Ipse non uidi.

Piper, Gingiber, nota aromata.

Perficaria maculata.

Hydropiper in ripis puenit, sapore admodū acri, similis herbæ quam Officinæ Perficariam maculatam uocant: tametsi illa sine macula est.

πταρμική

Ptarmica, Sternutatoria.

στρούθιον

D S T R V T H I V M herba qua purgandis lanis utuntur, quæ eas eluunt. Saponariam quidam interpretantur. Alij id quod Mauri & Officinæ Condisi appellat.

κυκλάμενος

Barcharmarien.

C Y C L A M E N, alias Tuber terræ, uel terræ Umbilicus. Item Panis porcorum, & Panis terræ, a Mauris Barcharmarien, & officinis Arthanita uocatur: uulgo Pan porcū. Vide Vergilij commentarium.

Cyclaminus altera, quæ Capriolorum modo uicinis arboribus se applicat, flore candido, acinis Hederæ mollibus.

Δρακόντιον

Dracunculus duplex habet, Maior & Minor. Maior Serpentaria, seu Colubrina in Officinis: Minor, Serpentaria minor, p uias & sæpes repēs.

Winterblüm.

Aron.

A R O N species, Dracontij, uulgo Aron, uel Barba Aaron.

ἀσφοδελος

Arisarū congener esse scribitur Aro & Dracontio, sed mihi ignota.

Asphodelus. Suspicio esse quam Auicenna & Officinæ omnes Affodillum nominant: de qua infra uide iudicium Hieronymi Tragi.

Bulbus Vomitorius, & Bulbus Cibarius, Ceparum genera.

σμίλλα

S C I L L A in Officinis suspensa, sub Squillæ nomine ostenditur, cepa ingens: Alias Cepa muris.

Pancration. Eandem, inquit Vergilius, non similem Scillæ Pancration, hac nostra ætate Herbarij ostendunt, confunduntq; simul, alioqui diuersa genera: tanta natalium similitudo & mixtura est. Nos utranq; su

mul uisam, p̄terq̄ colore, & id qdē nō satis, diuersā secernere nequimus.

CAPPARIS fructus in Officinis seruatur ad nocturna obsonia.

LEPIDION. Vergilius. Herbarij modo hanc non Lepidion, sed Rhaphanum appellant, in Pannonia frequentem, ubi ferunt eam non aliter quam radices Stobæ. Commentarium habemus in quo scriptum inuenimus. Lepidium aliquibus Rhaphanus minor, uulgo in Germania Meerrettich. Sed hæc quomodo cum syluestri Rhaphano conueniant, non uideo, quem supra interpretati sumus, Meerrettich: quæ descriptio magis quadrat rei, quam præfens Lepidio.

RANUNCULVS aliquibus Apium Rifus, alijs uero Corui = nus pes. Vide infra Annotationem Comit̄is de Aquila de hoc.

Fremium non noui.

Argemone, uel Agrimonia. Vide infra Collinutiũ, & Leonicum.

Anagallis, Morfus gallinæ Officinarum.

Hederæ multiplices sunt, sed cognitæ.

CHELIDONIA duplex, maior & minor. Maior uulgata Chelidonia; Minor, Testiculis sacerdotis.

Auricula MVRIS, quamquam duorum fere generum describitur a Dioscor. tamē unũ cognitũ Herbarijs uulgo, quod in usu est Officinis.

Isatis satiuæ. De hac uide infra Leonicenu. Quidā congenerē faciunt herbe Lunarię, de q̄ paulo ante. Alij qd sit Nil, uel Maurorum Nilecha.

TELEPHIVM a quibusdam Sedum uocatur agreste. Opinor esse quam Officinæ Crassulam maiorem uocant. Italice, Frangrossa.

¶ **EX** Tertio Dioscoridis **LIB.**

AGARICVS quid reuera sit, uide infra in Annotationibus, Similiter & de Rhapontico, & Rhabbarbo, apud Leonicum Collinutium Mainardum, & Fuchsum.

GENTIANA etiam in sylua Hercynia copiosa habetur, maxime montanis; & hodie ab agyrtis circumfertur, ad mulomedicinam.

ARISTOLOCHIA utraq̄ nota.

Radix dulcis. Tabernæ aromatarie uocant Liquiritiam.

Centauriũ, & ipsum quoq̄ duplex. Maius, & Minus. Minus notum, qd Febrifugā uocant. De maiore uide infra Hieronymi Tragi Anno.

Chameleo albus, uulgo herba Carlina, de qua infra in Anotationib.

Crocodilion, Spinarum generis, ignotum mihi.

LABRVM Veneris, Virga Pastoris maior, uel Carduus fullonũ.

Spina alba, Arabum Bedeguar, uel herba de Casa.

Spina Arabica, albæ spinæ similis est, ut inquit Dioscor.

SCOLYMOS, Carduorum generis.

De Poterio nihil certum lego.

Acanthion Albę spinę simile, folijs aculeatis per extremitates, & lanugine araneosa obductis; q̄ collecta, & in unũ aceruata, bōbicis effigie p̄bet.

Acantha in Veteri cōmentariolo, p̄ Branca interpretatā inuenimus.

A

Capres.

Meerrettich.
Confer hæc
cum capite su-
periori de
Rhaphanis.

Carpaxov
Apiũ rifus.

ανιμων
αργιμων
Odermenge;

χελιδον
Schelwurtz.
Pfeffen hōda
lin.

B

Crassula ma-
ior.

Rhaponticu.
Rhabbarbu.

Engian.

Solwurtz.

Tausentgula
den Frankfurt.
Febriluga.
χαμαιων

Sarten dyffel.
Bedeguar.

C Spina syluestris Carduo similis, aculeata, breuior quam quę in hortis, satisq; provenit.

A N O N I S spinosa, post Ver: folio Rutę aculeata, ramis ut tribulus. Nascitur solo culto, præcipueq; in segetibus, aratro inimica, uiuaxq; unice. Hanc uidi quidem, & passim obuiam est, sed germanico nomine designare non ualeo.

ανυκαυθα

Spina alba, alia a superiore Alba spina.

τραγανθα

Tragacantha in Creta tantum, & Achaia nasci traditur, etiam Spinarum generis. Est etiamnum Tragacantha lachryma, quę uulnerata radice manans concreuit: & habet hodie in Officiis sub nomine, Dragati.

Dragantum.

ερυγγιον

E R Y N G I O N uulgo *Συνφε* uel Centumcapita, ut interpretatur Barbarus. Quamquam sint duo eius genera.

A L O E ex Officinis nota.

Wermüt.

A B S I N T H I V M uulgare, notum.

Absinthium marinum, Camphorata.

Strabwurz.

Abrotanum

Hyssopus

Omnes notę herbę.

Isop.

Origanı genera

Pulegium

Doft.

D E D I C T A M O uide infra in Annotationibus. Nam quę in Officinis ostenditur radix alba, potius Pseudodictamus est.

Poley.

Spiriam.

Brauser balsam.

S A L V I A, nota.

υδιωσμοσ

Wilder balsam.

M I N T H A quoniam odore suo suauissimo mentem excitat. Vulgo Balsamita.

Eius species sunt Menthastrum, hirsutius folio, & prorsus maiore, D grauiore odore, in hortensi & rustica re cunctis nouissima.

Viepf g.

Bärgenfraut.

Calamintharum generum, ut inquit Dioscor. ex quibus tertium solum Officinę Neperam, Calamentum, uel herbam Cattę uocant.

T H Y M V S ab omnibus cognoscitur, furculosus frutex, exilibus folijs, & angustis circumdatus, capitulis in cacumine flore purpureo, refertis, tempore quo floret.

Alias Cunila

S A T V R E I A, Tymbra, in hortorum delitijs seritur, Tymo similis, minor tamen & tenerior.

Quendel

Maïoron.

S E R P I L L V M utruq; domesticum, & syluestre notum.

μελιλωτος

S A M S V C H V S. i. Maiorona nota.

Sertula Campana: sed non ea quam Officinę uocant Melilotum.

M A R V M ignotum, & Aegyptia potius herba.

O C I M A S T R V M, Ocimo similis, odora, sed hirsutior.

εκαχιδρις

Caryophylli.

B A C C H A R. Non desunt, inquit Vergilius, qui genus esse floris existimarent, quem modo Caryophyllon uocant, sed syluestris. Nunc altilis ij spectantur, ab odore ita cognominati: tanta uarietate, amplitudine, pulchritudine, ut Rosę pares, non inferiores spectari possent.

R V T A nota.

M O L Y, hodie syluestris Ruta, ut inquit Vergilius.

Panacis tantū gummi, & succus seruatur in Officinis, Cetera ignota.

LIGVSTICVM, Officinæ uocant Leuisticum.

PASTINACA, nota.

Seseli, Latum Ciminum: pro quo Officinæ Silermontanū ostendunt.

Seseli ethiopica, dignitas secunda. Hoc nigrius est, & nascitur hodie q̄ apud nos, sed frustra, Medicis, Officinisq; incognitum.

Pariter Peloponnesse, & Creticum Seseli.

SISON, De hoc nihil usquam apud quenquam scriptorem certum extat: propter importunam quandam & imperfectam historiam.

ANISVM, Apio simile est semen, magnum, feruens, oblongum.

CAROS, hoc est, ut inquit Barbarus, quod Plinius Carium, uel Carum appellat. Athenus Pastinacam maiorem esse putat, multo præstantiorem sapore, quam Pastinacam uulgarem.

ANETHVM Culinis notum.

CIMINVM, identidem.

AMMI, Cumino simillimum, tantum candidius, & exilius. Officinæ Ameos uocant.

CORION Officinæ Coriandrum, uulgaris est noticiæ.

Hieracia maior, Lactuca rotundior & breuis: dicta ex eo, qđ accipitres scalpendo eā, & oculis succo tinctis, obscuritatē cū sensere discutiunt.

Hieracia parua, seu minor, autore Pandectario, Rostrum porcinum, siue ut alijs placet, Dens Leonis. Secus alijs, quorum opiniones uidē infra in Annotationibus.

APIVM multorum generum habetur, Domesticum, Palustre, Rusticum, Saxatile, & id genus alia. Nam & Ligusticum, & Cherephyllon inter Apia annumerant, de quibus infra in Annot. De omnibus autem ijs Commentarius Bononien. Doctoris Theobaldi Fettichij sic fere habet. Apium domesticum, apud aliquos herba Petroselinum.

Apium palustre, uel Aquaticum, forte id, quod ubiq; pro Apio domestico Officinæ ostendunt.

Apium Saxatile, Petroselinum in faxis proueniens.

Holusatrum, grande Apium, ab Officinis Petroselinum Macedonicum. Secus alijs: de quibus infra.

Smyrniōn eiusdem generis cum Holusatro.

FENICVLVM, Marathrum, nota.

DAVCVS, gallica Pastinaca, de quo Barbari uidē Corollarium, Celebratur in Officinis Dauci semen.

DELPHINIVM, de quo sic Vergilius. Quam nostra ætas Senam Officinis omnibus, & uulgo notam uocat, antiquitas, ut opinati aliqui sunt, Delphinion appellauit. Consule eius Annot. super hoc caput.

πύρρα, uel herba Saluaris, passim ex Officinis notissimum.

Rosmarinus, uel λεγαντίς, herba coronaria, & nemini non cognita.

Sphondilium ferulam differentem non nisi folijs a Panace, frequens, ut inquit Barbarus, gignunt palustres agri Parauini.

Leuisticum

Basteny

Silermontanum.

Enys

Pastinaca, maior.

Syllen, Bymich, Ameos.

Coriander, Lactuca rotunda.

Rostrum porcinum.

B

stuv

Δελφίνιον Sena.

Bertram.

- C** *νέρλας*, id est, Ferula, calidis nascitur locis, atq; trans maria, similitudine referēs Feniculū: e cuius caule stillat qđ hodie i officinis Segapenū uocat.
- Segapenum.** P E V C E V D A N V M, seu Peu cedanus nomen a Pinu inuenit. Officinæ tale fere exhibent quale hic Dioscor. describit, tantum radice non succosa, nec graui odore, sed iucundo: uocantq; Feniculū Porcinū.
- Feniculum porcinum.** G I T H, siue Melanthon, ipsa est Nigella, Maio & Iunio mensibus in pratis, sepibus, limitibusq; omnibus nascens, nihilq; eo frutice uilius, simul & frequentius. Vocatur etiam alio nomine Torminella.
- Natten.** De Laserpitio, & Maoudari optima atq; doctissima quęq; Barbarus atq; Vergilius: & inibi de Lasere, Opo cyrenaico plura. Quamquam & Medici, & Officinæ modo etiam re & uoce pro Asa foetida utantur, quę prauissimi odoris est, atq; tantum differt a Laserpitio, quantū a mellefel.
- Nigella.** S A G A P E N I V M ferulaceę herbę succus est, quę in Medianas scitur: ab Officinis Serapinum.
- Torminella.** E V P H O R B I V M, gummi ex Euforbia Libyca arbore, quę Ferulæ speciē habet, ex Officinis notū, nam in usu Medicis hodie existit.
- Asa foetida.** Galbanum quoq; & Ammoniacum, & Sarcocollam ex Officinis pete. Nec enim difficulter exhibent quidam, quibus bene uolunt.
- σάραπινον* **Serapinum.** Glaucium & a Mauris, & ab Officinis Memitha: & in instructionibus Officinis seruatur.
- Memitha.** Glutinum græce κόλλα, notum. Prestantissimum quod fit ex auribus tauorū, & genitalibus: sed adulterat nihil æque. Vide Barbari Corollarium.
- Lym.** Gluten Piscium, græce ιχθυόελλα. Piscis cui glutinosum est corium: idem q; nomen Glutino eius: quod alij ex corio, aliqui ex uentre putant fieri.
- Sausen bloße** Vfus eius ad congelanda fercula quę Galatina uocant.
- Mystel.** V I S C V M Officinæ uocant, Viscum quercinum.
- D** Aparine, Rubea minor, Italice, Grapella.
- αλυσσον* A L Y S S O N differt a Rubea folijs tantum, ramisq; minoribus. Itadictum, quod rabiem canum defendat.
- ασκλεπιας* **Gundelreth.** Asclepiadem herbam quidam Commentarij, quos habemus, pro terrestri Hedera interpretantur.
- A T R A C T Y L I S, spina de genere Carthami: fertur esse admodum uulgaris, sed mihi incognita & inuisa, quod equidem meminirim. Vergilius pluribus depingit.
- Polycnemon Cunilę bubulę similis appingitur, folijs Origani, caule Pulegij, geniculis multis interceppta, sine umbella.
- Clinopodion, Serpillo similis, etiam si non serpat, aut eadem, aut propinqua illi esse uidetur.
- Leontopedalion, uel Leontopodion, neq; ex Commentarijs, neq; ex doctorum hominum interpretatione ualui consicere quę nam esset.
- Teucrion, uel Teucris, ignota.
- χαμείδρις* Chamedryos ab officinis, uel Calamandrina. Leucas, incerta.
- L Y C H N I S noctu lucere creditur, & ut nomen ex re illi factum in

dicat, ignis fulgore quodā uidentū oculos in se conuertere: non aliter q̄ A
felium oculi flammārū modo in tenebris lucent, & putres in humidis cau
dices eodē tempore ignium speciem quandā uidentib. afferunt. Nasci
turq; in locis humentibus, foliorum uiolæ albæ. Plura non lego.

Lychnis sylvestris, Pes accipitris, uel Hieracopodion: quamquam ac
cipitrinus Pes apud nostrum uulguſ est quæ Corneola quoque dicitur,
folio Salicis fere puſillo, flore ſubluteo, cum ſiliquis Ciceri ſimilibus, &
cum his ſemen inficere capillos dicunt, colore rubeo. Qualis autē ſit Pes
Milui, dicta Columellæ inter herbas, ipſe non explicauit.

B A L L O T E, Marrubium nigrum, Officinæ, Præſſium foetidum.

Meliſophyllon ſuſpicoſe eſſe noſtram Meliſſam.

μυλίσφυλλον

Andorn.

Præſſium, Marrubium, idem: nam utrumq; nomen Officinis in uſu.

Stachys Marrubio ſimilis, ut inquit Dioſcor. Hermolao uiſa Romæ,
ubi, inquit, & Nauiculam, & alij Coronatam herbam uocant.

P H Y L L I S, uel Phyllitis, ſecundū omnem deſcriptionē Dioſcor.
oportet eſſe quam Officinæ Scolopendriā, uel linguā Ceruinā uocant.

φυλλίτις

Sirzang

Phalangium ſlos lilio rubro ſimilis.

T R I F O L I V M aut acutum, aut odoratū. Sunt enim multa eius
genera. De quibus uide Vergilij & Barbari commentarios.

τριφύλλον
Sic.

Polion montanum ex Officinis notum. nam crebro illis eſt in uſu.

S C O R D I V M uerum hodie ignoratur. De quo uide infra annoſ
tationem Mainardi. Quidam uocant paluſtrem Trixaginem.

B E C H I O N, & ipſa Tuſſilago. Commentarij quidam interpretan
tur pro Vngula caballina: quod mihi tamen non probatur. Niſi alia ſit
Vngula, quam quæ mihi haſtenus eſt comperta.

Vngula Ca-
ballina.

Roſſhüb.

B

A R T E M I S I A nota eſt. Eſt duorum generum.

Ambroſia uagi nominis herba, & circa alias quoq; fluctuans, non fa-
cilis inuentu, alijs aliter eam oſtendentibus, & cum Artemiſia tamen mi-
ſcentibus cunctis. Vergilio uidetur peregrina eſſe orbi noſtro, & Cappa-
docie potius familiaris.

Botrys, & ipſa Ambroſiæ, uel Artemiſiæ ſpecies.

κότρυς

γυράνιον, herba Gruina. Officinæ hodie Roſtrum Ciconiæ, uel Acum
muſcatam uocant.

Storcken
ſchnabel.

Graphalion quaſi herba fullonia, ſiue tomenticia, latine Centuncu-
lus, uel Centuncularis, Italice Centnorſe. Vulgaris herba eſt, inquit Ver-
gilius, candicans ſemper, præſertimq; in maturitate. Folia eius non adeo
magna ſunt. Flores minimi, & ipſi albeſcentes. Cum creuit, ſternitur per
terram. Nascitur pingui ſolo, præſertimq; in marginibus itinerum, in
hortis, & inter uites. Nullius noſtra ætate uſus eſt, neq; quicq; in Herba-
rum cenſu uilius modo, & neglectius uiret: & cū aruit, minus cognoscit.

γροφάλιον

Centunculus

T Y P H A herba paluſtris, de qua ſic Dioſcor. Folium Cyperidi ſi-
mile habet, caulem album, leuem, æquabilem, florem in cacumine ambi-
entem denſum, qui in pappos ſoluitur: quod lanuginem quidam uocāt.

C

κίρκαι olim nota, ut inquit Vergilius: nunc quod uiderim, aut audierim, nulla nisi in ueterum, Plinijq; commentarijs audita.

ῥινδύβα

Filipendula.

OE N A N T E fortasse ea, aut illi similis quam Officinæ Filipendula iam uocant.

C O N Y Z A, Pulicaris, quia pulices necat.

Neyenblum.
lin.

Hemerocallis, Miliun syluestre, fortasse flosculus, aut illi similis quem in priori Tomo pinximus.

Gel Violaten.

LE V C O I O N, *λευκοίον* græce, Maurorū keiri, uel Viola matronalis, Crateogonon fama tantum notum & fide ex Autoribus.

φύλλον, id est, Folium, incertæ historiæ.

S A T Y R I O R V M quinque genera pinximus & descripsimus in Priori Tomo, & nuper Sextum nobis exhibuit Io. Melbrey herbarius, simile prioribus, sed albis omnino flosculis.

De Horminio quid sit, uide infra Collinutū, & Nicolaū Leoniceū.

S E C V R I D A C A, uel *ἡδύσαρον*, similis Gith, & in segetibus nascitur, figura qua eam hic describit Dioscor.

ὄνοσμα

Schblum.

O N O S M A ignoratur.

ἄνδροσευος

N Y M P H A E A, Cacabus Veneris, uel Officinarum Nenufar.

ἄσπληνον

Androsaces herba Syriaca, & nostro orbi incognita.

Scolopēdria.

Sürzung.

A S P L E N V M, uulgu ubiq; Splenium: quod longitudine, latitudineq; sua fasciolæ, & ut sic loquamur, emplastelli formam habet. Hodie Scolopendriam, a Scolopendrarum similitudine & figura, quam habet, foliosum magis cespitem quam Plantam uocant Officinæ.

ἀνθύλλιον

D

A N T H Y L L I S, Solalstrum, Chamemelo similis herba per omnia, ut inquit Vergilius, & in flore, & in colore.

Anthemis uerum Chamemelum, uel Chamomilla, trium generum hodie cognitorum.

P A R T H E N I V M, uel Solis seculum, ut uocant Romani, quidam opinantur esse quam Matricariam uulgo uocamus. Alij eam quæ Cotula foetida dicitur: tam similis quoque Chamomillæ, ut uix dignoscatur, nisi per odorem.

ἐρυθθαλμος

Ochsenzung.

B V P H T H A L M V S, De hoc in Tomo priore sententiam nostram diximus. Hodie a quibusdam Cotula creditur. Ab alijs ea herba quæ in Italia Bauzoar uocatur: quum hæc albos, illa luteos flores habeat. Sic enim in Commentarijs legimus.

Peonien

blum.

Sünigeblum

P E O N I A, uel Casta herba, nota passim. De qua sic Vergilius. Vidimus nos, renascentemq; aliquot annis utramq; Peoniam obseruauimus: & ex his quas habebant ambæ præcipuas & certiores notas, folia scilicet, caules, folliculos, & in folliculis semina. Nihil scriptoris huius historiæ aptius respondere uisum est.

λίθοςπερμον

Lithospermon, Lapidum semen, seu Miliun solis, habet enim ceum milij semen durissimum inter colicolum & folium.

P H A L A R I S herba sic explanatur a Vergilio. Ostenderunt nos

his herbarij aliquando uno tantum culmo, & magis quam caule, aut ca-
lamo surgentem: uerioresq; Plinij, quam scriptoris huius historiam fe-
cerunt qui thyrsum habere tenuē, longū ceu calamū eā ait. Erant & in ea
quā uidimus folia alternis hinc & hinc p̄ interualla toto caule disposita:
& in sumō ceruleus spicatus flos, sed raris in spica illa florib. In Comen-
tario nostro Bononiē. lego. Phalaris hodie uulgo Bononiē, Pamizola.

Rubea, p̄culdubio nostra Rubia tinctorū, & ea quæ scriē copiosa ad
modū in agro Hagenōico, & q̄ in sepibus, umbrosisq; locis ubiq; nascit̄.

Lonchitis forte Cannarum generis quæ in humentibus proueniunt.

ALTHAEA, id est, Hibiscum, de genere Maluarum.

ALCEA, uel herba Simeonis, ut uocant Officinæ.

ANAGYRIS. Hanc aliquando suspicati sumus esse herbam Gra-
tiæ dei, nam & illa ingrato odore existit, cum plerisq; alijs signis quæ ha-
bet: uerū cū frutex sit arboris instar Anagyris, parū firma uidet̄ suspicio.

CEPAEA fertur Portulacæ similis, sed herbarijs hodie incognita.

Alisma in aliq̄ Comentarijs, p̄ Fistula pastoris interpretatū repimus,
in alijs pro aquatica, uel palustri Plantagine. Alterū nobis magis p̄bat̄.

Onobrychis incognita hodie.

Hypericū apparet esse quā & Officinę Hypericō, & Perforatā, uel her-
bā S. Ioannis appellāt. Quamq; & qd sequitur Ascyrū, uel ἀσχυρίς pro
pius nostrati accedere uidet̄. Est & qd Andrefemō uocat̄ Hypericū, Hy-
perico simile, cauliculis maioribus, densioribusq; ac magis rubentibus:
quod in uinetis gignitur, & medio autūno effoditur. Hypericū quod Co-
ri uocatur, & Vergilius affirmat sibi exhibitū ab Herbarijs, necdū uidī.

Chamepitys, græce χαμημίτης, ab Officinis uocatur Camepiteos, sed aliq̄
aliā ostendūt: & quemadmodū diuersarū herbarū hec nomēclatura est,
ita diuersas quoq; herbas, p̄ Chamepity exhibēt herbarij. Sane quā Lu-
cas aucuparius uobis uidendā p̄buit, ualde diligēs & rerū peritus phar-
macopola, nō admodū abludivit ab Dioscor. hac descriptione: quāq; qd
hic scribit̄ de hirsutis & suppinguibus folijs, nō plane deprehēdi. Vnde
mihi suspicio oriē, necdū uerā sibi cōpertā habere Chamepityn pharma-
copolas: cū tā diuersas herbas sub hoc nomine p̄ferant. Et qd pene exci-
derat, est herba cui lux nomen est, & ipsa in magno usu barbaris scrip-
toribus pharmacorū, quā p̄ Chamepity qdā diuendūt: de q̄ in sequentibus

B Ex Dioscoridis L I B. Quarto.

ETONICA duorū generū est, Mas, & Foemina, Alba, & Ru-
bea, uel Fusca, ut uocāt Officing, Vtraq; celebris, & nota.

Lyfimachia, uel Lyfimachion, herba tinctorū, siue Citrina, ab alijs Lu-
thea, uulgo Corniola, autore Leoniceno: eo quod lutei ei flores sunt.

POLYGONON, uel Sanguinaria. Credo esse quam Officinæ
uocant Centinodiam. Quamq; commentarij quidam, etiam Peram pas-
toris, & Corrigiolam pro Sanguinali herba interpretentur

Polygonatum existimatur esse Officinarum & Arabum Secacul.

A

Spergularia

Ybis

Sigmara
wur.

S. Iohannis

S. Iohannis
fraut.

B

Cori.

S. Iohannis

Iua.

S. Iohannis

Sanguinaria,
Weggras.

C Clematidem primam Commentarius noster Bononiēn. interpreta-
tur pro Peruinca: & belle mea quidē sententia. Et alteram pro ea quam
Peruinca.
Yngryen.
Flammula.
Officinæ hodie Flammulam uocant.

Polemonia, ipsa est Ruta agrestis.

S Y M P H Y T O N Petrum, nos Alū Gallice uocamus, ut inquit
Barbarus, folijs paruis, ramis tribus, aut quatuor a radice. Nascitur in pe-
tris, ideoq; Petrum cognominant. Symphyto autem græci nomen im-
posuere, quoniam consolidet. Hanc Veneti inquit, Cotoneā appellant.

Symphytum alterum, Solidago, uel Consolida maior, notissima.

H O L O S T E O N, sine duricie esse herba dicitur, etiamsi ab offe no-
men habeat, sed triuialibus herbarijs plane ignota.

Stoebe Dioscoridē uulgaris noticiæ herba, nobis ignota.

V O L V C R I diuersa habentur genera: uerum maius id esse con-
tendunt in Dioscor. quod Officinæ uocant Materfylua, & Caprifoliū,
Italice Braccabosta.

Tribulorum, Carduorum, & Spinarum infinita sunt genera, de quib-
us olim plura, ubi & plus ocij nacti fuerimus, & in rerum cognitione
altius quiddam promouerimus.

Saxifraga. Saxifagon, nostra Saxifragia. Sed triū generū: hodie notissima.

D **L I M O N I V M**, syluestris Beta, ut existimant.

LAGOPVS, Pes Leporis, uel Leporis Cuminum, Leporino pe-
di similis est, & nota hodie. teutonice, *Hasenfüß*.

M E D I O N, uel Trifolium odoratum, apparet esse Liliū aliquod
odoratum, & *τρίφύλλον*.

Epimedium, Romane Vindicta, non assequor quæ sit.

Schwertel. **X I P H I O N**, id est, Gladiola, uel Genitalis. Hæc est Gladiolus il-
la, cultellato folio herba, cui a principio statim Iridis folia hic compara-
uit: ut inquit Vergilius.

Sparganion folia quocq; Gladiolæ habet, sed arcuata, & in terram ma-
gis procumbentia.

X Y R I S, uel Iris agrestis. De hac uide commentarium Vergilij, qui
pluribus illam notis, & a se uisam pingit.

A N C H V S A quæ esset, aut saltem eius aliquod genus, a nemine
unq; potui perdiscere: nisi quod in Commentario Bononiēn. uetustiss-
mo scriptum reperi. Anchusæ genera reperies Bononiæ in loco qui dici-
tur, El Marcia grand. Ibidem nihil uilius crescit. Folia habet partim La-
ctuce, partim Buglossæ similia.

Ocimaltrum, syluestre Ocimum.

G R A M E N, uulgatissimum inter herbas, sed longe aliud quam qd
uulgus Gramē uocat: geniculares in ramulos serpit, a quibus crebro radi-
ces spargit dulces. Gramē harundinaceū, Gramē Parnasi illius spēs sunt.

De Siderite, & eius speciebus ingenue fateamur cum M. Vergilio, in
tanta ueterū & iuniorum diuersitate, nihil habere nos de Siderite, quod

pro comperto tradere ualeamus. In commentarijs tamen legimus uulgo dici Sclaream, & eam esse herbam unde liquor fluat, qui Sanguis Draconis uocatur in Officinis.

A

Sclarea.
Sanguis Draconis.

R. V B I multa sunt genera, sed quæ magno separantur discrimine, ut inquit Barbarus. Communiter tamen, ut audio, pro Rubo hodie intelligunt Officinæ eum qui Mora profert, quæ Germanice uocant Brombeer. Ceteræ species additis suis notis distinguuntur.

Brombeer.

Idæus rubus in sola Ida nascitur, ut hic inquit Dioscor.

HELXINE, herba muralis, uel Parietaria. De qua uide Vergilij Commentarium.

Parietaria.

Elatine scribitur similis esse Helxine, sed per omnia minor.

Eupatoriū. De hoc uide infra Leonici, Collinutij, & aliorū Anno.

Wild Salbey.

De Quinq̃folio quoq̃ consule infra Mainardū Ferrarien. Nam quæ hodie pro Pentaphyllo celebratur, nihil est minus.

PHOE N I X herba a Plinio uocatur Hordeum murum, uel murinum. Nascitur in tegulis frequentior quam in aruis, hordeaceo folio, cuius seminibus inter tegulas mures uescuntur.

Lolium murinum.

Idæa radix, peregrina & Italiæ & Germaniæ, peregrinitatemq̃ suam natalis loci cognomine indicat.

Rhodia radix, Macedoniæ tantummodo nota.

Equisetum, uel *ἰπποῦρις*, id quod Officinæ uocant, Caudam equinam.

Cauda equina.

C O C C V M quo insectores utuntur, a Mauris uocatur Kermes, & ab Officinis Granum tinctorum. Et ex eo tingitur Scarlacum. Reperitur in Gallijs apud montem Pessuli.

B

Tragum si nō id est quod Hyrci barbulam uocamus, ignoratur quid sit. Nam in Creta tantū nasci inquit Dioscor.

De Iuncis, & Iuncorum differentijs & generibus, uide Hermolai Barbari Corollarium.

L I C H E N, aliquibus Hepatica. De qua in priore Tomo sententiam nostram tulimus.

Hepatica.

Paronychia. Describunt, effigiantq̃ hanc, ut inquit Vergilius, nostræ ætatis Herbarij, petrosis locis nascentē, folijs latifolij Lauri duobus, aut complurimū quatuor ramulis: inter quæ spicatus flos, crassitudine pollicis & longitudine, colore inter flauum & luteum.

παρονυχία

Chrysocomen Barbarus interpretatur Iouis Barbam, sed repugnantē Marcello Vergilio.

Chrysogonon ignotum.

Helichryson. Comētarij quidē, quos habemus, interpretant̃ pro ea herba, quā officinæ hodie uocāt Sticados citrinū, uel Sticados montanū.

ἡλὶχρυον

Chrysanthemum quantum discet a Buphthalmo, uel Bouis oculo, de qua supra egimus, uide Comment. Verg.

A G E R A T O N. Vergilius. In latinis sub hoc nomine nulla, quæ nobis nota sit, plantæ huius historia est.

C Verbenaca, ea est quam Officinæ dicunt Verbenam. *πικιστιδών*

A S T R A G A L V S ex commentario quem habemus, nota herba inferioribus Germanis, qui eam uulgo uocant Erdt moten, uel moren. Quod plane non intelligo quid sit. Alijs Castaneæ Salandinae.

De Hiacynto uide iudicium Hermolai & Vergilij. Commentarij exponunt Cæpam Banosam.

Papauer erraticum, Rubeum Papauer.

Papauer cornutum, uel corniculare, herba quam Officinæ pro Glauccio, & Mentha ostendunt.

Iusquiamus.
Bylßen.

Apollinaris herba, Hyoscyamus, uel ut Officinæ uocāt, Iusquiamus.

Alkakengi.
Schluten.

S O L A N V M uescicatorium, quidam accipiunt pro ea herba quam Officinæ uocant Alkakengi, Schluten, oder luden kyrssen. Est & aliud Solanum, quod Solatrum communi nomine uocamus.

M A N D R A G O R A. De hac uide infra in Commentarijs. Item Vergilij Commentarium de impostura agyrtarum circa hanc.

A G O N I T V M Officinæ Napellum, & rura quædam Lupariam. Habes infra & Annotationem de Cicuta & Aconito.

Taxus, græce *σπίδαξ*. Taxos habet Italia.

Apocynon, Brassica rustica, uel Canina.

Oleander.

Rhododendron, arbor quæ ab Officinis uocatur Oleander.

C O L C H I C O N, Ephemeron. De his sic Vergilius. Querendū, sintne quos Medici & Herbarij Hermodactylos uocant Ephemeron hoc, an Colchicum paulo ante descriptum.

Neüßörlein.

A L S I N E, Auricula Muris.

Neerlynsen.

D

Lens Palustris, innatat aquis nō fluētibus, muscus Lenticulæ similis.

Aizoum maius, Semperuiuum.

Aizoum minus, Crassula.

Vmbilicus Veneris, ab foliorum rotunditate, in forma umbilici redactis, sic dicta.

G A L I O P S I S, Vrtica Labeo, nascitur in sepibus secus uias, & habet radicem Strophulis non ab similem.

Galion fertur crescere in muris.

E R I G E R O N, siue Senetion, herba qua hodie in acetarijs utuntur. Alias, herba Petrella.

Eryon thalassium, Musci genus.

Potamogeton, herba S. Laurentij ab Officinis.

Stratiotes in Aegypto tantum nascitur.

Millefolium.

Stratiotes Chiliophyllos, nostrum Millefolium, Teutonice Garb. Et responder historię huius per omnia.

Verbascum, qd Officinæ barbare Taxum, uel Tasson Barbassum.

Ολέμων
Taxus bar-
bassus.
Bardana ma-
ior.

Arction. De eo in priori Tomo plura, atq; item de Personata. Commentarij tamen interpretantur Lappam maiorem, & Bardanam maiusculam.

PETASITES herba Galerita, in qua folium pediculo superpositum, non aliter in medio, quam in Fungis passim uidetur, hæret.

Epipactis peregrina Italiæ & Germaniæ, interq; frutices Asiæ & Græciæ annumeratur.

Capnos, uel herba Fumaria, ea quam Officinæ uocant Fumum terre.

Erdrauch.

Cytisus notissimus quondam frutex Italiæ, teste Vergilio in Bucolicis, nunc nullibi est: aut si alicubi crescit, sine honore est.

Myriophyllum, uel Millefolium, Barbaro alia uidetur esse ab ea quam supra inscripsit Chiliophyllum. Quamquam iuuamenta utrinq; respondeant. Vtraq; enim uulneraria inscribitur, & ulcerum curatiua.

MYRRHIS. Quidam existimant esse eam, quæ hodie Cerefolium appellatur.

Cerefolium.

CRISII, et BVGLOSSAE differentiam, & de nominum illorum commutatione, uide infra in Annotationibus, & Herbarij nostri Tomo primo.

ASTER, uel herba Inguinalis. De hac herba passim multos consului, nec expiscari a quoquam ualui quæ nam esset.

Isoyron. Vide in Annotationibus Vergilij.

Chamæcison uocant Hæderam nō attollentem se a terra, non tamen ueram Hæderam, sed herbam cultis locis nascentem, hederaceis folijs, neq; ijs tota figura. Vide de hoc Vergilij Commentarium.

BVGLOSSVM, uel Lingua Bubula, nostra Borrugo uulgarissima. De quo item infra in Annotationibus.

Borrugo.

Cynoglosson hodie duorum generum nobis ostenderunt herbarij. Vnum folijs & coliculis uulgo existimatæ Buglossæ, sed tenerioribus, flosculis purpureis. Alterum linguæ canis simile, sine caule.

Lingua Canina.

B

Leontopodion, ut inquit Barbarus, in uetustissimo Dioscoride apertam uidimus, simillimam herbæ quam uulgos ex consuetudine Calendulam appellat, ut eadem omnino esse uidetur. Nec præterea quid de ipsa prodam habeo.

Hippoglosson. Hanc se uidisse Barbarus testatur, nobis uero adhuc incomperta.

Anurrhinon herba, sic uocata est, quod eius semen uitulorum naribus simile existat. Folio paulo minus quam hederaceo, flore qualis Viola, purpurei coloris. Sic quondam M. Vergilio exhibita ab Herbarijs est.

Catanance Thesala herba; cuius secundam speciem existimant quæ ab Officinis Bistorta uocatur.

Bistorta.

TRIPOLIUM an sit Turbith Officinarum, uide infra in Annotationibus.

Adiantos, id est, Capillus Veneris, nota herba.

Mouraut.

FIDICVLA, seu Trichomanes, Adiantum genus alterum, & ea quam Officinæ uocant Calytrichon.

Calytrichon.

Xanthion, id est, Lappa. Sunt autem plura Lapparum genera, folio,

Lappa.

C semine, & natali solo diuerſa: obſeruatumq; a nobis eſt, quęcunq; hama-
tis uncis, aculeatiſq; & ueſtiũ tenacibus feminibus plantę ſunt, in gręcis
& latinis eodem aliquando nomine indicari, in illis Aparines, in noſtris
Lappę.

Forſſe
Kitterſporen.
Wilder
habern.

AE G I L O P S, uel Auena, herba aruenſis, necans hordeum, folia
Tritici habens.

Linaria.

B R O M O S Auenę ſimilis.

Glaux, & Polygala, ignotę.

Oſyris putatur eſſe quę hodie ab Officinis uocatur Linaria.
Smilax Hederacei generis.

R V S C V S, ſylueſtris Myrtus. Aliquibus locis ſcopę ad purganda
pauimenta ex eo fiunt. Officinę uocant Bruſcum.

Yngryen.

Boniſſicia.

Chamedaphne, Vincaperuinka, ut in priore Tomo ſcripſimus.

Laurus Alexãdrina, herba quę Bis lingua uocat, uel herba Boniſſicia.

Cucumer ſylueſtris, uel Cucumer aſininus, ex quo Elaterium faciunt.

Staphis agria ex Officinis nota ſub eodem nomine.

Thapſia nota ex Officinis.

Spartium, id eſt, Geneſta, nota.

DE N A R C I S S O uide infra in Annotationibus iudicia uaria Do-
ctorum.

Ben.

Glans unguentaria eſt Ben, uel Behen.

Wandel
baum.

Ricinus a Mauris Kerua, & ab officinis Cataputia maior dicitur.

Nux Vomi-
ca.

Tithymalus, Laſtuca marina, ſiue caprina, uel herba Laſtaria. Com-
mentarius Fettiſch Nucem uomicam uocat, quam hodie in Officinis ſic
uocant, Tithymali fructum.

Bronãuglin.

D

P I T Y V S A fertur eſſe Sebram, uel Mezeregi, latine Eſula maior.

Lathyrus, & ipſa Tithymalus, Cataputia minor.

S C A M M O N I A herba ignota: ſuccus in uſu Officinis, quem cor-
rectum & præparatum uocant, Diagridium.

Chamelea, Oleaſtellus, id eſt, Mezereon. Herbam uidimus in Offici-
na Aucuparij, ne per latum quidem unguem diſcedentem a Dioſcor. de-
ſcriptione.

Thymelea, noſtrum Coccognidium.

Cucurbita ſylueſtris, id eſt, Colocynthis, uel Coloquintida, ut uocant
Officinę.

C N I C V S ab Officinis uocat Carthamus, uel Crocus hortulanus.

S O L A T R V M herba maior, Scorpiuron, uel Heliotropium, ut
biq; creſcit in menſe Auguſto, caudam præferens Scorpionis.

Scorpiodes uidetur eſſe quam Plinius Calendulam uocat: quamq;
Herm. Barbarus Leontopodio tribuit hoc nomen, ut ſupra diximus.

Z *τρυφίς ἄγρια*, Herba eſt quam uocant Pediculariam: eo quod pedicu-
los necat.

πολυύβριος, Herba nerualis. Ea, ſi quamplurimum ieiuno ſtomacho co-
meditur, a prima luna ad triceſimam ſanat *ἰκτερὶαν*. Hæc eadē ebrio data
copioſa, in crapula uinū diſcutit, mētemq; reſtituit. Quam autem uelit
non ſatis intelligo. Certe Arnogloſſum. Plinius uocat Nerualem.

Herba Vrceolaris, confert ad dolorem aurium, et tinnitum earum, ſi
ſine ulcere ſint. Sed quæ ſit, diuinandum relinquo.

πολύγονον, ſic appellata, quia mult, a eſt, et ubiq; naſcitur.

πολύμαχον eiufdem generis cum Poligono.

κοτυλλιδάιν, herba, folia ſimilia cymbalis habet, naſciturq; fere in parieti-
bus humidis.

Elaterium, ſuccus Cucumeris ſyluaſtici.

Symphyti radicem quidam Inulam Ruſticam, alij autem Alum Gal-
licam uocant.

πυλὼν, Tiniaria eſt, ut opinor.

ἰπποκυστίς, ſuccus Roſæ ſyluaſticæ. quam Caninam uocant.

χαμαιδρύς, folia Quercus ſimilia habet.

κολοκυνθίς, Cucurbita ſylueſtris.

γναφαλίς, Herba Centunculus, uel Sorba, uel ſiliqua Syriaca.

περικλινύμιον, Syluæ mater.

καλοπίνθριον, Calcifraga.

ἰνρα βοτάνη, quam nos Vetonicam dicimus, Oxymyrſine, Scopa regia.

Trifolium acutum *ἰς τριφύλλον*, Naſcitur in Sicilia plurimum. Nam in
Italix regionibus nuſquam eam uidi herbam, niſi in Lunæ portu, cum
Britanniam peteremus cum domino noſtro Cæſare, plurimum ſuper
circumdatis montes. Eſt autē folijs in ſpecie & numero ſimilis commu-
ni Trifolio, niſi quod huius pleniora ſunt, et quaſi lanuginem quandā
ſuper ſe habent, et in extrema parte uelut aculeū eminentem. Sed huius
frutex duorum pedum interdum, aut etiam amplior conſpicitur, & odo-
rem grauem emittit, quorum nihil circa pratenſe Trifolium inuenitur.

Glycyſidam nigram Peoniam Græcorum quidam appellant.

Schoenus, Iunci odorati flos.

ἑρκετάμον Græci, Latini Altercum.

D E M O N S T R A T I O N E S aliquot Herbarum
ex Corollarijs Hermolai Barbari, de quibus dubi-
um quibuſdam eſt, qualibus nominibus designen-
tur apud Autores,

De Caryophyllis. Ex Corollario de Pipere Lib. Secundo.

Paulus Aegineta Caryophyllon, nō Garyophyllon uocandum exiſti-
mauit, quaſi multifolium, etiamſi hanc inquit non habet naturam quæ

C nomine prætenditur: sed flores arboris cuiusdam Indice, festucacei sunt, & nigri, longitudine pollicari, acres, odorati, subamari. Lignum eius Xylocaryophyllon appellant. Ab huius odore, Violarum genus altitium Caryophyllon uulgo dicitur, ubiq; modo nascens.

¶ Etrursum Lib. 3. cap. de Bacchare.

Non defuerunt qui Baccharem genus esse floris existimarent, quem modo Caryophyllon uocamus; sed syluestris, nunc altiles n̄ spectantur. Ab odore ita cognominati. Tanta uarietate, amplitudine, pulchritudine, ut Rosæ partes non inferiores uideri possint, cum eaq; de principatu contendūt: qñ nec colore superant purpureo, uermiculato, cādido, nec odore, nisi quod a longinquo plus olet recens Rosa. Iam nihil Rosa fugaciū. longissima namq; decerpitis mora dies. Caryophyllon in triduum et amplius uita, uigorq; durat, Aliquibus tanta magnitudo, Patauinarum præcipue matronarum curā, ut orbem utraq; manu complecti fere nequeas. Folia quaterna, quinaq; nonnullis. Rosæ modo numerosa, mirabili quorundam Alabastro culturæ ratione, quæ dehiscens, ipso staminum loco Alabastrum ostendit alium pandentē se paulo post in florem, caliculo priore consenscente. Scio putare aliquos Caryophyllon ueteribus fuisse Caltham. Sed cum Vergilius nobis eam luteolo cecinerit colore tinctam, nec Plinius a Vergilio dissentiat, nondum uideo, qui possit ita statui.

¶ De CAPRIFOLIO, et MATERSYLVA.

Peryclimenon, Caprifoliū, et Materfylua dicitur uulgo. Quamquam Dioscor. Materfyluam pro Hædera capit, cui Periclymenon simile est.



¶ IO. MAINARDI Ferrariensis, de quibusdam Simplicibus censuræ.

¶ DE ERVILIA.

QUOD NOS ERUILIAM uocamus, non id est legumen, quod Arabes, uel potius libri ex arabico in latinā linguam quomodolibet uersi, Mes, uel Almes, uel Meise uocant, neq; id quod Almelic. Nam cum teste Serapione cap. 116. granum id quod Mes appellat, oculum habeat, cum pupilla nigriore, et herba eius sit Phaselus, tamen euidētia, & experientia ipsa satis docet, quod ErUILIA oculū non habet: uel si quid habet, quod oculus a defendente proprium dogma forte dici possit, id omnino nigriore pupilla non constat, Subinde quantum Phaseli herba, ab ea, quæ ErUILIÆ distet, ex utriusq; aspectu qui uis addiscere potest. Si quis tamen uisui non credit, gustum consulat. Scribunt siquidem Auicenna, & Isaac, in cortice Mes, esse ponticitatem. Ita enim ipsi appellant eum saporem, quem Græci σπύρον, nostri modo stupidum, modo acerbum nuncupant: qui quidem est sapor linguam uehementer adstringens et ueluti ligans, qualem glandes maxime præ se fe-

runt. Tam alienus est autem hic sapor ab Eruiſia uera, quam, ipsa a Glandibus. Rursus Mes est idem quod pisum: sed pisa non sunt Eruiſia nostra. Scribit enim Plinius libro duodecimo, Pisa habere angulos, ut ci cercula: quos in Eruiſia certe nostra non uidemus. Libro quoque decimo octauo de Eruiſia & Pisco ceu rebus diuersis, ait, quod folio constant longiore. Et Theophrastus Pisum multifolium esse dicit, terrenum, amplius, adeoque uagum, ut locum totum impleat, etiam si amplo interuallo sit positum: quæ nostræ Eruiſiæ minime quadrant. Liquet ergo, quod Eruiſia non sit Mes. Quod uero non sit id quod Arabes uocant Almelic, non aliter quam Auicennæ ipsius testimonio probandum. Is enim cap. 353. secundi libri, ex sententia propria asserit, Almelic esse Erbum, ut ibi legitur. Quod uero Erbum, de quo ibi Auicenna (Orobon Græci appellant,) nos Eruum, tam sit ab Eruiſia nostra, quam Mes Auicennæ diuersum, adeo clarum est, ut probatione non egeat, iumentorum enim potius quam hominum cibus est Eruum, Eruiſia homines libentissime uescuntur. Quonam uero nomine hæc res ab antiquis censeatur, quam Eruiſiâ Plinii uoce nonnulli, uel parum ab ea (ut fieri assolet) deflectendo, Rouſiam uocant, Pisfarelos Veneri, Rodionos alij, hoc operosius est ualde iudicare. Si enim uix possunt illa agnosci, quæ ab antiquis summa arte effigiata, & ueluti sub oculo sposita sunt, quanto laboriosius fuerit legumina agnoscere, quorum illi uel nomina, uel naturam, non quali forma constarent, ostenderunt. Præsertim nostro uo, quo simul cum nominibus, multarum rerum cognitio interijt. Adde, quod & Galenus ipse ambigere in his quoque uidetur: anxie & scrupulose nonnulla eorum peruestigans, & ambigenti demum magis quam decernenti similis. Quod non alia ex causa puto accidisse, nisi quod antiqui in eis describendis fuere negligentiores, quæ in proptulo & assiduo hominum usu esse cognoscebant. Quod & Plinius quodam loco animaduertit. Sunt tamē duo, triaue, quæ me mouent, ut credam Eruiſiam hanc nostrā esse id, quod Theophr. & Diocles Dolichon uocauerūt, et Galeni tempore Phaseolus, uel Lobus dicebatur, & a Theodoro Siliqua: quantū (si a tanto uiro dissentire licet) siliqua existimanda est aliud legumen iuxta latinos autores. Quod uero præter nomen ipsum, quod nulli alteri legumini magis quadrat, præcipue me mouet, est id quod de Dolichis scripsit Theophr. 8. de histo. plantarū libro: quod si iuxta longum lignum quis eos affigat, ascendunt & frugiferi fiunt: si non, mali & uermiculosi redduntur. His si addideris Galenū dicentem, Dolichos in hortis conseri, excrementa alui excutere, & uix ob redundantem humiditatem conseruari posse, uidebis profecto, huius Dolichi proprietates adeo huic nostræ Eruiſiæ congruere, ut nulli alteri legumini magis. Adde quoque, si placet, et aliud Dolichorum proprium ex eodem Theophrasto, & Gale. 2. lib. de Alimentis sumptum, quod scilicet ipsorum solorum, dum recentes sunt, simul cum seminibus Siliquæ quoque mandantur, Ratione cuius proprietatis, appellari eos Lobos scribit

A

Mes, Pisum.

Eruiſia non
est Almelic.

B

C Theophr. & post eum Aetius. Eruiliae autem solius inter legumina edi ab hominibus Siliquas simul cum semine, nemo est qui nesciat: cum & crude aliquando ab ociosis, & coctae a nobilibus, confecto praesertim ex eis delicato quodam pulmento, libentissime mandantur, aliorum leguminum Siliquis in cibū iumentorū proiectis. Nolim tamen quemquam mihi de uerbo calumniam facere, quod Dolichon dixerim Galeni temporibus fuisse nuncupatum Phaseolum, qui sit aliud ab Eruilia: dicimus enim, Galenum secuti, aliud esse legumen quod Phaselus, aliud quod Phaseolus, uel Phasiolus dicitur: & Phaseolū esse idem Dolicho, ut Paulus post Galenum confirmauit: Phaselum esse, qui nunc uulgo Phaseolus, quem & Virgilius uilem nuncupauit. Quod si animaduertisset Serapio, sub lubiae nomine, quod certe a lobo graeca uoce deflexum est, Phaselos cū Phaseolis. i. Eruilia, minime confudisset. Quod & hi quoque peccarunt, qui nostro tempore Dioscoridem interpretati sunt. Ex quo uiderelicet, quantum ad res ipsas probe internoscendas conducat nominum intelligentia, quam tamen nonnulli hoc tempore penitus aspernantur. Si igitur (ut pbamimus) Eruiliae sunt Dolichi, quis ambigat malas esse: cum scribat Galenus, Dolichos multum esse fabis deteriores, quae dubio procul malis cibarijs connumerantur.

Phaseolus.

Phaselus.

D

De R H O.

Ex Epistola
4. lib. 1.

Sumach.

R H O S uoce quidē graeca, sed quae, ut inquit Plinius, latinum nomen non habet, significatque eum fructum, quem Arabes & uulgi nunc medicorum Sumach dicunt, olim obsonijs & pellibus, nunc medicinae seruientem, de quo & Theophrastus. lib. 3. de historijs plantarum, & Diosc. lib. 1. & Galenus octauo, et Plin. lib. 22. abunde conscripserunt: aitque Plin. quod ulceribus medet manantibus cum melle, Galenus quoque *κνττιβελανμία* scribens, Syriacum eum nuncupat.

De A N E M O N E.

Epistola. 5.
cap. 1.

A N E M O N E, Papauer rubeum a multis existimatur.

A L B A R A, Populus alba, uoce parum deflexa.

A E G Y R O S, nigra Populus.

De P O P V L O A L B A.

Epistola. 5.
lib. 1.

Populus alba, calida potius quam frigida, scribente de ea Galeno, quod mixtae est aliquo modo temperaturae, ex aqua tepida, et terrestri tenuata substantia, et quod absterfusae uirtutis est particeps.

De N I G R A P O P V L O

Populus nigra secundum naturae codicem, quam in procliue est cerne re circa omnium fere fluenta, ad tantum caliditatis gradum extolli non potest, ut in medicina tertij ordinis possit collocari. Nam quis rogo sapor, quis odor, quae demum qualitas, tam praecellens eam monstrat caloris? Neque enim multum odorata, neque eximio aliquo sapore praedita, sed dum gustatur, primo quidē modice astringit, postea amariudinem quandam subobscuram inuehit, olfacienti quid non insuaue, uerum exi-

guum id omnino representat. Si quis uero uia Regia, quā Galenus mon-
strauit, incedens, experiri eam in corporibus temperatis, distemperatis,
ægrisque uoluerit, calefacientem non ualde inueniet. Paulus præterea Ae-
gineta Galeni Simia, calefacere eam scribit in primo ordine: cui Constan-
tinus quoque monachus consentit.

MIXARIA, uulgo Sebesten.

^{muvis}, Auricula muris, herba.

PTERIS, Filix.

Santonicum, Absynthium marinum

SCEA uulgo Italice, nunc Sanctolina, cuius semen ante Corallinae
usum, in magna fuit celebritate.

ERINGERO s, Senecion. Nec est Cardus benedictus, ut puta-
uit Genuensis, sed herba apud nos passim nascens, uel mulierculis co-
gnita: quam quoniam in petris fere inueniunt, Petrellam uocant.

Tragoponos, Hyrci barbula, uulgo & ipsa cognita, holus uidelicet
syluestre. Barbam petrae dicunt, uel eam, uel aliam multum similem.

SYDIAE, cortices Mali punici.

SEMENT Careos, Carui.

GLYCYSIDOS radix, radix Peoniae.

SENA, nota herba,

Lapis Cyaneos, lapis Lazuli.

BEZED, et Albezad, non est Keiri, uel Leucoion, sed quedam Ana-
gallidis species, quæ rubicundum florem profert.

DE CARDAMOMO.

B

Lib. 3. Epi-
fiola. 4.

Cardamomum Arabes Cordumeni uocant, de alia re sub Cardamo-
mi nomine pertractantes. Quæ nam uero res ea sit, Oedypo eget conie-
ctore: quoniam nullum de ea scribentem græcum autorem affert Serapi-
on. Ex quo fit, ut existimem, uel rem esse nouam, hoc est, quæ post Gal.
tempora in usum uenerit medicorum, uel errasse in ea non solum inter-
pretes, sed et ipsos autores. Nisi forte quispiam putet, cum Plinius quatu-
or cardamomi species enumeret, de duabus, capite de cordumeni, de reli-
quis, capi. de cardamomo ab Arabibus scribi. Auerrois tamen. 5. libro
sui Colliget, quoddam cardamomum inter medicinas post Gal. reper-
tas connumerauit, cum superius inter eas quæ a Galeno pertractantur,
de alio conscripisset. Ego tria seminum genera uidi, quæ pro cardamo-
mo ferunt, inter quæ nescio an unum sit quod uere Cardamomum dici possit.

DE SERIPHIO.

Seriphium aliud a Santonico, non solum uoluit Paulus, sed & Gale.
lib. 6. simpl. Et Plin. lib. 27. Nec temouere debet Dioscor. Absynthium ma-
rinum a nonnullis Seriphium, ab alijs Santonicum uocari scribens. scis
enim, quam inconstantes sint huiusmodi nomenclature, et pro libito ab
unoquoque conficte. Alioqui si hæc sequamur, Abrotonum idem dice-
mus quod Absynthium ponticum; cum, eodem Dioscoride, autore. Ro-

- C** mani sic Abrotonum uocent, atq; idē quoq; cum Santonico . quoniam ut refert Galenus, Abrotonum a Romanis uocari Santonicum, scripsit Pamphilus . Vocet igitur unusquisq; prout uult, ait Gal . modo sciat res esse diuerfas . Tutius tamen est sequi antiquorum, præsertim Galeni, nomina: ne in rebus quoq; ipsis labi contingat . Verū & Dioscorides ipse, si maculatus sit codex, Santonicum rem diuersam a Seriphio facit lib. 3 in fine capi. 26. pro uerbo enim Sardonicum, legendum Santonicon : & pro uerbo Sardonium, legendum Santonicū . Quod nedum ex Galeni, Plinij, Serapionisq; concordia sententia patere potest, sed quia nulla est in Gallia Sardonis regio, sed Santonis: estq; Sardonion, alia herba, de q̃ Dioscorides lib. 2. inter Batrachij species, & libro. 6. inter uenena mentis onem facit, a qua Sardonijs risus græcorum prouerbiū non bonæ famę in uita, sicut Dioscorides, Paulusq; testantur, & lib. 2. Auic. sub nomine Seardi, licet ignorauerit de qua re scriberet, nec intelligi ualeat quid scripserit, nisi ab his qui ea quæ ille scripsit, aliubi didicerint . Obscurius quoq; idem Aui. scripsit de Seriphio, & Santonico lib. 2. sub Scheę nomine in capitis principio, adeo, ut ne diuinando quidē possis assequi quid uoluerit: & ne in nostra tantum æditiōe putes difficultatem, consule & hebræam, & maiorem, non modo equam inuenies obscuritatem . Vide quod saxum uoluant ij medici, qui Auicennam sibi in idolum erexere.
- D** Sed de his alias maiore ocio.

Sardonijs
risus.

¶ De ANTHERA quid sit ex eius lib. 2. cap. 3.

Legisse te in multis medicamentis Antherae nomen dicis, nec adhuc scire quidnam significet, alijs luteum illud quod medium florentium rosarum interiacer, alijs rubentem ueluti fructum, quem ubi defloruere, in sua spina relinquunt, Antheram nominantibus. Poteram certe petitioni huic tuæ breuib; satis facere, si dixissem, neutrum esse Antheram: apud idoneos enim autores, non simplicis medicamenti nomen esse, sed compositionum, quas ad oris ulcera antiqui reliquere . Quarum Plinius. 22. Celsus sexto, Dioscorides primo, Paulus, & pleriq; autores in suis libris meminere. Sed dixisses puto, non te hoc querere, sed quam rem hij intellexerint, qui ad alia componenda medicamina ea utuntur . Non enim uideri rationi consentaneum, ut compositiones hæc in alias compositiones adhiberi uoluerint: præsertim, quum non certi cuiuspiam medicamenti nomen Anthera sit apud enumeratos autores, sed multis commune, quæ ulcerato ori solent adhiberi . Ut igitur id melius assequare quod desyderas, res est altius repetēda . Antiqui in Rosa sex partes, nō nomine tantum, sed uiribus quoq; & facultatibus differentes, cognouere: quas a recentioribus fere neglectas, non inutile fuerit recensere . Rosam primo diuidunt in folia, flores, & capita: folia, in ungues, & id quod exemptis unguibus remanet . In flore aliud semē, aliud capillus: in capite aliud cortex, aliud calyx (ut Plinij uerbis utar) intelligitur . Vngues, pars illa candida uocatur, quæ capiti de proximo hærens, præcidi a seplasiarj; con-

Rosæ diuisio.

fuevit, rhodomeli, uel rhodofaccharum reliquo paraturis. Florem luthicum illud intelligunt, quod folijs circumquaq; ambitur; seperatum in capillum, idest, in tenuia quedam fila, & in semen quod sub his filis lanugine quadam opertū, cortice continetur. Caput solidum illud intelligunt, quod folijs & floribus, ceu basis substernitur: cuius superior pars, ex qua flos & folia prodeunt, proprie caput, reliquum calyx nuncupatur. Differre autem hæc non nomine tantū, sed & uiribus, Dioscoridis primum testimonio probatur, florem in gingiuarum fluctione inspersum, capita porta in alui profluuijs, & sanguinis excreationibus, folia ad alios ab his usus commendantis. Sed & Galenus libro septimo de simplicibus medicamentis, florem in adstrictoria ui, ait folijs præstare. Quod etiam confirmauit Auicenna libro secundo: licet pro flore semen, sicuti alijs in locis scripserit. Septimo quoq; libro, qui de compositis medicinis secundū loca patientia inscribitur, Hiram medicū ait idem Galenus, in quadam andromachi compositione, rosarum folia in flores mutasse. Plinius florem scribit somnum facere, semen urinam ciere, dentium dolori, igni sacro, & stomacho mederi, & naribus subductum caput purgare, ungues epiphoris salubres. Ex his rosæ partibus, re ipsa & ui nedum nomine differentibus, flores Antherae nomine recentiores significasse, ex hoc maxime uidentur, quod ea in morbis utuntur, qui adstrictoriam uim ualde desyderant, qua præcipue flores pollere, GALENI testimonio superius demonstrauius. Quod & nomen ipsum manifestat, quum ab eo quod est ἄνθος, id est flos Rosæ, deductum uideatur, uoce tamen (ut fieri uulgo solet) paulisper decurtata. Hæc habui de Anthera quæ scriberem, magis ut tibi morem gererem, quam humanæ saluti consulturus. B

Quando non magni periculi res est, utrum ex his quæ petieras pro Anthera capiatur.

Schoenianthos, uulgo Squinantum.

Lapathum, est Acetosa.

Buglosson, id quod Borraginem hodie uocant.

Seridis species, Scariola, Cicerbita, Endiuia.

Vuæ siccæ, Passulæ, Vuæ Orientales & Occidentales, Ziziue, Sclaue.

Citria, quæ et Arancia nuncupantur.

¶ De THLASPI.

Thlaspis, herba est angusta, habens folia ad digiti magnitudinem, super terram iacentia: in summo scissa, subpinguia, uirgam tenuem duorum palmorum, adnascantias quasdam paucas habentem, & circa totam ipsam fructum parum latum in extrema parte, in quo semen paruum simile nasturcio, ad disci figuram, ueluti conuassatum, florem subalbum. Nascitur in uijs & sepulchris. Semen est acris saporis.

Ex lib. 5. Epistola. 7.

¶ De SCORDIO.

Scordion nascitur in locis montanis & palustribus, folia habens fimbria chamædryi, maiora tamen, nec adeo in circumferentia incisa, aliquo

C modo Allij odorem referentia, adstringentia gustum, subamara, uirgulas quadratas, a quibus flos subrubens dependet.

¶ **De I N T Y B I S.**

Intybum duplex est, Domesticum, et Syluestre: hoc Cichorium, illud Endiuia uocant. Aruensis rursum duplex est: scilicet Radicula, et quam Cicerbitam uulgus appellat.

Apium Hortulanum, id est quod hodie Petroselinum uocant.

Tarcon, uulgo Draconem herbam uocant.

Rhaphanus duplex est, quidam qui Radix, & alius qui Armoracia dicitur.

Spinacium, olus quod Arabes Aspanas uocant, nos paulum imitato nomine, Spinacium appellamus.

¶ **De O P O B A L S A M O.**

Ex lib. sexto.

Verum Opobalsamum, uel ad nos non affertur: uel si affertur, tanti precij existit, ut totius antidoti precium praeuertat. duodecim enim drachmas, praeter id quod in Hedicroo apponi debet, tota Andromachi compositio recipit, quae .is. libras parum excedit. Vix tamen crediderim, syncerum & recens afferri. Nam quod hactenus uidere potui, odore, colore, substantia, longe a qualitatibus ueri distabit. Sed & Gale. uarijs adulectari id modis queritur, inueniriq; in optima Myrrha Opobalsamum, quod intra corpus assumptum mortiferum esset: nisi forte extra hoc periculum nos sumus, qui non optima solum, sed bona etiam Myrrha caremus. nam quae Myrrhae loco habetur, pro odore suauitatis teterrimum uirus obolet.

Myrrha uera
caremus.

D

¶ **De R H E O.**

Rheon scribunt Pli. & Dioscor. radicem absque odore, Costo nigro similem, cum id quod in usu est, nullam cum Costo nigro similitudinem gerat, magnumque longe odorem, nec insuauem iacet.

¶ **De A M O M O.**

Verum Amomum, i. botruosum, & ueluti uua, nescio si Italia hoc seculo ui-

¶ **De C I N N A M O M O.**

(dit.

Neminem adhuc audiui ambigentem, praecipue a Lusitani Regis classe, id quod passim ex India in Europam inuehitur, esse uerum Cinnamomum. Quod tamen non esse, ex Galeni uarijs dictis in lib. de Antidotis, facile patere potest, Cinnamomum dicentis esse arbutum. 6. uel. 7. plus minus adnascentes ramusculos habens, longitudine inaequales, ita tamen, ut maior semipedem Romanum non excedat: & id quod optimum est, indicibilem quendam super omnia alia odorem habere, gustuque aliquatenus calefacere, non usque adeo tamen, ut cum tristitia mordicaret. Colore tale, quale si lac uocato Phaeo, cum exiguo uocati Cyani misceretur. i. ut mihi uidetur, colore albo ad fuscum & subcyaneum tendente. Esse eius. 6. genera, 2. uidelicet inter optimum & pessimum, quod exiguo intervallo ab optima Casia minime mirandum distare, cum ea in Cinnamomum aliquando conuertatur: quemadmodum post Galenum in lib. 2. suae Medicinae scripsit Auic. uidisse enim se ait Galenus Casiam adeo al-

tam & uberē, ut ad arbuti ascenderet magnitudinē, ramusculosq; quosdam mitteret, uisu, corticis tenuitate, odoreq; & gustu exacte similes Cin

¶ De Adulterio Casia nostrae uulgaē, et erro- (namomo.
re Medicorum circa eandem.

Ex quo dicto intelligere quoq; licet, quantū uulgaris nostra Casia distet a uera, nihil cū Cinnamomo habens cōmune: tertia cum sit, inodora, & penitus aspernabilis, imo nihil habens quare Casia putari debeat: ut Dioscoridē & Pliniū legenti, remq; ipsam in manu habenti, facile constabit. Casiam cū dico, Aromatitē intelligo, quā Officinę Ligneam uocant, aliā enim cuius nunc communis est ad aluū leniendā usus, scio antiquis penitus incognitā. Inter illas, id est, Aromatites, ea esset eligenda, quę Gizi, non Gizir, ut putauit Hermol. barbarico nomine dicitur: quę adeo similis est Cinnamomo, ut duplū eius pro Cinnamomo, Galeno teste, poni possit, q̄ Quinto accedendū non putauit: dicenti nō secus eos facere, qui carētes Cinnamomo duplā Casia accipiūt: his q̄ dicerēt, dū caremus phalerno, uel uino cretico, duplū uilissimi uini bibendū: & eos qui simi- lagineum panē non habent, debere duos furfuraceos esitare. Non enim ait Gal. simile quid his faciunt, qui Casiam Cinnamomi loco accipiunt, sed illis assimulantur potius, qui cum forti careant uiro ad pondus ferendum idoneo, duos ei substituunt debiliores. Hanc Gizi appellatam, theriacē imponere deberemus, & carentes Cinnamomo, pro simplo Cinnamomo duplam accipere. Fistularem autem uocatam, omniū uilissimam, & propterea theriacē non imponendā scripsit Gale. esseq; passim cognitam, exteriorem quidem corticem, quem Fistulam uocant, fortem habentē & odore & gustu, interiora debilissima, adeo ut nullius sint utilitatis. B

¶ De N A R D I S P I C A.

Carere nos Indica Nardo quis dubitet, qui Spicam quidem uocari a pud Galenum legerit: esse tamē radicem. Sed & in ea theriaces præparatione, quam ceteris ueluti concisam magis & manifestiorem præfert Galenus, sic ad uerbum carmine quodā scribitur. Termentinaeq; rhēsinam, nardicq; radicem indicā ad nos uehitur spica, atq; utinam nardi esset, suauitate enim odoris penitus caret, & saporis est ualde ingrati.

¶ De S C H O E N O

In flore etiā Schoeni idem accidit. cū enim scribat Democrates, Schoenicq; non festucarum, sed flos, ad nos festucae portantur, non flores, sed in hoc magna uis non est: siquidem Galenus herbam laudat.

¶ D E M A L A B A T H R O.

Malabathrū quis nostro seculo cognoscit? Ego toto uitae meae tēpore uix unicum folium uidere potui.

¶ De T E R R A L E M N I A.

Lemnī Sigillī terram nunq; uidi uel glebulam saltem. Nam quæ passim uendit, nec facie, nec uiribus fere similis existit. Alioqui Galeni quod tempore tam apte adulterabat, ut dignosci a legitima non posset.

C

¶ De D I C T A M N O.

Dictamnino, nisi eam rursus Venus ab Ida sylua deportet, omnino deficiamus. flore enim, caule, & semine carere debet, quibus nostra hæc uulgaris maxime abundat: radicem uero habere tenuem, & inuile, quæ nostræ magna & ad usum sola ueniens neglectis folijs, quæ imponenda essent pharmaco, non radix.

¶ De P E T R O S E L I N O.

Quod uulgo Petroselinū uocamus, uel apiū est, ab antiq̃s dictū hortulanū, uel q̃cqd tandē sit, cōstat eius semē nō id esse qd Theriacę miscendū iussit Andromachus. p̃fert enim reliq̃s, Gal. teste, Macedonicū, & macedonicis extreaticū: in hoc alia excellens, qd amarissimū & acerrimū existit. Nostratis autē semē ut acredinis cuiusdam particeps forte uideri possit, omni tñ pr̃sus caret amaritudine. Sed postq̃ macedonico carendū erat, utinā Epiroticū haberemus, qd Galeni tēpore (tanta erat uerī emulatio) in Macedoniā p̃ Thessalonicę apportabat, ut p̃ Macedonico uendi posset. Recentiorū autē negligētia effecit, ut Macedonico, & Epirotico carentes, Ap̃ij communis semine pro eo utamur.

¶ De R H E S I N A T E R E B I N T H I N A.

Loco Termenting, quæ ex Chio optima, ex Libya et Ponto etiam bona afferebatur, hodie utimur Peucina, uel Laricę rhelina.

¶ De S C O R D I O.

Scordij nō solū herbā, uerū etiā significatū ipsū hodie amissimus, Aliū syluestre eius loco, nominis similitudine decepti, accipiētes: magis in hoc peccātes quā in petroselino: quod non ideo Theriacę imponit, quia fit uenenosis pharmacis, aut feris repugnās, sed aquę intercutis gratia, similiūq̃ morborū. Scordij autē tantā uim esse nōnulli fidedigni scripserūt, ut, quæcūq̃ supra illud in prælio q̃dam corpora occisorū ceciderant, diutius remanerent incorrupta, secundū eas potissimū partes, quę herbam ipsam attigerāt. Vnde credit, Galeno teste, uenenis ferarū, & mortiferis pharmacis uehementer repugnare.

¶ De P E N T A P H Y L L O, et
T O R M E N T I L L A.

De Penthaphyllo libenter intelligerē, uulgarem ne hanc passim in uis, etiā stratis nascentē acceperitis: ego non huius radicē accipiendā puto, sed eius quam Tormentillā uocant: quā licet septifoliā maiore ex parte in Italia uideamus, hic, hoc est, in Pannonia, sæpius uidi quinq̃foliam.

¶ De T H L A S P I.

Thlaspi ignota nostro æuo, etiā uoce est, mihi apud Ioannē Augustū lauriensem episcopū, uirū & doctrina & prudentia, & quod magis, est religione celebrandū degenti, comperta herba est, quam ueram Thlaspi esse puto. Cappadocam tamen desyderat Galenus, colore ad nigrum accedente, maiorem Cretica, & ex quadam eius parte ueluti quassam, unde & nomen accepit.

¶ De ASPALATHO.

A

Aspalathō nisi sandali uocari spēs sit, puto hoc tēpore penitus ignotā.

¶ De CALAMO AROMATICO.

Calamus aromaticus hodie nullus habet, et quod uulgus eo nomine uocat, radix potius est, non Calamus. Nec, ut arbitror, ueri illius calami radix etiam, sed uel acorus est, ut etiam suspicari Hermolaus Barbarus quodam loco usus est, uel alia quēdam res nobis incognita.

¶ De ACORO.

Ego quoties Acoro opus est, nō uulgari illa radice, & iniucundi odoris, sed uocato Aromatico calamo uti consueui.

¶ De MARO.

MARON SI non est Samplici species, ingenue fateor me nescire quid sit.

¶ De ACACIA.

Veram Acaciam. i. ex Aegyptia spina factam, quam lachrymam Cynam uocauit primus Andromachus, puto etiam in Italia deesse, sicuti & uerum Balsami lignum.

Pompholix nostrum, in myropolijs Nil, oculorum collyrium.

Nux myristica. idest Muscata.

Polentam latini uocant id quod Græci *ἄμυρον*, & Arabes Sauic.

¶ De CONVENIENTIA SVCVTI

et SYMPHYTI.

Nemo qui Auicennæ caput. 2. lib. 622. ubi de Sucuto agit, capiti Dioscoridis de Symphyto comparauerit, ambigere poterit, idem esse Auicennæ Sucutū, & Dioscoridis Symphyton: erroreque uel interpretis, uel ipsiusmet Auicennæ contigisse, ut Semperuiū dicatur. Errasse autem Auicennā, uel potius nescisse quid esset, ex eo constat: quod uarias de eo opiniones & .2. & .3. lib. affert, nec uni præ alijs adheret. Secundo em̄ lib. alios existimasse, quod esset Semperuium, alios quod mandragorē cuiusdam semē, alios aliam rem. Lib. etiam. 3. cap. de sputo sanguinis, duas de eo sententias affert. Nam postq̄ dixerat, quod est semperuiū, aliam cuiusdam Aggregatoris subdit opinionem. non enim de alia medicina loquitur sicut Iacobus cognomento de partibus est arbitratus, sed de eodē Sucuto ait, scripsisse uirum quendam in suis aggregationibus esse, calamenti, id est, origani specie, hoc est, similitudine. Origanum autem dici ab Auicenna Calamentū. 2. lib. manifestatur, cap. 158. ubi sub calamenti nomine de omnibus origani speciebus pertractat. Deinde subdit eundē uirum dixisse, quod nascitur inter lapides: utrumque autem primæ Symphyti speciei adscribit Dio. nasci uidelicet inter petras, & origani trahere similitudinem, tertiumque cum his, Sputo sanguinis prodesse. Melius igitur quam Auicenna coniecisti, & Sucutum esse Symphyton, & utramque eius speciem uulgo dici Consolidā. Quarū maior passim, apud nos nascit, & a similitudine radicis Lucanicam uocat, Mirandulē Alā nominant,

B

Semperuium.

Origanum Auicennæ Calamentum.

C Alum uolentes, uel potius debentes dicere, ita enim primā eius speciem nominat Plinius lib. 26. & 27. in faxis nascentē ramis origani tenuibus, in cacumine thymi capitibus, furculosam, odoratam gustu, cum dulcedine saluam cientem, radice longa, rutila, digitum crassa.

¶ De RHEVBARBARO, & quod hodie uerum Rheubarbarum non habeatur.

Quod uulgus medicorū & Officinæ omnes nunc Rheum barbarum uocant, & punici Rauedseni, hoc Celsus Radicem ponticā, Diosc. Rha, & iuxta quosdam Rheon, secundū alios Rhian, Plinius Rhecoma, Gal. quemadmodum Dioscorides interdum Rheon, interdū Rhian, aliquando Rheon ponticum appellat. Eo antiqui ad uentris purgationē non utebant, sed antidotis miscebant, & ad plerōsq; usus alios adhibebant, q̄s opere precium non est hoc loco referre, quando ex Plinio, Dioscoride, ceterisq; facile disci possunt. Primus (q̄d meminerim) Auerrois Cordubensis Galenum ceterosq; medicos taxans, qui constringere eum putarunt, nedum subductiuū uentris, sed inter cætera purgantia medicamina esse scripsit præcellentissimū. quē secutus Ioannes Damascenus cognomento Mesue, ubi medica pharmaca solutoria, quæ benedicta uocat, recēset, feriosam & honorificam illius mentionem facit. Cui hac in re, sicuti & in reliquis recentiores medici credētes, tanti illud fecerunt, ut aliquando auri precium æquarit, neq; ad alios fere usus nostro æuo accomodat, quam uel ad bilis uacuationem, uel ad intestinorum difficultates, uel ad eos qui de sublimi aliquo loco ceciderunt. Non prætereundum tamen silentio, posse cuiuspiam uideri, Serapionem iuniorem solutoria ui illū præditū existimasse, quum suo de simplicibus medicamentis lib. scribat, dari in omnibus in quibus datur Agaricum. Verum cum uerba illa nō ex propria, sed ex Diosc. sententia proferat, nec sit (quod plerumq; pecca) statis fidus interpres, audiamus ipsum Diosc. sua uerba personantem, uidebimulq; id non ex Dioscoridis, aut Serapionis opinione, sed potius de peruersa uerborū Dioscoridis, uel lectione, uel intellectu, uel interpretatione prodixisse. Ait siquidē ipse Dioscorides. Modus pariformis Agarico ad unumquemque affectum eodem drachmæ pondere. Quod si quis contendant Dioscoridem his uerbis sensisse, omnibus uiribus pollere Rheon quibus Agaricum, is & Galenum incurig, & Auerrois crimine falsi accuset necesse est. Illum quidem, quoniam ex Dioscoride non didicerit Rheon sicut Agaricon inter cathartica reponendum: hunc, quod talem ignorantiam perperam antiquitati impeggerit, & se quasi nouum tam nobilis medicamenti inuentorem iactanter & falso prædicet. Magis autem mouet me Paulus, q̄ lib. 1. sug medicine cū dixisset, Resinā Terebinthinā oliu magnitudien uentrē ciere, subdit, magis aut subducere uolētes parū qd Rhu admiscemus. Est aut Rhus (uulgo Sumac dicūt) Diosc. Gal. ceteris, experiētiacq; ipsa testate, medicamē uehementē uētris adstrictiuū: q̄ sit ut suspicer librarij culpa deesse, e, literam illi dictioni, legendumque Rheu,

non Rhu. Verum hæc ambigendo potius quam decernendo dicta sint. **A**
 nondū enim uidere potui, quæ scribunt a Paulo proprio cap. de Rheo,
 quamuis legerim apud medicū nō magne autoritatis, ex sententia Pau-
 li, quod mundificat. Quicquid tamen sit, non est ambigendum eam, præ-
 rogatiuam non habuisse apud antiquos inter carthartica, quam nuncha-
 bet. Quæ res non mouere nos debet, ut minus illud hac in re faciamus.
 Quandoquidē neq; myrobalanos int̄ solutoria medicamina, & senam,
 & mannam, & siliquam Indam, quam uulgo casiam uocant, ex purgan-
 tibus nunc præstantissima, habuerunt: item moschum, camphoram,
 sandalos, ambram, nobilissima quidem et efficacissima medicamina pe-
 nitus ignorarunt, aliæq; permulta nostro æuo explorata, & supreme cele-
 brata. Antiquos cū dico, Gal. & eo uetustiores intelligo: qui nō propter
 ea tamen accusandi sunt. siquidē nec omnia cognoscere, nec eorum quæ
 cognoscebant, omnes etiam uires scire potuerunt. Nec enim falso (quod
 Auerrois innuere uidet) Rheo adstrictoriā uim attribuerūt. ipsum nāq;
 sicuti plæræq; alia, utraq; ui pollere dicimus, adstrictoria uidelicet, & pur-
 gatoria. Ex Ioannis Mesue & Auerrois igitur, ac recentiorū omnium au-
 toritate, ipsaq; experientia didicimus, Rheumbarbarū inter medicinas
 bilem pituitamq; expurgantes, esse peximiū, adeoq; ab his nocuentis
 quæ secum reliqua carthartica afferre consueuerūt, immunem, ut pueris,
 prægnantibus, cæterisq; imbecillioribus tuto exhibeatur. Esse autem ieci-
 nori congruentissimum, non solum hñ, sed & Plinius & Dioscor. Gale-
 nusq; contestantur. Quod uero particulatim bilem a capite educat, non
 legi penes idoneum autorem. Plinius tantum bibi contra capitis grauita-
 tes affirmat. quas tamen ut in pluribus, non de bili naturali & impermi-
 sta, sed de alijs potius humoribus pendere aptum est. siquidem bilis ipsa
 aliorum humorum comparatione suapte natura leuis est. Dioscor. febris-
 entibus cum melicrato, infebrientibus cum cenomelite, pthificis cum pas-
 so, stomachicis in catapotijs exhibet. Plinius pro uarietate morborū mo-
 do in uino, modo in aqua, modo in passo. Communis usus medicorū ha-
 bet, ut uel formetur in catapota, uel cū aquis Arnoglossi in intestinorū
 difficultate, uel deuolutis, Apij, aut intybi in febribus bibat. Nos p mor-
 borum uarietate, patientis tēperatura, consuetudine, ætate, atq; id genus
 cæteris, modo huic, modo illi rei miscemus, prout tamen conducere arbi-
 tramur, ut nihil perpetuum habentes, ita a maiorum uestigijs ratione, ac
 experimento non discedentes.

¶ De T V R B I T H.

Quid per Turbith in tellexerit Mesue difficile est diuinare. Neq; enim cum Serapione con-
 uenit, Tripolium intelligente, nec cum Dioscoride radicē pityusæ sic uocante. folio enim hæc
 Pini, illud Isatidis constat, non ferulæ. Sed neq; id pingere uidetur quod passim in officinis nunc
 p turbith uenditur. siquidē, ut a fidedignis intellexi, ex planta accipit, quæ folio myrti constat.

¶ De P O L Y P O D I O.

In Polypodio iudicio Mesue standum non est, siquidem integra uncia per se parum purgat,
 cum ille quatuor aureos non transcendat.

Excursio ue-
 terum Medi-
 corum.

B

Reprehensio
 Mesue per
 Mainardum,
 et imbi de per-
 tinaci errore
 Collinutij, p
 Leonicensio.

C

¶ NIC. LEONICENVS, de falsa quarundam Herbarum inscriptione a Plinio.

¶ De ORMINO, STACHY, & Leucographide.



Orminos.

MULTAS HERBAS AC FRVTICES folijs Marrubio similibus scribunt Dioscorides, Galenus, ac Paulus, quas omnes Plinius non Prassio, id est, Marrubio, sed Prasso, id est, Porro folia tradit habere similia. Sic Orminon libro. 22. dixit semen habere Cymino simile, cætera Porro: sic Balloten, quæ alio nomine Marrubium nigrum, a similitudine foliorum appellatur, Plinius lib. 27. scripsit, alia nuncupatione Porrum nigrum a Græcis uocari, ac folijs quam Porri maioribus constare.

Stachys.

Sic Stachyn Porri habere similitudinem, longioribus folijs pluribusq; lib. 22. notauit. Idem Plinius lib. 27. de Leuce, Leucoleuce, aliarumq; herbarum generibus tractans, nominis similitudine, ac dictionis figura deceptus, eisdem Leucographida quoq; annumerauit, uisusq; est proculdubio Leucographida herbam putasse, quam tamẽ Dioscor. Galen. & Paulus genus lapidis, quod alio uocabulo Moroxus nuncupatur, esse testantur. Et ne quis forte pro Plinio obijciat, herbam etiam esse quæ eodem nomine cum lapide censeatur: eandem uires, proprietatesq; Leucographidi Plinius ascripsit, quas in eiusdem nominis lapide Dioscor. Galen. ac Paulus pariter retulerunt. Scribit præterea Plinius de Leucographide, qualis nam esset, ab autoribus scriptum non reperisse, cum tamen Dioscorides, & quid ea sit, & qualis, suo quinto de simplicibus medicaminibus libro satis notificauerit.

D

¶ De POLIO, ET TRIPOLIO.

Polium.

Tripolium.

Ob eandem nominis uicinatem Polium, pro Tripolio, & uicissim Tripolium pro Polio Plinius accepit. Nam libro. 21. duo Polij genera describit, quemadmodum & Dioscorides: alterum campestre, alterum syluestre, folijs utrunq; cani hominis similibus. At quod miraculum in Polio affert, eiusdem folia mane candida, meridie purpurea, solẽ occidente cærulea aspici, hoc de Tripolij flore a Dioscoride scribitur. Polium uero atq; Tripolium non modo locorum diuersitate in quibus utrunq; gignitur, sed figura insuper, atq; colore, ac proprietatibus etiam inter se plurimum differunt. Polium siquidem utriusq; generis partim in campis, partim in montibus nascitur: Tripolium uero in maritimis tantum locis, que unda maris allidit. Polium habet, ut diximus, folia cani hominis similia: unde & illi apud græcos nomen: Tripolium folijs Isatidis constat: quemadmodum de utroq; scribit Dioscorides, & Plinius ipse libro. 26. confirmat. Nam quod apud Plinium legitur de Tripolio, folio satis grossiore, palmo alto, error est codicis: ita enim legi oportet. Tripolium in maritimis nascitur saxi, ubi allidit unda, neque in mari, neq; in solo,

Emendatur
locus Plinij.

folio Ifatidis crassiore, palmeo caule, in mucrone diuiso. Hæc em̄ omnia **A** uerbum fere ex uerbo Plinius ex Dioscoride transtulit. Quod uero postea idem Plinius subiungit, hanc herbam eandem uideri quibusdā quæ Polium, miror ipsum quoq; illorum errorem sequi potius atq; imitari, quam improbare atq; abijcere uoluissē: cum quod de Tripolij flore miraculum legitur, Polij folijs assignauerit. Sed paruum hoc futurum erat in uita periculum, si nō etiam Polij uires uicissim Tripolio adscripsisset. scribit enim, Tripolij radicem dari hepaticis in farre coctam: quod quidem Tripolij remediū apud nullū grauioris autoritatis medicū legitur. Polium autem nō hepatis tantum, sed omniū plane uiscerum uitij auxiliari, autor est Galenus in octauo de simplicibus medicaminibus libro.

¶ De H E R A C L I O.

Scribit Dioscorides libro quarto, quoddam Papaueris genus, quod **Heraclium.** ab aliquibus Heraclium appellatur, habere foliū tenue, simile Struthio, id est, herbæ ita uocatæ. Quia uero Struthion apud Græcos significat etiam passerem, deceptus nominis æquiuatione Plinius, hanc similitudinem ad auem potius retulit quam ad herbam. Ita enim de Heraclio libro. 20. scribit: Alterum est in syluestribus Heraclium, folijs si procul intuearis, speciem passerum repræsentantibus. Sed qui fidem ex re ipsa habere non possit, aliquanto sane probabilius existimet, herbam herbæ potius, quam auibus folium habere persimile.

Radiculam
nos uocamus,
autore Her-
molao
Barbaro.

¶ De E M P E T R O.

B Empetrum. Empetrum ubi nascat, & quas habeat uires in trahenda bile ac pitu, ita scribit Plinius libro. 27. eodem quo Dioscorides modo: alias tamen et idem subiungit facultates, quod urinā cit, & calculos frangit: quæ a nullo alio autore de hoc Empetro traduntur. Quin contra Galenus Empetrum, quod etiam Prassoides appellatur, folis purgationibus. 6. libro utile esse testatur. At quos in altero Empetro, quod etiam Sarxiphages dicitur, Plinius legerat effectus, a græcis autoribus, ac præsertim Dioscoride traditos, huic Empetro a Sarxiphage diuerso, quod uim purgatoriam habet, nominis æquiuatione deceptusa, descripsit.

¶ De B E T O N I C A.

Betonicam a Romanis dictam, a Græcis Cestrum, pingit Plinius folio **Betonica.** Lapati, Dioscorides autem, cui magis astipulat sensus, folio Quercus. Alteram uero Betonicam, quæ alio nomine Eritanica appellatur, folia Lapati habere idem Dioscorides tradit: ut uerisimile sit, Pliniū alteram pinxisse pro altera.

¶ De P A R T H E N I O.

Parthenium scribit Plinius libro. 21. apud Celsum uocari Perdicium, **Parthenium.** & Muralium; deinde subiungit easdem Parthenio, quod Muralium appellatur, uires, quas Dioscorides alteri Parthenio ascribit, quod Chamemelon alio nomine dicitur: quoniam parum folijs & flore ab herba Chamemelo differat. Hanc autem Parthenium Chamemelo similē herbam.

Connulli ex recentioribus medicis Cotulam appellant. Sed hæc Parthenium non uocatur a Celso Perdicium, atq; Muralium, sed altera potius quæ Elxine a Græcis, & simul Perdicium, ac Parthenium quoq; nuncupatur, a Latinis autem Parietaria, & Muralium dicitur, quia passim in parietibus seu muris nascatur. Nostro quoq; æuo uulgo, una litera dempta, pro Parietaria, Paritariam appellant. Hanc eandem herbam, siue Muralium, siue Parietaria dicatur, connumerat Celsus libro suo de medicina tertio, inter ea quæ uim habent reprimendi simul ac refrigerandi. Quæ sane facultas ei Parthenio, quæ Perdicium & Parietaria appellatur, non autem alteri quæ etiam Chamæmelon dicitur, ab omnibus fere medicinæ autoribus adscribitur. Hæc enim sunt de eadem Dioscoridis uerba: Habent folia refrigerandi, atq; astringendi facultatem. Nec de ea aliter Paulus atq; Galenus tradiderunt. Ipse pariter Plinius libro, 22. eandem & Parthenium, & Perdicium quoq; nominari confirmat.

¶ De CYCLAMINI radice, & Aristolochia.

Cyclamini
radix.

Plinium etiam non tantum nomen, sed rerum quoq; ipsarum similitudo aliquando decepit. Nam Cyclamini radicem, quæ Rapum terræ propter rotunditatem dicitur, Aristolochiæ rotundæ, quæ & ipsa a radicis rotunditate nomen accepit, radicem esse existimasse uidetur. Nam libro, 25, quo in loco Aristolochiam quatuor distinguit generibus, eius quæ rotunda dicitur radicem scribit a piscatoribus Campaniæ Venenum terræ uocari, ac coram se contusam immixta calce, atq; in mari sparsam, continuo aduolasse pisces mira cupiditate, statimq; exanimatos fluisse. Hoc idem, ut a uiris grauissimis accepimus, nostro fit æuo ab eisdem piscatoribus, non Aristolochiæ rotundæ, sed Cyclamini potius radice, pisces allicienti atq; exanimandi causa. Ipse quoq; Plinius eisdem effectus non Aristolochiæ rotundæ, sed cuiusdam Cyclamini radici libro, 25, tribuit. Aut igitur fatendum est, duas esse radices quæ eisdem præstent effectus: quarum tamen alteram esse Aristolochiæ rotundæ radicem, neq; ab aliquo autore scriptum reperitur, neq; experientia comprobatur: aut illud dicendum erit, Cyclaminum, qui radicem habet rotundam, quartum esse Aristolochiæ genus: quo nihil dici posset rerum naturæ repugnantius. Siquidem inde apud Græcos Aristolochiæ nomen, ut Dioscorides ac Plinius ipse testatur, quoniam sit optima prægnantibus: Radix uero Cyclamini adeo est aduersa prægnantibus, ut si eam mulier grauida transcenderit, abortum faciat, ueluti Dioscorides pluresq; alij medici insignes retulerunt, ac Plinius ipse quoq; confirmat.

Aristolochia.

¶ De HELIOTROPIS.

Heliotropiū.

Quamuis plures sint herbæ quæ circumaguntur cum sole, Dioscorides tamen duo facit Heliotropij genera. Alterum folijs Ocymi, flore albo, subrufo, recuruo, ut scorpionis cauda possit uideri: unde & illi scorpionis apud Græcos nomen. Alterum non absimile folijs, iuxta paludes nascentis. Plinius uero libro, 22. cum & ipse duo genera Heliotropij describat.

in eisdem comprehendere uidetur illam Intybi speciē quæ a medicis græco nomine Cichorium appellatur. Ita enim eodem libro de Heliotropio scribit: Heliotropij miraculum sæpe diximus, cum sole se circumagentis etiam nubilo die, tantus syderis amor est: nocte ueluti desiderio contrahit cæruleum florem. Genera eius duo, Tricoccum, & Heliostronghium. Hoc altius, quantū utrunq; semipedalē altitudinem non excedat. Semen in folliculo messibus colligitur. Nascitur nō nisi pingui solo, cultoque maxime: Tricoccum ubique. Si decoquatur, inuenio in cibis placere. Quidnam aliud erit Heliotropij genus, cuius flos cæruleus existat, & non nisi pingui cultoque solo nascatur, quodque si decoquatur in cibis placeat, præter eam quam diximus Intybi speciem? Hanc tamen Dioscorides cum de Seride tractaret, ueluti unam eiusdem Seridis speciē notificandam duxit, ac proprietates longe ab Heliotropij uiribus diuersas assignauit. Quare mirandum est, quo pacto Plinius hoc loco, ubi Intybum designare uideretur, easdem tamen uires potestatesque subscribat, quas in utroque Heliotropij genere tradidit Dioscorides. Auget etiā illud magis admirationē, quod idem Plinius Intyborum remedia, ac præsertim illius quod Cichorium a Græcis dicitur, cuius flos cæruleus cum sole circumuertitur, priore in libro, scilicet. 21. suo loco notauerat, plurimū ab his quæ de utroque Heliotropio traduntur differentia.

¶ De P E N T A P H Y L L O.

Simili errore Plinius Pentaphyllon, atque herbam fraga ferentem pro eadem accepit, ac Pentaphylli notas simul ac uires eidem herbæ præter Pentaphylli nomē censuit adscribendas. sic enim libro. 25. de Pentaphyllo retulit. Pentaphyllum nulli ignotum est, cum fraga quoque gignēdo commendeat. Existimare tamen in re tā nota esse codicis potius quam Plinii errorē, ac pro Pentaphyllo, Trifolium legi oportere: quoniam ea herba quæ fraga gignendo commendatur, & quæ nulli ignota est, nō quinis, sed trinis constat folijs: nisi postea Plinius alia nomina græca subiungeret, atque alia afferret indicia, quæ non sunt alterius herbæ quā Pentaphylli propria.

¶ De A D A R C H E.

Adarchen Plinius inter species harundinum libro. 16. connumerat, ubi ita scribit. Est & in Italia nascens Adarcha nomine, palustris ex cortice tantum sub ipsa coma, utilissima dentibus. Adarchē uero Dioscorides, Galenus, & Paulus non harundinis speciem, sed potius falsuginē quandam in exiccatis paludibus harundinibus adhærentem esse scripserunt.

¶ De L E M N I A T E R R A.

Plinius libro. 35. inter cæteros colores natiuos Lemniam quoque rubricam connumerat, cui inter alia rubricæ genera palma a ueteribus datur. Hanc præterea multum ab antiquis celebratam cum insula in qua nascitur refert, nec nisi sigillatam uenundari solitam, unde & Sphragidos illi nomen fuerit apud Græcos. Hac præterea Minium sublimiri, adulteratque, remque in medicina præclaram esse testatur. Omnes enim huic

C bricæ facultates subscribit, quas prisca medici in Terra sigillata tradiderunt. Videat itaque Plinius Lemniā rubricā, & lemniā Sphragida, siue Terrā sigillatā eandē esse existimasse. At Galenus tū aliarū rerū quæ sunt in medicinæ usu, tum huius præsertim Terræ sigillatæ diligentissimus inuestigator, ut quæ, quemadmodū de se scribit, longis itineribus ad Lemnū infulā nauigauerit, ob nullā aliā causā, nisi ut Lemniā Sphragida, & quomodo nascere, & qualisnā esset, oculis ipsis contemplaret: aliud esse rubricā Lemniā, aliud Lemniā Sphragida, in suo de theriaca ad Pisonē lib. apertissime ostendit. Ita enim in eodē libro de Lēnia Sphragide, siue Terrā sigillata scribit. Præstat autē eā nō appellare Rubricā, sed Terrā. est enim quædā Rubrica quæ in insula Lemno nascit, quæ ad alios utimur effectus, diuersos ab hijs ad quos Terra sigillata adhibet. In nono autē sui de simplicibus medicaminibus libro idē Gal. Terrā Lemniā tribus distinguit generibus. Primū est eius quæ sacra dicebatur, quā neminē præterquam Dianæ sacerdotē atrectare fas erat, cui etiā eiusdē deæ signatura imprimebat, atque ob id Lemniū Sigillū uocabat. Secundū eius quæ est uere Rubrica, quæ fabri lignarij utebant. Tertiū illius quæ uires habet abstergentes: atque ob id erat in usu fullonū præcipua. Si itaque in re quā adeo curiose inuestigauit Galenus, eidē magis quam Plinio credere oportet, non recte Plinius quæ de Terra sigillata a ueteribus medicis tradita fuerant, eadē Lemniæ quocumque Rubricæ, quæ inter Colores ponit, ac nō fuit tantæ celebritatis, ut nō nisi sigillata uenderet, neque eodē habet quos Lemniū Sigillū in medicina usus, censuit adscribenda. Et hæc quidē omnia probant Pliniū ea quæ omnino inuicē distant aliquando rei, sæpius uero nominis similitudine deceptum, eadem esse existimasse.

¶ De Differentia C I S S I, et C I S T H I.

De Cisso uero ac Cistho quantum non per uolumen, sed per priuatam epistolam, ut qui nolim mihi cum homine mihi amicissimo, quæ colo & obseruo, publicas esse de studijs contentiones, tuis quas mihi pro Plinio obiecisti rationibus respondere statuerā. Hic tamen locus exigat, ut pluribus etiā argumentis quā in dictatis feceram, ostendam Pliniū alterū ab altera nesciuisse distinguere, Plinius libro. 17. describens omnia Hederarū genera, prima in marem ac foeminam diuidit, ac utriusque florem similem ait Rosæ syluestri, colore floris in mare ad purpuram accedente. Ex quo illud intelligi uoluit, foeminæ florem magis albescere. Hæc autem maris ac foeminæ differentia, florisque in figura similitudo, in colore diuersitas, neque a Theophrasto, neque a Dioscoride, neque ab alio grauioris autoritatis uiro in Hedera, sed in Cistho plane describit. Verisimile igitur est Pliniū nominis uicinitate deceptū, eo in loco, quæ de duobus Cisthi generibus traduntur Hederis tribuisse. Idē Plinius libro. 12. ubi de Ladano tractans, quo pacto ab hircorum Barbis depectat insinuat, ita scripsit: Sed Hederæ flore deroso pastibus matutinis cum est rorulenta Cypros: deinde nebula sole discussa in puluerē madentibus uillis adherere, atque ita

Terra sigillata

Lemnium sigillum quid.

Cissus.
Cisthus.

Ladanum depecti. Potest ne lucidius ostendi Pliniū pro Cistho Cisson, **A**
 id est, Hederam accepisse; nam quis unquam retulit præter Plinium, qui
 Cisson, id est, Hederā, pro Cistho posuit, pingue illud quod a Lada her-
 ba, quæ etiam Cisthos dicitur, Ladanum nuncupatur, Barbis hircorum
 Hederam, uel Hederæ florem depascentiū adhærescere; hoc enim de Ci-
 stho, siue Lada, quod & Ladani nomen indicat ab eadē herba deriuatū,
 non autē de Cisso, siue Hedera Dioscor. Galenus, Paulus, et quicunq;
 de Ladani genitura scripserūt, uno consensu retulerūt. Quin Plinius ipse
 eodē in loco ita scribit. Sunt qui in Cypro herbā ex qua id fiat Ladā ap-
 pellant: etenim illi Ladanū uocant. Ac postea libro. 28, de eadē herba ac
 Ladano nō aliter scripsit, quā supra cōmemorati uiri. hæc enim sunt eius
 uerba. Ledon appellat herba ex qua Ladanū fit in Cypro, caprarū bar-
 bis adhærescens. Est igit̃ Cissnos uel Lada, siue Ledō, nō aut̃ Cissos, id
 est, Hedera, cuius flore depecto Ladanum hircorum barbis adhærescit.
 Quod Plinius ipse hoc in loco lib. 28, plane cōfirmat, quāuis lib. 12. uis-
 sus sit dubitasse, utrū esset Hedera, uel Lada ex qua in Cypro Ladanū fi-
 eret. Cuius dubitationis originē inde emanasse crediderim, qđ aliquādo
 ex Chistho, aliqñ ex Lada, qm̃ utroq; nomine eadem herba indicat̃, La-
 danū colligi apud diuersos autores legisset. Ipse tñ modus, quē Plinius in-
 sinuat, quo pacto Ladanū hircorū barbis adhærescat, facile ostendit fru-
 ticem uel herbā, cui pingue illud infideat humilē esse, ac per terrā se spar-
 gentē, nō quemadmodū Hedera per arbores se ab humo attollentē, cum **B**
 ita scribat. Deinde nebula sole discussa in puluerē madentib. uillis adhæ-
 rescere. Neq; em̃ Barbæ hircorū Hederā depascentiū, quæ ut nonnullis
 placet ideo Hedera dicit̃, quia edita petat, nebula in puluerē sole discussa
 maderent, nisi non Cissum, siue Hederam, sed Chamæcissum potius, hoc
 est, Hederā humi repentē depascentē. Atqui quo pacto hoc etiā in Cypri
 insula fieri possit; in qua, si Theophrasto grauissimo autori credimus,
 nec Hedera quidē nascat̃: siquidem Cypros insula sit ad Asiā pertinens,
 ut omnes Cosmographi consentiūt, nec Plinius ipse dissentit, qui etiā fru-
 stra ab Arpalō Hederā in Asiā fatā affirmat. Vtrū uero suis temporibus
 in eodē cœli tractu proueniret non asserere ausus, id tantū scripsit: Hede-
 ra iam dicit̃ in Asiā nasci. Vnde luce clarius apparet, Plinium in eundē er-
 rorem incidisse, in quem lapsus est Auicenna, cum in suo de simplicibus
 medicaminibus libro, herbā ex qua fit Ladanū, Hederæ speciē significa-
 uit. In eodē. 28. libro, Plinius cum post factam de Hederis mentionē, de
 duobus quoq; Cisthi generibus scribit, ea uerba subiungit, sub hīs ma-
 xime nascit̃ Hypocisthis. Ex quib. uidet̃ inuere, sub hīs quidē Cisthi ge-
 neribus maxime nasci Hypocisthidē: sub Hederis autē nasci etiam aliquā-
 do, licet non adeo frequenter: neq; enim eo in loco, aut alibi Plinius de a-
 lijs Cisthi generibus aliquid dixerat, ut id maxime ad eorum potius, quā
 ad Hederarū comparationē posset referri. Possum ergo sic colligere: Hede-
 ra apud Pliniū diuidit̃ in marē ac fœminā, utriusq; flos similis Rosæ syl

Hedera unde.

Cuestri describit eodē autore, in insula Cyp̄o Hederae flore derofo Ladanū hircorū barbis adhærescit, sub Hederis quoq; Hypocisthidē nasci aliquando significat. Hæc autē omnia a nullo autore, excepto Plinio, de Hederis scribuntur, aut sensu ipso siue experientia comprobant, sed de duobus Cisthi generibus plane tradunt, atq; usu ipso ita esse cognoscuntur. Hæc igit̄ euidentissima sunt argumenta, Pliniū eodē cum cæteris errore deuiasse, q̄ Cisthon a Cisso, hoc est, ab Hedera nesciuere secernere. Atq; hīs quidē, ut ego arbitror rationibus, motus est autor libri, qui Cornucopia inscribit, uir, ut apparet, in herbarū uestigatione nō indiligēs, neq; oīno earū imperitus, ut de Hederis tractans, scribat Cisthon a quibuscūq; inter Hederarū genera cōnumerari. hoc em̄ in Plinio est ita manifestū, ut de eo nulla dubitatio haberi possit. Sed quoniā in puerbio dicit, si cæcus cæcū ducat, ambo in foueā cadunt, existimauit idē uir alioquin græcarū doctissimus literarū, Cisthon esse arbusculā quandā a Lada differentē, atq; ab illa Cisthū, ab hac Ladanū, id est, pingue, quod utriusq; plantæ folijs infideat appellari: cum tamen Dioscor. Gale. & Paulus eandem esse testent̄ Cisthon, & Ladam, siue Ledon, a qua id genus odoris quod Ladanum dicitur nomen acceperit.

¶ D E G L A S T O.

Neq; uero in eo tantū Plinius errasse uidetur, quoniam ut supra ostendimus, res omnino diuersas pro eisdē accepit, sed ob id etiā, quod easdem ob nominum uarietate putauit esse diuersas. Quamquam & eas quæ eodem nomine nuncupant, uarijs in locis tam uarie descripserit, ut quāuis eadem essent, ipsum tamen differentes existimasse iure quispiā possit arbitrari. Glasti similis herbæ Plantagini succo scribit Plinius lib. 22. infici uestes, idq; ei herbæ nomen esse apud Gallos. Nostro quoq; quo paucis mutatis literis, Guadum appellatur. At constat hanc eandem herbam a Græcis Isatidem uocari. Nam Dioscorides scribit, Isatidis succo uti infectores lanarū, eademq; herbam habere foliū Plantagini simile, atq; a Romanis Glutam, uel Glastum nuncupari. At Plinius lib. 20. Isatidem tertium genus facit Lactucæ sp̄cie nascentis: quarto simili Lapathio syluestri dicit uti infectores lanarum. Quod etiam ipsum a Græcis Isatidem dici, idem Plinius eo in loco facile indicat: quoniā eosdem effectus quarto generi tribuit, quos Dioscorides Isatidi assignat. Cum igit̄ Plinius nullam eodem in loco admonitionē adiecerit, eandem esse hanc Isatidem a Græcis uocatam, quam libro. 22. a Gallis Glaston appellari docuerat, uidetur profecto ignorasse quam herbā Græci Isatidis nuncupatione significarent. Alioqui sicuti easdē uires in quarto genere Lactucæ sponte nascentis scripserat, quas in Isatide Dioscorides, ita eidem folia Plantaginis, sicuti in Glasto fecerat, designasset.

Quid q̄d etiā, nisi menda sit codicis, quæ a Græcis dicitur Isatis, Radiculā a Latinis uocari, ac folijs Oleæ cōstare scribitur eiusdē Plinij lib. 19. ac postmodū eandē Radiculā non Isatim, sed Struthion potius ab ἡσδῆ

Perottus.

Glastum.

Struthion.

Græcis appellari, eiusdemq; ramos tingentibus præparari, libro. 28. in fi

¶ De E V P A T O R I O. (nuat.

A

Eupatorium.

Auicenna scribit Eupatorium habere folia Canabis, florem Nenupharis. Mesue idem Eupatorium folijs Centauræ minoris, floribus subcitrinis, longitudinis paucę constare. Serapio folijs Pteraphylli aut Canabis, florem autem non explicat. Fortunatum esse oporteat qui diuinare uoluerit, quisnam horum ueriora retulerit: ac quod medicus ille precabatur, qui medicinam sorti commiserat, dii sua cuiq; remedia quibus illa extraherentur secundarent, itidem a nobis orandum, ut bona fortuna in uerum incidamus autorem.

¶ De G R A N O

I N D I C O.

Ideo Serapio plantã quæ Habnil, id est, Granum Indicum gignit, scribit esse similem plantę lebleb, id est, Inuoluolo, siue Volubili, ut uocabulis utar apud medicos nostros usitatis, ac ramis præterea folijsq; uiridibus, flore in cuiusq; folij radice purpureo constare: pluraq; alia eiusdẽ plantæ addit indicia, quæ plane ostendunt eam esse omnino ab Isatide differentem. Hinc ortus est Simonis error, qui de Nil in litera N, ita scripsit: Nil arabice est Indicũ, quo panni tinguntur, & est succus plantæ similis Volubili: semen eius inter laxatiua ponitur. In quibus uerbis si Simon illud Indicũ innuat, de quo Dioscorides, Galenus & Paulus tradiderunt, multplex est mendacium. Neq; enim Indicum est herbe succus, uerũ, ut scribit Dioscorides libro. 5. & Plinius quoq; idem retulit libro. 35, Indicum est duorum generum: Alterum, quod fit arundinum Indicarum spumæ adhærescẽte limo. Alterũ ex purpure spuma in purpurarijs officinis cortinis innatante. Si uero ita Indicum accipiat, ut nos uulgo uocare consueuimus succum quẽdã herbæ, quæ a Græcis Isatis, a nostris Guadum, ut antea docuimus uocatur, quod Indicum dixerit herbæ succum, non sane a uero dissentit. At quod ea herba ex qua is succus exprimitur, qui Indicum appellatur, sit Inuoluolo similis, tam est in propatulo falsum, ut improbatione non egeat. Idem Simon in litera H, refert ex sententia Theodori Prisciani, Isatim esse Rubeam tinctorum. Postmodum in litera O, dicit Osatim, ut Macer scribit, esse gratam tinctoribus herbam. Quæ dicta tam uaria non paruam fidem faciunt, ignorasse Simonem quid apud Græcos Isatis, & quid apud Arabes Nil significaret. Quamquam in hoc postremo Simoni sit ignoscendum. Nam & Arabes ipsi de eadem Nil si bi non constant, quemadmodum ex scriptis Serapionis probauimus. Auicenna quoque quamuis uires potius ac proprietates plantarum enarrare, quam earum effigies indicare studuerit, cum tamen ipse quoque de eadem Isatide tribus in locis sub Nil uocabulo scribat, merito suspicionem affert, se etiam titubasse, atque ancipitem fuisse, quid nam esset Isatis. Nam in litera N, eadem de Nil scribit quę de Isatide Dioscorides: quoniam eodem modo diuidit in satiuam, atque syluestrem, atque

Serapio. granum indicũ.

B

Indicum.

C easdē fere uires ac proprietates herbæ Nil tribuit, quas Isatidi Dioscor. Sed rursus idem Auicenna in litera G ita scribit. Quasmein est foliū Nil. Et quædā alia subinfert, quæ in litera N de eodē folio declarauerat. Vnū tantummodo addit, qd capillos inficit. Non tñ in hīs neq; a seipso neq; a Diosc. multū Auicenna dissentit: ob id tantum reprehendendus, quod frustra de eadem re in diuersis literis scribat. At in eadē litera G plurimū a Dioscoride, ac ueritate ipsa uidetur discrepare. de grano enim Nil ita scribit. Granū Nil est Cartamū Indum. Deinde multas proprietates subinfert, quæ nihil ad Isatidē pertinent, pro qua Nil, siue Nigel idē Auicenna in N litera retulerat. Mesue quoq; hunc errorē animaduertens, ubi de Cartamo scribit, dicit quosdam falso putasse Cartamū esse granum Nil. Nec minor est apud autorem Pandectarum in eisdem rebus nominibus q; colluuiō. Nam & ipse falso scripsit, quod Arabice Nigel dicitur, Nefme a Græcis appellari, a Latinis autem Indicum. Et quamuis herbę Nil, siue Indico, omnes facultates subscripsisset, quas Dioscorides atq; Galenus, & Paulus Isatidi tribuunt; idem tamen alio in loco, uidelicet in litera B, scribit Ofatidem, uel potius Isatidem, Exborith græce, arabice autem Agisdo, latine Saponariam, uel herbam fullonū, omnibus hisce nominibus eandem herbam nuncupari. Ex quibus uerbis uidetur innuere, Isatim, quam ipse uitiose Ofatim appellat, esse Radiculam illam, cuius adeo succū in purgandis lanis Plinius lib. 19. extollit: nisi quod postmodū proprietates subscribit, quæ non sunt Radiculæ, seu herbæ fullonum, sed Isatidis potius, id est, herbæ tinctorū propriæ. Quantū uero huic autori Pandectarū credere debeamus, uno eiusdem uiri ignorantie argumento recitato patebit. Docet Dioscor. ex folijs Chameleæ cum duabus partibus Absynthij addito melle, uel aqua, fieri catapotia, id est, pillulas. Hic autem bonus uir, quicūq; fuerit, qui libros omnia mēdacīa continentes, composuit, nesciēs catapotia apud antiquos significare eas, quas nos uulgo pilulas appellamus, dixit, docere Dioscoridem fieri trociscos admixto absynthio duplici mensura, & una parte chameleæ & cataputiæ: quasi apud Dioscoridem hoc uerbū catapotia non pillulas, sed plantam potius, quæ uulgo cataputia dicitur, significaret. Sed ne, dum aliorū potius quā Plinij errata persequimur, usq; ad fastidium uolumen excreseat, ad propriū nostri institutum reuertamur.

¶ De E C H I O,
& A L C I B I O.

Echios.

Echios alterū genus describit Plinius eodē quo Dioscorides modo, laz nugine spinosa, & capitulis uiperis similibus. Hanc eandem refert Dioscorides libro Quarto ab aliquibus Alcibium uocari. Plinius tamē libro uicesimo septimo, quasi de alia re uerba faciens quam de Echi, quam lib. 6. contra serpentes bibi ex uino & aceto docuerat, ita scribit. Alcibium qualis esset herba apud autores non reperi, sed radicem eius ac folia trita ad serpētis morsus imponi & bibi iubent. Sic Dios

Alcibium.

corides libro. 2. Echios radicē ac folia e uino potari iubet contra eosdem **A**
 serpētes. Eſſe uero eandē Alcibion & Echin, illud nō tenue eſt argumen-
 tū, qđ neq; Dioſcorides, neq; Paulus de Alcibio ſeorſum ſcripſerūt, ſed
 de Echi tantūmodo, quā alio uocabulo Alcibiū, ſiue Alcibiadion dici pa-
 riſ retulerūt. Nicander etiā in Theriacis ſuis, id eſt, in eo libro, in quo re-
 media ſcribit cōtra animalia uenenata, eandē herbā Alcibiū, & Echin u-
 troq; nomine uuncupat, atq; eiufdē libri expoſitor, Alcibiū qđ ab inuē-
 tore, uel ut Demetrius inquit, ab Alcibio qđā, qui primus ex eadē herba
 remediū ſenſit, Echin aut qm̄ contra uiperarū iſtus uuliter bibitur, ſcribit

¶ DECENTVNCVLO. (appellatam.

Centunculum ſcribit Plinius libro. 29. uocari ab Italis herbam roſtra-
 tis folijs ad ſimilitudinem capitis penularum, iacentem in aruiſ, eandem
 autem a Græcis Clematidem appellari: eius præterea egregium effectum
 ad ſiſtendam aluum in uino aſtero teſtatur. At Dioſcorides libro. 3. non
 Clematidem a Græcis nuncupatā, ſed Gnaphalium potius ſcribit, a Ro-
 manis Centunculum dici: atq; eundē fere in Gnaphalio refert effectum,
 quem in Centunculo Plinius: nam eius folia in uino aſtero pota, dyſen-
 tericis prodeſſe confirmat, quod idē Plinius libro. 27. de Gnaphalio ſcri-
 bens pariter aſſerit. Dioſcorides præterea, qui omnes Clematidis ſpecies
 diligenter atq; accurate conſcripſit, nullam tamen hoc nomine a Græcis in-
 ſinuat uocitari, qualem designat Plinius roſtratis folijs ad ſimilitudinem
 capitis penularum in aruiſ iacentem.

Centunculū.

¶ DEIASINE.

Idem Plinius eodē lib. 29. atq; eodē in loco ubi Centunculū nominat,
 iaginē quoq; inſ Clematidas connumerat, quā lib. 22. laſinē nominauit.
 De laſine ſiquidē lib. 22. ita ſcribit. Salutaris eſt phtifiſ patientib. At lib.
 29. de Lagine ita. Phthiſicoſi uuat cū melle. Itē de laſine. Mulieribus lactis
 ubertatē facit. De lagine ſimiliter. Lactis ubertatē facit. De laſine quoq;
 Infantū capiti illita nutrit capillū, tenaciorēq; eiſ cutē facit. De lagine pa-
 riter: Et infantibus illita capillū alit. Vtranq; uero & laſinē & laginē in ci-
 bis placere, & uenerē ſtimulare teſtaſ. Quorū uicinitas nominū & pares
 ꝑꝑemodū effectus, argumento eſſe poſſint, uel laſinen, uel laginē in utro-
 q; libro eſſe legendū, atq; eandē plantā ꝑ diuerſis bis fruſtra a Plinio re-
 petitā. Eandem præterea laginē ſcribit Plinius ab aliquibus Echiten uo-
 cari, & tenue Scamoniū: quod dictū me ſuſpicari facit, ne laginē &
 Echiten pro Elxine & Euſine, codicis forſitan errore, ſcribaſ. Neq; enim
 agnoſcitur planta, quæ uerius tenue Scamonium dici poſſit, quam ea
 quam Græci alijs uocabulis & Elxinen, & Euſinen, & Ciſſampelō etiam
 appellant. habent hæc omnes Scamonijs notas. Libro ſiquidem quarto
 ſcribit Dioſcorides, Elxinen habere folia Hederæ ſimilia. At eiufdem
 Hederæ folijs & Elxines pariter Scamoniū libro eodē ab eodē Dioſcor.
 ſcribitur. Elxine quoque florem fere candidum, calathi figura, & plu-
 rimo lacte manat, & aluum ciet ſicuti Scamoniū. Hanc eandem El

B

Laſine.

C xinen Plinius, nisi fallor, libro. 21. Conuoluolum appellat: ob id, quod, ut etiam de Elxine scribit Dioscorides, omnibus in quas inciderit plantis circunvoluitur. Eiusdem florem scribit Plinius esse rudimentum naturæ Lilia facere condiscantis: in quo flore plurimi decipiuntur literatores, qui Simonis Genuensis autoritate freti, existimant eundem florem esse Ligustrum, de quo Vergilius: Alba ligustra cadunt: cum tamen Ligustrum sit arbuscula, quæ quidem flores albos profert, sed plurimum a Conuoluoli flore differentes. Eadem arbuscula hodie quoque in aliquibus Italiæ locis ab incolis Lagustrum, pro Ligustro corrupto nomine dicitur. Audio etiam a plerisque Caprifolium appellari, quoniã eius folio capræ præcipue uescantur. Non longe huic dissimilis in Asia nascitur, quæ a Græcis Cypros, ab Arabibus Alcana uocatur. Minus uero mirandum sit, Plinium hominem quantum negocijs ciuilibus deditum, tantum ab omni medicinæ exercitatione remotum, in hac fruticum ac herbarum contemplatione aliquando cespitasse: quando & Auicenna ipse, quem si uere eum, quem illi omnium fere ætatis nostræ medicorum tribuit consensus, in medicina principatum mereatur, non solum scriptis, sed rerum quoque experimentis atque operibus uere medicum fuisse oportuerit, tam in eisdem rebus ad usum medicinæ necessarijs uidetur fuisse implicitus atque perplexus, ut hanc ipsam Elxinẽ, siue Cissampelon, quæ latine Conuoluolum dici potest, & Alsinen, quam scribit Dioscorides Auriculam muris a Romanis nuncupari, & aliam quam Græci proprius Myosotida, id est, Auriculam muris appellant, & Anagallidẽ, quatuor scilicet herbas & natura & figura plurimum differentes, sub unius Auriculæ muris appellatione confunderet. Quod si quis pro Auicenna obijciat, potuisse eum & Alsinen, & eam quæ proprie Auricula muris dicitur, & Anagalliden, has tris omnes herbas Auriculæ muris nomine nuncupare, quoniam æque omnes folijs musculorum auribus similibus constant: hoc tamen de Conuoluolo, cuius folia sunt Hederæ folijs similia, nequaquam dici potuerit. Cur enim postmodum Auicenna seorsum de Anagallide sub proprio nomine tractauit, cuius antea proprietates in Auricula muris assignauerat? Cur etiam eiusdem proprietatibus alias commiscendas duxit, quæ sunt eius herbæ, quæ proprie muris Auricula uocatur, non autem Anagallidis peculiare? Sed ne uideamur Auicennam per calumniam falso reprehendere, eiusdẽ Auicennæ uerba ex secundo ipsius de simplicibus medicaminibus, libro in mediũ afferemus, Auricula muris, inquit, est herba, cuius uirtus secundũ Galenũ, propinqua est uirtuti herbę quæ uitrum abstergit. Hic Auicenna Alsinẽ sine dubio innuit, quã Dioscor. atque Galenus testantur habere similes uires Elxing, id est, Parietariæ, siue herbæ quæ uasa uitrea absterguntur. Deinde subiungis Auicenna. Et hoc nomen absolutum est duabus herbis, quarum una est quam nominat Gale. & odoratur ex ea odor Malug, & non habet duriciem. Hæc quidem Auicennæ dicta uera sunt de eadem Alfine, cuius mentionem facit Galenus libro Sexto.

Conuoluolum.

Ligustrum.

Cypros.
Alcana.

Auicennæ
lapius.

D

Auricula.
muris.
Anagallis.

Alfine.

quamquam nihil de tali odore retulerit. Quod uero demum addit Auicenna, quod altera quam nominauit Dioscorides, sit similis Volubili, nisi quia minora habet folia, omnino falsum est: hoc enim Dioscorides scribit de Elxine, quæ & Cissampelos dicitur, quod habeat folia Hederæ similia, minora tamen. Auicenna siquidem ab effectu Hederam Volubilem nonnunquam appellat, sicuti eadem ratione hæc ipsa planta, quæ apud Græcos Elxine & Cissampelos dicitur, latine Conuoluolum appellatur. Sed quænam Conuoluolum cum Alsine, siue Auricula muris in folijs, aut flore, potestati bus sue societas: quamuis tenuis quædam in nomine tantum apud Græcos similitudo reperiatur. Nam Auricula muris Alsine, Conuoluolum autem ab eisdem Græcis Elxine uocatur: quæ sane uiscinitas nominis decipit Auicennam, qui postmodum serpentes auibus, & tigribus urfos geminare uidetur, hoc est, res omnino differētes in una designare, cum Conuoluoli effigiem, atq; Anagallidis pariter pingirita enim post uerba paulo ante scripta subiungit. Est & herba expāsa super sufficiēterre, paruos habens stipites, domestica, bona, sine odore, & nō habet saporem fortem, azulinos habens flores, cuius semen semini Coriandri assimilatur. Hæc omnia Auicennæ uerba indicant alterum genus Anagallidis, quod florem profert cæruleum, & scemina dicitur, sicuti etiam effectus Anagallidis proprii ab Auicenna subiuncti manifestissime ostendunt. Quos, ut antea scripsimus cum seorsum de utroq; Anagallidis genere sub proprio nomine tractat ipse Auicenna subscribit: addit tamen & aliam quæ non est Anagallidis, ex sententia cuiusdam Musaich, facultatē. scilicet quod iuuamentū eius est iuuamentū Absynthij. Hoc autē non de Anagallide, sed ea herba quæ proprie Myosotis, id est Auricula muris a Græcis appellatur, differtq; ab Alsine, & utraq; specie Anagallidis. Legitur apud Paulum, qui eam ad occidendos adhibent uermes. Ex quibus omnibus colligit uerum id esse quod diximus, Auicennā maiori errore quam Plinium, qui res easdē tanq; diuersas exposuit herbarū, natura, ac figura differentū, proprietates ac uires in uno, ut dicē, capitulo miscuisse.

De ARCTIO, et PERSONATIA.

Sed non est nunc nobis cum Auicenna, sed cum Plinio negociū, quare ad ipsum reuertamur. Hic libro. 25. de Arctio, quamuis Echion errore codicis, ut arbitror, legatur, ita scribit. Arction quidam Personatiam uocant, cuius folio nullum est latius, grandes lappas ferentem: huius radicē decoctam ex aceto dant potui. De eadem Personatia non multos infra uersus Plinius ita scribit. Personatia, quam nemo ignorat. Licet autem & hic pro Personatia Persolata uitiōse scribatur, tamen quod sequitur, probat Personatiam esse legendum: ita enim subiungit. Græci uero Arction uocant, folia habet maiora etiam Cucurbitis, & hirsutiora, nigrioraq; & crassiora, radicē albam & grandē: hæc ex uino bibitur denariōrū duorum pondere. Videtur profecto Plinius duo Arctij genera putasse, quorum utrunq; Personatia diceretur, alterumq; biberetur contra serpentes

A

Cissampelos.

Conuoluolum.

Auicenna serpentes auibus geminat.

B

Myosotis.

Arction.
Personatia.

C ex aceto, alterum ex uino. Attamē & Dioscorides & Galenus, ac Paulus de uno tantummodo arctio profopite, id est, Personatiā scripserunt. Esse uero idem Arction, siue eandem Personatiā, quam primo & secundo loco describit Plinius, eiusdē Plinij uerba apertissime ostendunt: nam de prima ita scribit: Quidam Arction Personatiā uocant, cuius folio nullum est latius, grandes lappas ferentem. Hic autem procul dubio Plinius innuit illam, quæ a nostris tum Bardana, tum Lappa maior appellatur: Quam ideo ueteres Personatiā dixerunt, quoniam hac propter amplitudinem foliorum ad personatos faciendos utebantur. Hanc uero eadem ratione Dioscorides, Galenus ac Paulus Profopiten, id est Personatiā nuncuparunt, ac folijs Cucurbitæ, nigrioribus tamen atque hirsutioribus constare tradiderunt.

¶ De C H A M A E D A P H N E.

Chamæ-
daphne.

Plinius libro. 15. Chamædaphnem ita describit: Est & Chamædaphne syluestris frutex, & Alexandrina, quā aliqui Idæā, aliqui Hypoglotton, alij Daphnen, alij Carpophyllō, alij Hypelatē uocant. Ramos spargit a radice dodrātales, topiarij ac coronarij operis, folio acutiore quam Myrti, molliore ac candidiore, maiore semine inter folia rubro: plurima in Ida, & circa Heracleam ponti, nec nisi in montosis. Eandem Chamædaphnē postmodum Plinius libro. 22. ita describit: Chamædaphne uenico ramulo est, cubitali fere folio, tenui, lauri similitudine, & reliq̃. Quis non uideat Pliniū eidem plantæ differentes descriptiones afferre? Est enim prior descriptio in Daphne Alexandrina, nō autem in Chamædaphne libro. 2. a Dioscoride tradita. Esse uero Chamædaphnen a Daphne Alexandrina differentem, non solum Dioscorides, sed Galenus pariter & Paulus in suis de simplicibus medicaminibus libris ostendunt.

¶ De O X Y M I R S I N E.

Oxymir sine.

Ruscus.

Idem Plinius cum Myrtum satiuam libro. 23. descripsisset, eiusque uires ac facultates assignasset, postmodum subiungit Myrti etiam syluestris, quæ a Græcis Oxymir sine dicitur, proprietates: adeo, ut putasse uideatur, Oxymir sinen, quæ & Myrtus agrestis dicitur, a Myrto satiuā, sicuti plerumque alia herbarum, fruticum, atque arbuscularum genera, syluestris tantummodo atque satiuæ discrimine differre. Idcirco de Rusco, qui Oxymir sine, & Myrtus agrestis a Græcis nuncupatur, tanquam de re ab Oxymir sine diuersa, separatis in locis sæpe commemorat: quanquam non alias in Rusco, quam in Oxymir sine uires subscribat. Eodē tamen libro. 23. Plinius adducit Castoreū, qui id quod uerū erat existimauit, eandē scilicet esse Oxymir sinem apud Græcos, quæ latine Ruscus, uulgo autem etiam a medicis Bruscus appellatur, ex quo Plinij temporibus, sicut hodie quoque, fiebant ruri scopæ. Sed præter Castorem Dioscorides etiam libro quarto testatur, Oxymir sinen, siue Myrtū agrestem a Romanis Ruscum nuncupari. Minori tamen, ut uerum fatear, errore dubitauit Plinius, nunquid Oxymir sine esset Ruscus, an alia arbuscula tantumque syluestris, a Myrto satiuā

ua differens: quam Serapio Arabs affirmauerit Oxymirsinem esse arboris rem ferentem fructum, qui apud Arabes Cubebe uocatur: friuola satis rationi subnixus, quod neque Galenus de Oxymirsine, siue Myrto agrestis, neque Dioscorides de Carpesio, id est, Cubebis, ita enim Arabes Carpesion interpretantur, quicquam in suis de simplicibus medicaminibus libro tradidissent. Sed longe alia res est Carpesiū ab Oxymirsine, & qui utrunque nouit fructum, Cubebas scilicet & baccas rubentes, quas Oxymirsine uel Ruscus profert cerasijs similes, quantum deceptus fuerit sua coniectura Serapio facile iudicabit. Neque eo tantum fallitur Serapio, quod Oxymirsinem fructum, de qua scripsit Dioscorides, putet esse Cubebas, sed ob id etiam, quod Carpesium, de quo Galenus, non autem Dioscorides facit mentionem, Cubebas esse opinatur. Nam neque idem est Carpesium atque Oxymirsine: & licet Arabes, in quorum numero etiam est Auicenna, pro carpesio cubebas accipiant, aliud tamen significare Carpesium apud Græcos quam grana illa minuta, quæ Arabes Cubebas uocant, indicat Galenus in libro suo de theriaca ad Pisonem, qui scribit Carpesiū esse festucas quasdam tenues aromaticas similes in gustu Phu, id est, radice odorata cuiusdam herbae, quam nonnulli illam esse opinantur, quæ uulgo Valeriana dicitur. Licet non omnia quæ de Phu scribit Dioscor. Valerianæ conueniant. In Auicenna autem, qui omnia fere refert de Cubebis, quæ de Carpesio Galenus, alter est etiam error. Nam cum scribat Galenus, ut diximus, Carpesiū similes uires habere Phu, magis tamen subtili partium constare substantia: hoc non de Phu, sed de Rubea in Auicenna legitur. Hæc enim sunt eiusdem Auicennæ uerba pro Carpesio Cubebas indicantis. Cububæ quidē eius uirtus est similis Rubeæ: uerū tamen est sub-

¶ De L O L I O.

(tiorior.)

Aerem a græcis dici granum illud quod a nostris Loliū appellatur, scribit Dioscorides libro. 2. ac præterea hij, qui ab Aristotele in libro de somno & uigilia, atque a Plinio libro. 18. de eadem Aera scribunt effectus, quod scilicet capitis grauedinem & uertigines faciat manifestissime probant. Plinius tamen eodem libro, atque eodē capite Aerā describit, & Loliū quoque tanquam ab Aera differat separatim nominat. Nam si idem putauit & Loliū & Aerem, mirum quod sicuti in alijs plerisque frugibus atque earum uitijs, in quibus nomina latina non deerant, sicuti in frumento, ordeo, & auena Græcis utendum non censuit, non idem quoque in Lolio stauerit, tam præsertim apud omnes usitato uocabulo.

¶ De A V E N A.

De Auena error in eodem libro & capite legitur. Nam cum in principio uitia frugū exponit, scribit Ordeum in Auenam degenerare. Paululum uero infra refert idem Plinius, Ordeū necari a festuca, quæ nominatur Aegilops. At si Dioscor. credimus, quæ a Græcis Aegilops dicitur, a Latinis Auena nuncupatur. Galenus quoque in primo sui de alimentis uoluminis libro, cum in Tritico atque Ordeo generatio minus prospere cesserit

Crit, alterum in Aeram, alterum in Aegilopen frequentius conuerti testat: quod etiam maximū est argumentū, æram idem esse quod Ioliū, & Aegilopen idē quod Auēna. Quam Plinius gallicā Nardū appellat, Dioscor. Celticam uocat, quemadmodum illa apertissime indicant, quæ de nardo celtica & gallica ab utroq; autore referuntur. Hanc eandē nardū celticā scribit Dioscor. libro primo in alpihus Liguriæ nasci, atq; ab incolis Saliuncam appellari. Plinius tamen de nardo gallica & Saliunca locis separatis, tanquā rebus differentibus tractat. Saliuncam nihilominus lib. 21. herbam odoratā esse fatetur, quæ si uestibus interponatur, gratissima sit: eandem quoq; testat in alpihus nasci, atq; eius in medicina usum tradit, non multum a nardo celtica differentem.

¶ D E S I O H E R B A.

Sion herba. Idem Plinius lib. 22. scribit, Sion folijs Aprij, sed latioribus in aqua nasci, aliasq; eidē proprietates uiresq; subscribit, quas etiam Dioscor. libro secundo refert. De eodem postmodum Plinius libro. 28. de Silao fere eadem. Silaus nascitur glareosis & perennibus riuīs, cubitalis, Aprij similitudine, coquitur ut olus magna utilitate uesticæ. Vtrq; descriptio sine dubio ei herbæ conuenit, Aprio simili in aquis nascenti, quam quidam falso Senecionem appellant, aliqui uulgo Crissones uocant. Videtur tamen Plinius aliud Sij, aliud Silai nomine indicare uoluisse: aut si pro Silao Sion legendum sit, frustra eandem herbam duobus in locis descripsisse.

¶ D E C I N N A B A R I.

Cinnabaris. Quid quod Plinius aliquando uidetur uulgarē sequi opinionem, cum libro. 33. scribat Cinnabarim, cuius color in picturis proprie sanguinem reddit, esse Sanguinem draconis elisi elephantorum morientū pondere, permixto utriusq; animalis sanguine, quam quidem Cinnabarim utilē antidotis medicamentisq; esse confirmat. Medicos uero sui temporis, qui pro hac Cinnabari utebantur Minio, quoniam & ipsum Cinnabaris uocaretur, iure reprehendit. Nam hæc Cinnabaris, quæ etiam Minium dicitur, uenenū est: cum ex ea fiat argentum uiuum, quemadmodum uicissim ex argento uiuo fit Cinnabaris factitia, quam nos uulgo Cenabrium uocamus. Neq; ego sum nescius, plerosq; etiam medicos ætate nostra in eundem labi errorem, cum Cinnabarim in Receptis (sic enim suas compositiones appellant) scriptum inueniunt, ac pro ea nominis similitudine decepti, Cenabrio utuntur, quod uenenum esse probat. Quemadmodum igitur consulo hanc Cinnabarim in usu medicinæ fugiendā, ita nō sua deo draconum atq; elephantorū sanie ex India petendā. Nam ut fabulosum esse putē, Cinnabarim illam quæ ad usum picturæ & medicinæ adhibetur, ex utriusq; animalis sanguine permixto concinnari, grauissimi testis Dioscor. me facile mouet autoritas, qui quinto sui uoluminis libro, in quo de metallicis tractat, falso quosdam asserit existimasse, coloris similitudine deceptos, Cinnabarim sanguinem esse draconis. Durat uero adhuc antiquorum in eodem nomine persuasio: nam hodie quoque me

callicum illud, quod Dioscorides atq; Galenus Cinnabarim nominant, **A**
uulgo Sanguis draconis appellatur. Quamquā fere omnes nostra ætate
medici, Serapionis atq; Auicennæ errorem sequentes, id genus Sanguis
nis dratonis, quod in usu est, succum herbæ cuiusdam arbitrantur, quæ
a Græcis Sideritis uocatur. Sed de Sideritide quidem herba, omnibusq;
eius generibus plenissime scripsit Dioscorides. Ex nulla tamen eiusdem
specie talem exprimi succū edocuit, quo medici pariter atq; pictores ad
suum utriq; opus uterentur. Hunc tamen duplicem & in pictura & me-
dicina usum compertum habemus, in eo quod purum Sanguinem dra-
conis appellant, & de Cinnabari eundem Dioscorides Pliniusq; testan-
tur: quod me maxime mouit, ut existimarem idem esse Cinnabarim, de
qua Plinius, ac ueteres autores Græci scripserunt, & id qd nos uulgo San-
guinem draconis uocamus. Nam hic quoq; sanguini colorē quam simil-
limū reddit, & est rarus inuentu atq; difficilis, nec minus carus quā legi-
tur fuisse apud antiquos, quando syncerus atq; incorruptus uenundat.
Nam qui passim in medicamentariorū officinis uenalis exponit, adulteri-
nus est, licet eum pro uero in medicinæ usu recipiamus: quemadmodum
uile quandā terram, atq; uulgare pro Lemnia terra, quam, ut supra dixi-
mus, ueteres medici Lemniū sigillum appellabant. Sed in hac omnium
rerum etiam ad uitam pertinentium incuria, sit sanæ ueniæ locus, si alterū
pro altero negligenter accipitur, modo in uenenum præceptis non feratur
ignorantia, ut in Cinnabari diximus, pro qua sæpe Minium factitium re-
cipitur, quod uenenū esse docuimus: liceat pro Terra Lemnia, terrā no-
stratem gypseo colore recipere, quæ licet nihil habeat cum illa commune,
præter quendam ficti tamen sigilli characterem, non tamen est hic error
cum uitæ perniciæ. Pro Argemonio herba, quæ ut scribit libro secundo
Dioscorides, habet folium simile Papaueri agresti, florem pariter rufum,
radicem rotundam plurimo succo croceo manantem: utantur altero fru-
tice, qui etsi plurimum a uero Argemonio & effigie & uiribus distet, in
multis tamen morbis utilis esse probatur. Pro Eupatorio, Eupatoris re-
gis inuento, sumatur herba uulgaris passim in foueis nascens, quā licet
quid sit a pluribus ignoretur, constat tamen non esse uenenū. Pro Spina
alba, quā Arabes uocant Bedaguard, quoniā hæc a medicis ignoratur,
utantur Spongiola rosæ syluestris, quæ in spinis nascit. Nam etsi hæc plu-
rimū in medicinæ usu differat a Spina alba, nō tamen est hæc permutatio
exitialis. Hosce atq; alios quamquā & ipsos reprehensione dignos erro-
res quandoquidē interitū manifestum non adferunt, condonemus illis
quorum intererat hæc potius, tam ad usum medicinæ necessaria, quā ple-
raq; alia nullius ad uitam momenti diligenter atq; subtiliter perferuari:
modo pro semine Rutæ syluestris semen Cicutæ, quam nemo ignorat esse
uenenū, non admittat. Non sit tanti unus accentus, ut quo, cum Harmel **B**
scribit apud Arabes cum aspiratione significat Cicutā: cum sine aspirati-
one, Rutā syluestre, aliquando ex tantilla nota hoīm uitā periclitet. Ego

Sideritis.

Sanguis dra-
conis.

Armel.

Ruta sylue-
stris.

- C** quidē sapius artifices, q̄ pillulas ex Hermodactylis ac foetidas conficiūt, huius erroris admonui, nec cesso quotidie admonere, quamuis maior inueteratē consuetudini quam mihi fides adhibeāt. Quod si me audiant, neq̄ pillulis e lapide Lazuli eum lapidem adiungent, quo passim pictores utuntur. **MONTAGNANA** quidem medicus sua ætate celeberrimus, huius lapidis usum periculosum existimat: quoniā sapius nō natiuus, sed arte, quā alchimicam uocant, fictus uenundatur. Ego uero tam naturalē quam fictitium cauendum censeo: quoniam non miuus est uenenum quam Miniū, quod uulgo Cenabriū uocari indicauimus: atq̄ ideo nihil de hoc lapide apud Græcos autores legitur, quod ad purgandam atrā bilē sit efficax, aut quod alios quos de eo scribit Mesue præstet effectus, quos ego uerius de lapide Armeno affirmari posse existimaues rim. Nā & Mesue ipse, licet lapidē Lazuli, a lapide Armeno distinguat, non tamē uires ac proprietates admodū differentes in utroq̄ conscripsit. Serapio uero cum lapidē Lazuli notificat, eiusq̄ potestates exponit, nō alia refert, quam quē de lapide Armeno a Græcis traduntur, neq̄ postea quicquam lapidis Armeni alio in loco commemorat. Quod sane non tenuē est argumentū, Serapionē eundē putasse lapidem, & qui Armenus a solo in quo gignitur, & Lazuli a colore cæruleo, quē Arabes Lazuli appellant, uocaretur. Auicenna uero etsi seorsim de Azul, id est, de lapide Lazuli, & de lapide Armeno inter alios lapides scribat, quęcunq̄ tamen de lapide Lazuli refert, eadē omnia fere a Græcis autoribus, Dioscor. præsertim, atq̄ Galeno, de lapide Armeno scribuntur: hæc enim sunt Auicennæ de lapide Lazuli uerba. Virtus eius est sicuti uirtus eius quo adhæret aurū. Dioscor. de lapide Armeno libro quinto ita. Eadē facit quē Chrysocola. Auicenna de Azul, siue lapide Lazuli sic. Inest ei uirtus eradicatiua, putrefactiua, & abstersio eius cum acuitate, & stipticitate pauca. Galenus & Paulus de Armeno lapide eadem fere: Habet uires abstergentes cum acredine, & pauca quadam astringendi facultate. Auicenna de lapide Lazuli pariter. Bonos efficit pilos palpebrarum, & est ultimū, sicut dicitur, propter proprietatē quæ est in ipso: & dicit quod propterea, quia ipsum euacuat humores malos, prohibentes oriri pilos bene. In eandē quosq̄ fere sententiam Galenus de lapide Armeno ita scribit. Cum igitur tali natura præditus sit, miscetur medicaminibus oculorum, ipsum quoq̄ seorsum terentes, & in puluerem quodammodo redigentes, utuntur sicco ad augendos pilos palpebrarū: quando ob humorum acredinem quidā ex ipsis decidunt, quidā nō augent, neq̄ nutriunt. Nā ubi huiusmodi humorū acrimonia fuerit consumpta, ad naturalē habiū palpebra restituitur. Ex hijs igit tam similibus, ac pene eisdē tum Auicennæ, tum Dioscor. atq̄ Gal. de lapide Lazuli, & lapide Armeno sententijs, unicuiq̄ uideri potest, Auicennam eque ac Serapionē in lapide Lazuli lapidem Armenum designare. Magis uero in hoc Serapio quam Auicenna laudandus: quoniā cum lapidē Armenū sub lapidis Lazuli nuncupatione noti-

Lapis ar-
menus.

Lapis
Lazuli.

ficasset, nihil postea seorsim de lapide Armeno tanquam re a lapide Lazuli differente, id quod Auicenna fecisse probatur, scribendū censuerit. Quod si pauca quædam in lapide Lazuli addit Auicenna, ut quod uirtutem habeat eradicatiuā, & putrefactiua, quæ de lapide Armeno a Grecis non scribuntur, sed de altero metallo potius, quod ab eisdē Grecis Cyaneus appellatur, non sane mirandū est, Auicennam ut in plerisque alijs, ita in hoc quoque lapide rerum differentium proprietates miscuisse. Vnde illud euenit, ut sibi parum constare, atque inuicē pugnantia in hoc eodem lapide scribere uideatur. Nam si uirtutem habet eradicatiuam, quemadmodum de ipso scribit, quo pacto nutrit, aut producit capillos ex proprietate quæ est in eo, quos ex uirtute eradicatiua debeat extirpare? Quod si etiam sit putrefactiuus, cum ea quæ putrefaciendi uim habent, a medicis doctissimis, ac Galeno præsertim, inter uenena computentur, qua ratione pillulæ ex eodem sine uitæ periculo sumuntur? Hoc enim est id, quod ex lapidis Lazuli usu non paruū imminere periculū significauimus. Eundē enim esse censeo illi, quē Dioscor. atque Gal. sub Cyanei appellatione notificant, quæque idem Dioscor. libro. 5. uim destruendi ac putrefaciendi habere testatur. Atque ideo nullus ex Grecis autoribus sicuti lapidem Armenū, ita Cyaneū quoque purgandæ atræ bilis gratia docuit in pillulis de uorari. Neque me latet, quædā esse, quæ per se sumpta sint exitalia uenena, alijs tamen admixta salutaria reddant. Sed dicat aliquis, quisnam usus, aut ratio hoc in lapide Lazuli deprehenderit, nisi forte in eadē re Arabibus autoribus fidē adhibere uelimus, quod uerisimile est lapidē Lazuli a lapide Armeno nesciuisse distinguere, cum unius uires ac proprietates in altero noceant. Huius siquidē erroris non est omnino neque ipse Serapio expers. Nam licet de lapide Lazuli tantūmodo scribat, quo nomine lapidē Armenū uoluit intelligi. Quoniam uerba Gal. quæ Serapio in lapide Lazuli refert, sunt ab eodem Gal. in lapide Armeno conscripta. In fine tamen subiungit ex cuiusdam Alchanzi sententiā, lapidem Lazuli habere uirtutē aduersionem & putrefactiuam, atque ideo auferre uerrucas. Hæc autem, ut diximus, non est lapidis Armeni, sed alterius potius medicaminis, quod a Grecis Cyaneum, a Latinis Cæruleum appellatur, potestas.

¶ De CICUTA, NAPELLO, & ACONITO.

Neque uero mirandum est Auicennam in lapide Armeno, qui etiam a nostræ ætatis medicis ignoratur, hæsitasse quid esset, qui in Cicuta herba adeo uulgari tam anceps fuerit ac dubius, ut eā aliqui folijs Cucumeris, aliqui Mandragoræ iuxta diuersorum autorū opiniones constare tradiderint: & nunc eandē Succarā, nunc Alpharas, & nonnunquam Hyoscyamū nigrū appeller. Nam in suo de simplicibus medicaminibus libro. 2. sub Succaram appellatione Cicutam describit: eosdem siquidem Succaram tribuit effectus, quos Cicutæ Dioscorides. In quarto autem libro ubi de uenenis agit, Cicutā non Succarā, sed Alpharas uocat: & existimat ipsam esse Napellū, aut uenenū quod interficit hominē, & non interficit turdos. Et post

Cea subiungit eandem huius rei causam, quam affert Gale. non in napello & turdis, sed potius in Cicuta & sturnis. Hæc enim sunt Galeni uerba tertio de simplicibus medicaminibus libro. Cicuta hominem quidem interficit ob meatuum latitudinem, & caloris abundantiam, ac propter magnam quam habent arteriam in attrahendo uim, pollens adhuc pertingit ad cor. Non exanimat autem sturnos, contrarijs ex causis. In eandem sententiam scribit idem Galenus libro secundo de alimentis, & tertio de complexionibus, de Cicuta & sturnis, non autem de Napello & turdis: ut in ore est omnium fere medicorum, qui sola Auicennæ autoritate freti, id constanter affirmant, quod nulla habent experientia compertum. Quis enim sciat, an turdi sine noxa Napello uescantur, cum quid sit Napellus ex ipso Auicenna non constet? Signa enim quæ ab Auicenna ponuntur in eo qui hauserit Napellum, sunt eadem hijs quæ a Dioscor. & Paulo scribuntur in hijs

Toxicon.

qui toxicum biberint. Est autem Toxicon quoddam ueneni genus, quo sagittæ ab antiquis tingebantur: hinc enim illi apud Græcos nomen, quoniam missilia, quæ ipsi toxemata appellant, hoc potissimum medicamine inficerentur. Sed hoc idem ueneni genus ipse Auicenna paulo infra nominat corrupto uocabulo, pro toxico Tuffon, cuius se neque naturam, neque nomen nosse fateatur. Eisdem tamen in eo ex aliorum sententia tradit effectus, quos etiam Dioscorides ac Paulus in Toxico notant, ac quos paulo supra idem Auicenna in Napello conscripserat. Quod autem in autore Pandectarum legitur, atque ab omnibus fere medicis creditur, Napellum esse speciem Aconiti, id ex Auicennæ sententia affirmari non potest. Aconitum enim

Tuffon.

D duplex est, autore Gale. Aliud quod interficit lupos, atque idcirco apud Græcos Lycostonos dicitur. Aliud quod pantheras exanimat, ac similitudine ab eisdem Græcis Pardalianches appellatur. De hijs autem duobus Aconiti generibus Auicenna eundem Galenum secutus, sub nomine strangulatoris adhibet, id est, lupi, & strangulatoris leopardi seorsum a Napello tractauit. Quod si Auicenna non minus noxias quam etiam salutaris herbas incognitas habuisse probatur, quodnam ex eius uiri doctrina aut in euitandis uenenis, aut in capiendis remedijs auxilij sperare possimus? Atqui omnium artium professores hæc duo suscipere ac polliceri uidentur, bonorum, scilicet ac malorum in sua quisque arte scientiam.

Napellum.

Aconitum.

Idem Auicenna, ut ad id unde digressi sumus redeamus, eandem Cicutam eodem libro. scilicet quarto, ubi de uenenis agit, Hyoscyamum nigrum nominat. Nam quæcunque signa ab Auicenna scribuntur in eo qui hauserit Hyoscyamum nigrum, ac contra idem uenenum remedia, non alia sunt quam quæ in Cicuta Dioscor. ac Paulus pariter notauerunt. Nec minus idem Auicenna in altera herba, quam pro Cicuta recipi oportere in pillulis ex Hermodactylis insinuauimus, incertus fuisse uidetur quid esset, cum gummi eius inter uenena ponat, atque ea signa pariter atque remedia in hijs qui idem gummi hauserint scribat, quæ Dioscorides ac Paulus non in gummi Rutæ syluestris siue montanæ, neque enim usque legitur aliquam Rutæ syluestris speciem habere

re gummi tale, quod uenenū sit, sed potius in ueneno quodā quod Ixiā
 fa appellat, de quo etiam Nicander in theriacis suis facit mentionem, pa-
 riter notauerunt. Auicenna etiam in eodē quarto libro, ubi docet curati-
 onem morsus uiperæ, scribit Rutam agrestē non esse, ut multi opinant,
 Harmel: cum tamen & Dioscor. & Galenus ac Paulus quoddam genus
 Rutæ agrestis Moly besafa, atq; Harmalū appellari testent. Quod quo-
 niam, ut ijdem tradunt autores, uim habet incidendi & discutiendi len-
 ros ac tenaces humores in articulorum doloribus: ad quos pillulæ ex her-
 moda ctylis ualent, quoniam magna ex parte talium humorū uitio pro-
 ueniunt, utilius adhiberi existimauerim quam Cicutā, quæ sua frigiditas
 te augere potius eundem morbum possit quam tollere. Galenus siquidē
 libro de simplicibus medicaminibus primo, semen Cicutæ præ omnibus
 alijs frigidissimum esse testatur. In quinto uero eiusdem uoluminis lib.
 et si quædam uehementer frigida probat hebetandi sensus gratia, ubi im-
 patibiles crutient dolores, usum tamen Cicutæ in totum damnat: ut quæ
 non solum frigiditate, sed etiam superflua humiditate sit perniciofa.

¶ De CISTHO, & HEDERA.

Non uidetur tibi Plinius libro. 12. iure reprehensus, qui Cisthon her-
 bam, ex qua fit Ladanum, Hederam nominauerit, quoniam, ut inquit,
 Paulus, Aegineta Cisthon hanc etiam Cisson, id est, Hederam nominet,
 & Dioscor. eandē Cissaron, id est, Hederulam uocari tradat. Ego quod
 cū ueniæ præfatione dicere liceat, doctissime Hermolæ, nusq; reperi-
 apud Paulum, aut Dioscor. herbā illā ex qua conficitur Ladanū, de qua
 nobis est disputatio præsens, Cisson, id est, Hederam, uel Cissarion, id
 est, Hederulā nuncupari, sed potius Cisthū, aut Ledon, siue Ladon: hæc
 enim sunt Pauli uerba quarto sui de medicina libri uolumine, in quo agit
 de simplicibus medicaminibus: *λάδανον ἀπὸ τοῦ κισσοῦ λάδανος λεγομένη γίνεται*, id est, La-
 danum ex Cistho Ladone appellata fit. Sic Galenus medicamentum id
 quod Ladanū appellatur, ex Cistho, non autem ex Cisso fieri attestatur.
 Neq; Aëtius, his ætate aliquanto posterior, nō tamen exiguæ apud Græ-
 cos autoritatis medicus, alia usus est in eadē herba, quā Cisthi appellati-
 one: alterā tamē huic non longe dissimilē sub qua nascitur Hypocistis, nō
 Cissaron, sed Cistharū duo isti nobilissimi medici nuncuparunt. Diosco-
 rides uero alterum Cisthi genus, sub quo nascitur Hypocistis, tam Ci-
 sttharum, quam etiam Cissarum a quibusdam scribit nominari: alterum
 uero ex quo fit Ladanum, non cissaron, sed Ledon tantum a quibusdam
 inquit uocitari. Quo fit ut Cissari nomen, quod latine Hederulam recte
 dici posse arbitraris, non ei herbæ ex qua Ladanum generatur, sed illi
 potius sub qua nascitur Hypocistis, etiam Dioscor. teste conueniat: quæ
 etiam herba ladanifera, si nomine a Cisso, uel Hedera diuerso diceretur,
 κισσος potius quam κισσός pronunciaretur, faciendi gratia inter ipsam atque
 Hederam saltem ex accentu differentiæ. Quare ἀπὸ τοῦ κισσοῦ uox diminu-

C tiua formata, nō hederulam, sed proprii generis herbā significaret, quod etiam sit de altera, sub qua nascitur hypocistis, statuendum. Quamquam & Plinius ipse Cisthum non idem cum Hedera nomen, sed uicinū tantū fortitam esse insinuauit. Vicinū autē nomen uel *κισσος* fuerit, uel *κισσος*, a quo per diminutionē *κισσαρον*, sicuti *ἀπὸ τοῦ κισσῶ κισσαρον*. Neq; uero hanc ipsam plantā, ut etiā tibi concesserim facta *ἀπὸ τοῦ κισσῶ* diminutione a Græcis Cissariū nuncupari, puto a Latinis recte Hederulam posse nominari: quoniā non sequitur, ut si *κισσος* uel *κισσαρον* multa significant apud Græcos, plantam. s. sub qua nascitur hypocistis, & hederam, uel hederulam, si qua inter hederæ species alijs minor existit, qualis est ea quæ a Theophrasto Elice, non autem Cissarum nominatur, idcirco & Hedera, uel hederula totidem habeat apud Latinos significatus: tanquam is frutex qui arbores scandit ac circunouoluitur, quam etiam alter suffrutex sub quo nascitur hypocistis, quæ due plantæ inter se non solum genete atque natura, sed etiam colore atque figura plurimum distant, Hederæ uocabulo comprehendantur. In hoc sane, quemadmodum in multis alijs, errore fuit autor Pandectarum: qui uolens, ut arbitror, Auicennam tueri æque ac Plinium medicinam utranque confundentem, Hederæ nomen aliquanto etiam quam ceteri fusius accepit: adeo ut omnem herbam qua capræ libenter uescuntur, ab edendo Hederam appellari posse putauerit. At tibi homini literatissimo, quem crassa Minerva dedecet, scio hanc rationem non probari.

D Atque ideo non parua me cæpit admiratio, quo pacto unquam in animum inducere potueris, ut Hederæ nomen apud Latinos plantā, ex qua fit Ladanum, significare posse credideris: cum nusquam inueniri possit huiusmodi significatus exemplum: qñ & Plinius ipse libro duodecimo dubitare uidetur, utrum sit Hedera, uel Lada, quam hirci depascentes medicamen id quod Ladanum nuncupatur, barbarum, uillis adglutinent. Non te sane latet, uirum tam græca quam etiam latina insignem literatū, plæraque apud Græcos uocabula multipliciter dici, quæ tamē apud nos non seruant eandem significatus multipliciter. Nam

φιλία. *φιλία* uerbum apud illos significat amare, & osculari: Amare autem pro osculari nunquam, ut arbitror, in nostro sermone reperies. Sed ut ab *οἰκίος*. ipsis de quibus agit plantis sumatur exemplū, *οἰκίος* in Græcorū lingua & lentiscū arborē, & id cepe genus quod ab ipsis *σκίλλα*, a Latinis Scilla appellatur, significat: non tamen in nostra lentisci uocabulo aliud quam arbor designatur. An non tu Theodorum Gazam, quem tamen in Themistij editione præ cæteris imitandū tibi proposuisse fateris, in hoc tamen Plinianarum castigationū opere carpis, quod nimīū lingue latine amplificā de studiosus, id genus Rhaphani agrestis, quod a Græcis *ῥαπῖον* uel *ῥαπῖον* appellat: quoniam *ῥαπῖον* apud illos etiam Pirum significat, latine dixerit Pirum? Quid enim aliud inuere uolebas, nisi non esse piri apud Latinos æque atq; apud Græcos *τοῦ ῥαπῖου* duplex significatū? Ego uero Theo. Gaze in hac pte patrocinarī nō uerebor, quē puto *ῥαπῖον* etiam p Rhaphano agre

ſti pirum recte conuertiffe: quoniã id Rhaphani genus idcirco tale nomẽ **A**
 apud Græcos fortitum uidetur, quod Piri effigiem ſua figura repræſen-
 rat. Quare ob eandem ſimilitudinem etiã a noſtris commodè Pirũ di-
 ceretur. Græci ſane uel ruſtici, qui eiũdẽ Rhaphani uſum quẽ & Theophrast.
 & Dioſcor. retulerunt, habent experientia compertum, quod, ſi
 pars eius ſuperior uomitum faciat, inferior uero aluum ciat, nunc etiã
 Chamæpidium, id eſt, terræſtrem pirum uulgo uocare conſueuerunt. **Chamæpi-**
dium.
 Multa tamen alia ſunt, in quibus iudico eundẽ Theodorũ Gazã minus
 recte latinis uocabulis uſum fuiſſe pro Græcis. Nam hoc ipſum, de quo
 diximus, Rhaphani genus, quoniã non ſolũ *ῥαπῆς*, ſed etiã *ῥαπῆς* uocari a qui
 buſdã in græco Theophrasto codice legitur, idẽ nomen Theodorus Ca-
 ricã tranſtulit. Sed quãuis ita apud Theophrastũ, cuius de plantis uolu-
 mina magna ex parte ſunt deprauata, legatur, neq; tu id uerbũ in Plinio
 caſtigauetis: Dioſcor. tamen, cuius liber aliquanto emendatior quam
 Theophrasti apud Græcos habet, non Iſchada, ſed Iſchiada potius alio
 nomine idẽ medicamentũ nuncupauit. Qui ſi etiã Iſchas, ut apud The-
 ophrastũ & Pliniũ ſcribitur, diceretur, non poſſe tamen Caricæ uocabu-
 lum in lingua noſtra aliquam Rhaphani ſpeciem, quæ nullam habeat
 Caricæ ſimulationem, ſignificare.

¶ De errore Theodori G A Z AE in

C E N T A V R I O.

Iſdem rationibus quas paulo ante de Hedera attruli, auſim confirmas **B**
 re, ſimili errore, atq; aliquãto ſane maiore. Theodorus Gaza Centauriũ
 maius, Fel terræ nominauit. Nam cum Theophrastus libro. 9. de plan-
 tis ſcribat, Centaurij radicẽ ad decẽ annos referuari, ac proculdubio Cen-
 tauriũ maius intelligat, cuius radix, nõ aut folia, quemadmodũ contra mi-
 noris folia, non aut radix, ad uſum medicinae adhibeatur: hanc in utraq;
 Centaurio differentia non animaduertẽs Theodorus, ut qui apud Dio-
 ſcor. Gale. & Plinium etiã forte non legerat, Centaurij minoris radicẽ
 eſſe ſuperuacua, atq; ideo nullam eſſe ipſam referuandi neceſſitatẽ, ita
 illum Theophrasti locum eſt interpretatus. Publica uero omniũ radicũ
 differentia, qd alia plus, aliẽ minus tẽporis durant. Hellebori em̃ uel an-
 nis. CCC. utilis durat: Malum terræ aut. V. aut. VI. Vernilago. XL. Fel ter-
 ræ. XII. Pinguis hæc ſpiſſaq; admodum eſt. Iam uero hic error Theodo-
 ri manifeſtus apparet, qui ſcribente Theophrasto, Centaurij maioris ra-
 dicem pinguem ac ſpiſſam, cuiuſmodi eam Dioſcorides & Plinius etiã
 ſcripſerunt, ſicuti minoris tenuem, ac nullius in medicina uſus reſule-
 runt. Ipſe tamẽ de minori ea ſcribi a Theophrasto putauit, quæ nullo pa-
 cto eidem conueniebant: atq; ideo Centaurium Fel terræ uocauit: quo ſa-
 ne nomine Centaurium minus, ob eximiam amaritudinem conuenienti-
 us inſignitur: maius uero tantũ abeſt ut Fel terræ dici poſſit, ut multo re-
 ctius mel terrẽ uocaret. nam eius radix eſſe ſubdulcis a Dioſcoride tradi-
 tur: & qui eandem norunt ita eſſe experientia comprobarunt, Ego ſane

Centaurium
 maius.

C scio ipsam ab omnibus fere medicis ætate nostra ignorari. Conciliator quoque differentia centena, Centaurium maius æuo suo incognitum fuisse testatur, licet milies ipsum, ut arbitror, uiderit, atque ad opera medicinæ frequenter adhibuerit: quod etiam nostri temporis medicis frequentissime me contigit. At qui fieri potest, aliquis inquiet, ut uel Conciliator, uel eo posteriores medici id medicamentum ignorauerint, cuius usum aliquando nouere: nam proculdubio hæc inuicem pugnantia uidentur. At si mihi more sophistarum loqui liceat, illud dicere ausim, Centaurium quidem maius a medicis nosci, non tamen ab eisdem nosci Centaurium maius: quemadmodum Eupatorium agnoscunt, non tamen agnoscunt Eupatorium, in quo sane minus quam in Centaurio maiore sunt excusandi. Nam licet hoc non solum peregrini, sed etiam sit soli Itali germen, non tamen in multis Italiæ prouenit locis. At Eupatorium in pratis, in uiridariis, in uepribus, in planicie, in montibus passim nascitur, & nisi conuiuesamus ubique fere nostros incurSAT oculos. A Dioscoride uero ac Plinio eius effigies ita describitur, ut pene ante oculos poni uideatur. Hæc quales sint herbæ, quo nomine a nostris uulgo uocentur, consulto celari constitui: ne quod quidam mihi suis contra me scriptis, ut audio, obiecerunt, qui scilicet inter te ac me discordiam quæsiuerunt, tuum uidear expectatissimum de huiusmodi rebus præripere uelle tractatum.

¶ De errore Gazæ in BIBINELLA, et
SCOLOPENDRIO.

D Redeo ad Theodorum, qui & Thrialidem Bibinellam, & Scolopendrium Linguâ ceruinâ conuertit, eodem, scilicet linguæ nostræ amplificandæ studio p̄motus, non sane improbando, modo rerum p̄prietas & natura seruetur. Nā ut de Lingua ceruina taceā, quæ non est Græcis Scolopendriū, sed altera potius ab eisdem Hemionites nominata, illi quidē uiribus proxima, figura autē plurimū distans. Licet tu in tuis castigationibus tam ambages similes scripseris, ut difficile sit internoscere: ut, inquam, de ista taceā, ob eā saltē quā habet cum Scolopendrio potestatiū similitudinem, Thrialis omnino differt ab ea quā uulgo Bibinellā appellamus. est enim altera potius quam Græci tum Phlommum, tum etiam Trialida uocant, hoc est, Elychnium: quoniā pro elychnio in lucernis utuntur, Latini Verbascū nominant, quidam recentiores Taxum barbatum.

¶ De MILO ARBORE.

Milos arbor.

Pari errore Theodorus Milon arborē, Taxon latine dixit, cum tamen Taxos arbor, non Milos, sed Smilax a Græcis uocetur. De qua quidem Smilace Theophrastus tanquā arbore differēte seorsum a Milo tractauit. Quo etiam in loco Theodorus græcam seruauit appellationē, hoc est, Smilacem dixit, ubi Taxum potuit interpretari: ubi autem Milon scribere oportuit, quoniam huic forte arbori nomen lingua latina non dedit, ipse Taxum nominauit. Quo tamē in errore magis est Theodoro ignoscendum, quā & Plinius noster simili p̄p̄inquitate deceptus, Milon arborem

inter Meliæ, id est, Fraxini species libro. 16. collocauit: quod facile est animaduertere, si quis quæ de Milo arbore lib. 3. Theophrast. quæ de uarijs Fraxini speciebus scripserit Plinius, diligentius inspiciat. Vide quot notæ apud Theodorum, male aliquando Theophrastum interpretantem, & Plinium etiam implicant, qui, nisi tu eos doctorum doctissimus solueris, mihi sane uidentur inexplicabiles.

¶ De C H A M A E D A P H N E.

Idem Theodorus Chamædaphnem Vincamperuincam apud Theophrastum interpretatur, cum tamen Chamædaphne alia sit planta, cuius descriptio apud Dioscoridem plurimum a Vincaperuincia est aliena. Cuius etiam Vincaperuincæ naturam, imaginemque accuratius contemplantibus, illa esse uidebitur quæ a Dioscoride ac Plinio pariter Clematidis atque Daphnoidis, & Polygonoidis nominibus designatur.

Chamædaphne.

¶ De A P A R I N E.

Theodorus insuper Aparinen Lappam nominauit, cum tamen Lappæ nomen communius appareat, ac sicuti per excellentiâ Personatiæ potius grandes lappas ferenti conueniat. Hîj tamen de Vincaperuincia, & Lappa Theodori errores ex Plinij autoritate, ita easdem herbas nuncupantis, habuere occasionem: quemadmodum & ille haud parui sane momenti, quo æque ac Plinius, Theodorus lib. 6. Theophrasti Cisthū Hedera transtulit, atque eodem modo in mare diuisit & foeminā, & florē utriusque rosaceum adscripsit, in mare purpurā accedente. Idcirco autem superius illa in Theodori translatione errata notauimus, ut hoc postremum quod plurimum meæ opinioni aduersabatur, exemplo aliorum magis confirmaremus. Iam enim quidā mihi Theophrastum obijcere moliti sunt lib. 6. interprete Theodoro Gaza, non aliter quam Plinium libro. 16. Hederam diuidentem, eundemque illi florem deputantē. Quæ si pro ueris, atque si deliter ab utroque autore scriptis recipiantur, nulla dubitatio relinquetur, Cisthum, id est, Ladam, posse etiam Cissum, id est, Hederam, ut tibi uideo placere, uocitari: & quæ de Cistho Theophrastus, cæterique autores Græci tradiderunt, eadem a Latinis de Hedera absque ullo errore referri. Quare cum in hoc totius controuersiae nostræ cardo uertatur, liceat mihi hunc locum, cum bona abs te uenia impetrata, diligentius examinare, quando & tibi non fuit indecorū ad leuia ista nostratiā legēda, & iudicio cognoscēda descendere. Hactenus quidē de solo nomine disputauimus, liceret ne Cisthū utraque, tam eā. s. quæ fert Ladanū, quā alterā sub qua nascitur Hypocisthis, Hederam latine appellare. Sed esto hoc uerbū Cissos apud Græcos tam de Cistho altera planta, quā de uera Hedera proferat, sicuti uox ista Canis, tam de animali terrestri, quā etiā de cœlesti fidere dicitur: at quemadmodum neque canem cœlestem recte in marem ac foeminam diuiserimus, neque utrumque sexum habere latrandi naturam concesserimus: eadem, ut puto, ratione neque Plinium Hederam per maris ac foeminæ differentias iure partitur, neque utriusque florem rosaceū con-

Cuenientem assignat: quoniam hæc Cistho, non autem Cisso Hederæ a Theophrasto & Dioscoride, & ab ipso Plinio libro. 22. tribuuntur. Vt enim omittam illam Hederarum in marem & foeminam libro. 16. ab eodem Plinio positam diuisionem, quam forte quispiam omnium plane herbarum, fruticum, suffruticum, atq; arborum communem esse contendere, quis unquam uidit rosaceum in Hederis florere? Tanti ne esse debet Plinii, aut Theodori Theophrastum interpretatis autoritas, ut illis potius, quam oculis nostris credere debeamus? Magnus sane philosophus Aristoteles, tanti iudicii sensum existimauit, ut ubi iste adsit, uanum putet querere rationem. Galenus omnium medicorum princeps, illos pro insanis habendos putat, qui cum ex sensibus possint habere probationes, eas ex demonstrationibus petendas censent. Auicenna eiusdem Galeni, ut de seipso fatetur, interpretes, eos qui sensibus credere nolint, igne exurendos, aut flagellandos iudicauit: ut dolorem sentientes, sensuum iudicia uera esse perciperent. Et recte quidem hi uiri doctissimi sunt arbitrati. Cur enim nobis oculos, & reliquorum sensuum opificia natura concessit, nisi ut ad prospiciendam inuestigandamque ueritatem propriis possimus niti subsidijs? Non debemus profecto ita nosmetipsos destituere, ut aliorum semper uestigia sequentes, nihil per nosmetipsos decernamus. hoc enim uere esset alienis oculis uidere, alienis auribus audire, alienis naribus odorari, aliena sapere intelligentia, ac nihil nos aliud quam lapides esse statuere, si omnia aliorum assertionibus committeremus, nihilque a nobis ipsis discutiendum putare

Sensuum iudicium certissimum.

Dmus. Quam tamen opinionem tum in omnibus alijs questionibus, tum in hac praesertim de Cisso & Cistho debemus abijcere: ubi tanta inter Hederæ florere, ac Rosam syluestre apparet differentia, ut eiusdem Rosæ comparatione Hederæ flos aliud potius, quam flos, id est, lanugo quædam uideatur, qualis in Vite, ac Moro, Populo, ac plerisque alijs plantis conspiciatur, quæ ita ab alijs discrepant flore, ut ne flores quidem ullos unquam preare existiment. Atque ut iam ex ijs quæ sensu percipi possunt luce clarius ostendamus, noluisse Theophrastum, Cissum, id est, Hederam, sed Cisthum potius diuidere in marem ac foeminam, ac Rosæ syluestri similem florere utriusque subscribere, quæ idem autor de Hederæ flore scribat libro primo, differentiam plantarum per flores ostendens, in medium afferemus. Hæc sunt, ut tu optime nosti, Theophrasti interprete Theodoro Gaza libro quo diximus uerba. Nunc illud exploratum habemus per omnes partes, plures differentias uario modo exultare. Nam flores alij lanuginei, ut uitis, mori, hederæ. Alij foliati, ut amygdali, mali, piri, pruni. Vt uero etiam euidentius quid sit apud Theophrastum flos lanugineus intelligatur, alia ipsius Theophrasti uerba de eodem flore lanugineo subtexent ex libro. 2. ubi ita scribit. Huic Plantago similis constat, nisi quod flores non quemadmodum illa particulatim edit, sed per totam spicam tritici modo, ambobus tamen flosculus lanugineus exit, sicuti frumento, & reliquis. Item Theophrastus de re eadem ita. 9. uolumine edisserit. Quin & floribus differentia tum natura, tum positu data est, de quibus fere in hijs

quæ in uniuersum digessimus satis dictum existimamus: scilicet quod alij lanuginei, ut omnium fere germinantium spicarum: alij folijs constant, ut leguminum. Quod si quis adhuc etiam qualis sit flos lanugineus, qualis uel ei oppositus foliatus ignorat, ipso Theophrasto exempla non pauca suggerente, primum quidem in uite, moro, plantagine, panico, milio: secundum uero in amygdalo, malo, pruno, & leguminibus contempletur: neque uel minimum dubitabit, quin Rosæ syluestris in altero genere florum, quos Theophrast. foliatis appellat, comprehendatur, lanugineis ex aduerso distinctos. Quare Hederæ flos non magis Rosæ syluestris, quam flori, mori, uitis, plantaginis, milij, panici simulationem continebit. Sed quoniam nonnulli sunt qui mentis aciem longe clariorem quam corporis iudicant, atque hebetis obtusique hominis putant, omnia sensus testimonio, nihil autem probare ratione, age & argumentis ex media sumptis philosophia aptissime demonstremus, nusquam Theophrastum illam de qua supra diximus in Cisso, id est, Hedera, sed Cistho potius libro. 2. fecisse differentiationem: quam tamen eius autoritatem aduersarij contra nos adducunt, non aduerterunt, simili alterius, Theodori. scilicet male Theophrastum interpretantis; errore tueri. Illud mihi tecum non minus Platonica quam Aristotelica disciplina uiro conspicuo primum conueniat, non paruum esse diuisionis quam philosophi utuntur artificium, quod Plato philosophus excellentissimus adeo extollit atque admiratur, ut qui multa in unum recte collegerit, atque unum in plura recte diuidere scierit, eius uestigia tanquam diuini cuiusdam secreti in dialogo qui Cratylus inscribitur, ex persona Socratis dixerit. Eandem diligentissimam diuisionis scientiam Aristoteles adeo difficilem atque operosam putauit, ut in secundo de partibus animalium uoluminis libro, animalium genera in proprias species diuidere aggressus, quemadmodum ei Galenus noster obiecit, titubanti potius ac dubitanti, quam aliquid affirmanti, aut afferenti similis uideatur. De hac eadem diuidendi facultate apud Latinos Boetius, apud Græcos Andronicus, ac Theophrast. libros accuratissime scriptos posteris reliquerunt. Quis uero sanè mentis dubitauerit, quin ea quæ in eisdem libris diuidendi præcepta tradunt, ipsius artis præceptoribus notissima fuerint? Sunt autem hæc, ut Gal. non minor pene philosophus quam medicus, in præfatione artis curatiuæ ad Glauconem exposuit, summa atque præcipua artificiosæ diuisionis decreta, ex Platonice disciplinæ thesauris accepta: a primis, supremisque esse incipiendum; deinde hæc in alia genera, species, differentiationes secandum: atque hæc ipsa rursus eodem modo partiendum, donec tandem ad eas peruenerimus species, quæ amplius diuisionem non admittunt. Verum nunquid hanc diuidendi normam ac regulam obseruauerit ipse diuisionum magister Theophrastus, uideamus. Si enim Plinio & Theodoro Theophrasti sententiam libro. 6. interpretantibus credimus, illa Hederarum in duo prima discrimina, marem scilicet, foeminamque partitio, a Theophrasto libro Tertio est omnino prætermissa: quo tamen in loco omnia Hederarum genera ac species usque ad specialissimas per proprias singula differe-

Diuisionis artificium summum.

B

C rentias partiri statuerat: deinde libro. 6. ubi nulla erat de Hederis narratio opportuna, si Theodorum interpretem sequimur, ponitur. Quod cū Plinio uisum esset absurdum libro. 16. ubi de omnibus Hederarum generibus agere proposuerat, ab illa ipsa diuisione per marem ac foeminam censuit inchoandum, cuius alibi meminisse, ac non ubi præcipua foret tractatio de Hederis, magnam esse erroris partem existimauit. Nemo uero illud obijcere audeat, has maris ac foeminæ differētiās eo in libro, in quo de Hederis scribere accuratius instituerat Theophrastus, ab ipso tanquā inutiles fuisse neglectas, cum easdem differentias, ubi haberi possint, uel solas, uel maximas in syluestrium plantarum genere, qualem esse Hederam constat, primas assumi oportere, primo sui de plantis libro uoluminis idem autor affirmet. Sicuti uero omnia Hederarum genera, seu species, sub uno communi genere, quod Hedera appellatur continentur, ita & Hederæ genus ad aliud genus superius refertur, quod frutex nuncupatur, quodq; ab ipso Theophrasto, qui omnes plantas quatuor distinguit generibus, arborum, fruticum, suffruticum, atq; herbarum, ab alijs tribus ponitur natura distinctum. Liqueat autē Theophrastum libro Sexto non de fruticibus, sed de suffruticibus potius, herbisq; tractare. Hæc enim ab ipso in eiusdem libri exordio scribuntur: De arboribus dictum iam est, nunc de suffruticibus & herbis doceamus. Consequitur. Et si quæ in hysce alia genera comprehenduntur, illa quoq; annotemus oportet,

D ut fruges: nam hæc quoq; inter herbas deputari desiderant. Sed primum uerba de suffruticibus faciamus. Demum Theophrastus eo quo promiserat ordine prosequens, ita de fruticibus loquitur. Sunt autem eorum genera quamplura summis differentijs discreta. Cisthos, uel, ut Theodorus interpretatur, Hedera, melotrum, rubea, cassia, origanum, satireia, lens, saluia, marrubium, policaria, apiastrum, cæteraq; huiusmodi: atq; etiam quæ minus similia sunt, scilicet quæ ferulacea, & neruicaulia constant, fœniculeum, equifœniculeum, ferulago, ferulaq; herba muralis, siue muricidacea a quibusdam uocata, cæteraq; similia. Hæc enim omnia, atq; in totum ferulaceum suffruticum naturæ addixeris. Genera uero atq; discrimina singulis hysce indicamentis habentur, alijs euidentiora, alijs occultiora. Cisthi namq; uel secundum interpretem, Hederæ duo genera, masculina scilicet ac foeminina: quoniam altera maius, durius, pinguiusq; foliū habet, floremq; ad purpuram inclinatum, ambabus tamen flores rosas syluestribus proximi, uerum minores & sine odore. Cum igitur Theophrastus & in ipso protinus sexti libri principio dixerit antea se egisse de fruticibus, iam de suffruticibus atq; herbis spondeat tractaturum, primoque in loco de suffruticibus, in qua prima tractatione Hederam, uel potius Cisthum (ne errorē interpretis incurramus) melotrum, rubeam, ac cætera quæ sequuntur naturæ suffruticū censeat adscribenda, quis dubitauerit, hoc ipso in loco libri sexti nullam de Hedera facere uoluisse mentionem, quam superioribus libris fruticum generi addixerat; de qua præ-

Plantarum
genera qua-
tuor.

terea libro. 3. arborum ac fruticum tractatione abunde afferuerat: Neq; **A**
 uero quispiam ex eo decipiatur, ut quoniam hæc frutex, atq; suffrutex apud
 Latinos uocabula una syllaba tantū differunt, minimam quoq; existi-
 timer in rebus ipsis differentiam, quoniam eadem genera apud Græcos
 sunt tam uocabulo quam etiam natura diuersa: alterum enim *τάμνον*, alterū
σπύρανον idem Græci uocant. Quæ duo uerba cum non posset Theodorus
 commodius exprimere, fruticem, atq; suffruticem transtulit. Quare nisi
 uelimus Theophrastum summum philosophum, qui non modo de na-
 turis rerum, sed de dialectica, & diuidendi ratione atq; doctrina libros or-
 natius ac copiosius, quam eius præceptor Aristoteles multorum iudicio
 conscripsit, tam pueriliter aberrasse, ut Hederam aliquando in fruticum,
 aliquando in suffruticum genere collocaret: ut in ea quam fecerat libro. 3.
 Hederarum dictione, suæ doctrinæ præcepta negligeret, ac more quoq;
 ut Plato inquit, inepti, duo statim prima genera prætermittens, quodam-
 modo membra disrumperet: ut Hederam aliquando in fruticum, aliquā-
 do in suffruticum genere collocaret: ut sibi ipsi pugnantia scriberet, atq;
 contraria, Hederæ florem nunc lanugineum, nunc foliatum asserendo:
 ut deniq; ea quæ omnino sensui aduersantur in ea historia, in qua plerū-
 q; uisu magis quam ratione dijudicari fatetur, affirmaret. Illud potius exi-
 stimare debemus, Theodorum Gazam una cum Plinio, qui Theophras-
 ti libro sexto forte Cisso pro Cistho scriptum inuenissent, unius literu-
 læ immutatione fuisse deceptos, ideoque illa Hederæ tribuisse quæ Theo- **B**
 phrastus de suffrutice longe ab Hedera differente tradiderat: quo quidē
 errore cum Pliniū libro decimosexto lapsum manifestissime uideamus,
 quid est quod dubitemus ipsum etiam libro. 12. itidem fuisse, ut tuo utar
 uocabulo, sæpius de hoc autore prolato hallucinatum. quandoquidem
 ex Græci codicis mendo ita hic sicuti in Prasso & Prasio eadem errandi
 dabatur occasio. Equidem Theodoro Gazæ in Theophrasti translatione
 non raro aberranti ueniam puto impertiendam: quoniam ut in præfatio-
 ne sui operis ipse conqueritur, unicū tantum, eundemque mendosum co-
 dicem habuit: nisi quod oportuit diligentem interpretem rerum naturā
 potius spectare quam uerba. Qua diligentia si Plinius etiā usus fuisset, ne
 q; tibi tot in eius libris pprias hallucinationes castigandi, neq; mihi tam
 multos errores notandi necessitas foret adiuncta. Quoniā uero in hoc de
 Cisso & Cistho errato, quod erat tam Theodoro Gazæ, quam etiam Plinio
 commune, longior fortasse fui quam cuiquam necessarium uideret,
 reliqua demum, quæ circa Plinium tantū disputantur, atq; aduersus nos
 pro eodem Plinio abs te fuere defensa, pro nostra tuenda sententiā quam
 breuissima oratione poterimus confutare tentabimus.

¶ De CHAMÆDAPHNE.

In Chamædaphne libro. 15. ueterem lectionem distinctiorem putas, si
 ita scribatur. Est & Chamædaphne syluestris frutex, & Alexandrina. Ut
 duo genera intelligant. Alterū Chamædaphne, quā Latini Laureolā, ut

Theophrasti
 crudiūo.

C tu inquis appellant: cum tamen ea quæ hodie Laureola latine dicitur, non sit Chamædaphne, sed Daphnoides potius statim postea a Plinio descripta. Alterum, Laurus Alexandrina, ex Plinio Gal. Dioscor. Tu quid Plinium hoc pacto excusas, ne uideatur Chamædaphnæ uarijs in locis uarie designasse: cum hoc in loco, libro. f. 15. Laurum Alexandrinam tantummodo pinxerit, sicuti lib. 22. Chamædaphnæ. Sed duo remanent in Plinio scrupuli haud quæquam dissimulandi: Cur cum Plinius cætera Lauri genera eodem libri. 15. loco descripserit, solam Chamædaphnæ indescriptam reliquerit: Cur cum alterum genus non Alexandrina simpliciter, sed Laurus Alexandrina a Theophrasto, Dioscor. atque Gal. ab omnibus denique græcis autoribus uocetur, Plinius propria appellatione prætermissa, sumptum a loco uel persona, cognomen tantummodo posuit: uel eum postea subiunxit, alij Daphnem uocant, proprium nomen contra naturam postposuit: cum tamen uera huius fruticis appellatio non sit necque Daphne seorsim, necque Alexandrina, sed hoc torum, ut diximus, Daphne Alexandrina.

¶ De A D A R C E.

In Adarce falli eos putas, qui uerbum, palustris, recto casu, non autem paterno capiendum putant: atque ideo credere non de Salsilagine Calamis adhærente, sub Adarces uocabulo a Plinio agi, sed potius de palustri Calamo Adarce nominato: unde temere factum putas Plinio negotium. At cum index capit. 32. libro. 16. agi de Calamis, atque fruticibus, non medicinis ea parte demonstraret, cum ipse præterea continens sermo de diuersis Arundinum speciebus quibus Adarce adnumeratur, cuius facile per suadeat, Plinium eo in loco putasse Adarcem non esse Salsilaginem, sed palustrem Calamum in Italia nascentem, nemo negotium Plinio nisi ipsemet ipsi fecisset. Quid enim sibi uult illa repetitio? Est enim obliqua Arundo non in excelsitatem nascens, sed iuxta terram fruticis modo se spargens, suauissima in teneritate animalibus: est & in Italia nascens Adarce palustris, sub ipsa coma utilis dentibus: quoniam uis eadem est quæ Sinapi. Quid, inquam, uerbum, est, bis positum a Plinio insinuat: nisi ita esse Adarcem ex Arundinum genere, sicuti obliquam Arundinem a quibusdam uocatam elegiam. Si etiam uerbum palustris paterno casu capiatur, aspera nimis atque auribus absona fiet Pliniana elocutio. Quod si præterea uerbum Arundinis, ut necessarium fore uideatur, supplendum sit, præcissa quodammodo atque defecta oratio uidebitur. Cur uero ea Salsilago nasci in Italia a Plinio dicatur, cum in Galatia, non autem in Italia gigni illam Dioscorides describat: ut mirum uideri possit, te qui uelis Plinium de eadem loqui Salsilagine de qua Dioscorides, uerbum illud, Italia, non castigasse, ac loco eius Galatia non posuisse: Cur etiam hæc medicina sub ipsa coma tantum utilis dentibus a Plinio iudicetur, quam Dioscor. Galen. ac Paulus in omni parte Calamorum quibus hæret, quamuis ad alios usus quam dentium probauerunt. Nam & Plin. ipse lib. 32. ubi Adarcem quid sit non aliter quam prædicti autores exponit, nasci illam circa Arundines tenues, nulla facta de loco sub coma men-

tionē, simpliciter ptulit, neq; in paludibus, sed ubi spuma aquæ dulcis ac C
 marinę se miscēt. Quod maximum est argumentum, hic quidem, libro
 scilicet. 32. de Adarce Salsilagine fuisse locutum: libro uero. 16. de altera,
 quam esse Arundinis speciem falsa sibi opinione persuaserit, de qua enī
 intellexit libro. 20. ubi ita scripsit. Sinapis naturam habere traditur Adar
 ca, inter syluas tacta cortice pleniore, sub ipsa coma nascens. Ita em̄ ego
 hunc locum puto legendū paucioribus syllabis quam in tua castigatione
 mutatis. Nam & id uerbū, pleniore, si ita iaceat, eandem sententiā expri
 mit, quam supra lib. 16. posuerat, efficaciorē. s. esse dentibus Adarcen
 sub ipsa coma. Vel possumus ex uno uerbo duo facere, atque ita legeret
 Cortice plane ori sub ipsa coma nascens: Quasi eā nasci ad utilitatē oris,
 cuius dentes sunt nō minima pars, uelit insinuare. Quod pariter hīs quę
 libro. 16. de eiusdem medicinæ ad dentes usu testatus fuerat mire conueni
 et. Illud quoq; pro nostra facit sententiā, quod Plinius nusquam Adar
 cen esse Salsilaginē, nisi libro. 32. monstrauit, ubi eam Calamachnem
 nominauit: quamuis uitio codicis id uerbum corruptum sit in Chalamo
 chnū. Quo etiam in loco eosdem illi subscribit effectus, quos medici uete
 res Salsilagini tribuunt, alios ab illis quos libro. 16. in Adarce retulerat.
 Neq; uero hoc postremo libro quicquam meminit se in præcedentibus
 de eadē Adarce scripsisse, sicuti lib. 20. cum de re ipsa uerba faceret eandē
 se inter syluas tetigisse testandum existimauit. Hæc em̄ omnia manifestis
 sime probant, Plinium uarijs in locis uaria de Adarce sensisse, quam ali
 quando Calami speciem, aliquando Salsilaginē Calamis inhærentem
 significat. D

¶ De AER A, & AEGILOPE.

In Aera & Aegilope nescio an magis accusandus sit Plinius, qui in re
 bus adeo uulgaris, quibus nomina latina non deerant, græcis utendū cen
 fuerit: an potius, quoniam de eisdem herbis græca appellatione monstra
 tis illā affirmauerit, quę sensus falsa esse deprehendit. Tu uero de Aera
 hoc pacto pro Plinio respondes, qd cum Græci traderent Loliū strangu
 lare circumligando se triticū, neq; id in Italia magnopere foret compertū,
 tutius esse cogitauit græca uti uoce quā latina, Aerā id dicendo, nō Loliū.
 Laudarē Plinij consiliū, qui Græcorū mendacia, si qui forte fuissent qui
 tam insigniter mentiri uoluissent, ut scriberēt Loliū circumligando se tri
 ticum enecare, rem neq; in Græcia, neq; in Italia compertā sub græcę uo
 cis obscuritate occultare studuisset, nisi Aera uocabulum adeo esset in eo
 rundem Græcorum lingua usitatū, ut eius significatus neminē lateat, qui
 uel parum literas græcas degustauit. Vt tamen Græcos autores uiros sa
 ne doctissimos, qui de plantis scripserunt, atq; inter cæteros Theophras
 tum, quē præcipue de agricultura scribens Plinius imitat, tanti erroris su
 spicione liberemus, hic nusquā de Aera seu Lolio scripsit, quod Triticū
 circumligando se enecet, sed solum auferendo alimentū, quoniā Triticū
 adnascit. Hæc enim sunt eiusdē Theophrasti uerba libro tertio de causis



Plinius in
 agricultura
 Theophrasti
 imitatus est.

- C sis plantarum. Quippe Orobanche uocata Eruū enecat amplexu, compressuq; suo, & Linodorum Fœnū grecum interim it protinus radici adnascens, & alia cladem alijs inferunt, ut quæ cum singulis frugibus simul proueniunt, ceu Loliū atq; Avena Triticum atq; Hordeo, & Lappa Lentī, & alia alijs. Omnia autem idcirco interimunt, quia pabulum tollunt. Ex hīs Theophrasti uerbis, quorum magna ex parte sententiam Plinius libro. 18. ubi agit de uitīs frugum, studuit exprimere, facile ostendit Pliniani erroris in Aera ac Aegilope origo. Quia enim paulo supra Theophrasti fecerat de Orobanche mentionem, quæ amplexu suo Eruum strangulat, inde enim illi apud Græcos nomen, existimauit eandem esse Aerae & Aegilopi, quorum alterum Lolium, alterum Auenam Theodorus conuertit, interimendi rationem. Atque ideo post factam de Orobanche mentionem, quæ circumligando se Eruum enecat, postea Plinius subiunxit, Triticum simili modo Aera, Hordeum, Festuca, quæ nominatur Aegilops: cum tamen Theophrastus, quem ut uidere est de eisdem rebus Plinius scribens, quantum potuit studuit imitari: cum Theophrastus, inquam, licet omnia de quibus eo differit loco, idcirco uicinas herbas scribat interimere, causā illa generali, quod pabulum tollunt, uarijs tamen hoc illa modis facere doceat. Nam Orobachen quidem quia Eruū amplexatur & cōprimit: Linodorū uero, quia Fœnugræci radicī adnascitur: Loliū autē atq; Auenā, quia cū Triticum atq; Hordeo proueniūt, ceu Aparinē: quā nescio an recte Theodorus Lappā interpretať, cū Lente. Nullā uero ex illis tribus habere se uinciendi ac circumligandi naturā quicumq; eas nouerit minime dubitauerit, nisi qđ de Aparine forte possit concedi, quā Gal. lib. 1. de alimentis ita se Lentibus circumplicantem, neq; aliter agentē ac strangulantē, quā Orobachē Eruū describit.
- D

¶ De AEGILOPE.

Cur Aegilopen potius quam Auenam eodem in loco dixerit Plinius, eam rationē affers, qđ cum Græci duo Auenę genera facerent, Bromū. s. & Aegilopen, hoc uero discrimen nemo reddidisset in Italia, ob id Plin. libro. 18. cum Auenam inter uitia frumenti collocasset, paulo post de Festuca, quæ uocatur Aegilops, edisserit: non quod nesciret Auenæ id esse quoddā genus, ut nonnullos cauillari inquis, me. s. inuens, quem licet aperte non nomines, hīs tamen qui meū libellum legerint facile das agnoscendum, sed quod alterū quoq; fastigiū celebrari nouisset Bromos nomine. Hæc tu pro Plinio. Ego uero ut cauilli crimen, cuius me notasti, deprecari apud te, cui magis uelim meos mores probari, quā doctrinā nusquā Plinium per calumniā reprehendi, quod nescierit Aegilopen esse quoddam Auenę genus, sed ob id tantum incessui, quod eodē capite modo græca, modo latīna uoce in eodē Auenę genere uti uoluerit. Nam quod scribit Plinius libro. 18. Auenam esse frumenti uitium, & Hordeum in eā degenerare, hoc idem Theophrastus libro. 6. de plantis, & Galenus lib. Secundo de alimentis, de Aegilope etiam testantur, Quod uero etiā pau-

lo post Plinius ait, ab Aegilope Hordeū necari, id ipsum Theophrastus **A**
 lib. 5. de causis plantarū, licet alio mō quam Plin. Aegilopi tribuit. Alter
 um quoq; fastigium Plinius, si non eodē capite, saltem libro, aliquando
 Bromum, aliquando Auenā nominauit: ut inexplicabilis ratio uideatur
 cur Plinius in eisdem generibus nunc græcam, nunc latinā proferat uo-
 cem, Bromū ex Oriente aduectā libri. 15. capite. 10. Plinius refert, sed ean-
 dem Bromum eiusdem libri capite. 7. antea Auenā fuerat interpretatus
 ibi ea scribit. Tunicæ frumento plures, Hordeum maxime nudū, & Ali-
 ca, sed præcipue Avena calamus altior frumento, quam Hordeo, arista
 mordacior Hordeo. Hæc fere omnia sunt ex Theophrasti libro. 8. quam
 uis corrupte plaracq; translata. Nam Theophrasti de eisdem rebus scri-
 bentis uerba sunt ista: ut Theodorus interpretatur. Ad hæc Triticū tuni-
 cis integitur multis, Hordeum nudum consistit: id enim omnium maxi-
 me caret tegmēto. Tīpha quoq; & Siligo, & omnia huiusmodi multipli-
 ci folio includunt: ast omniū maxime, ut ita loquar, Auenā natura operu-
 it: quin etiā culmus altior Tritico quā Hordeo est, spica plus discreta a fo-
 lijs emicat, palea quoq; plus suauior quæ ex Tritico q̃ Hordeo. Si quis
 conferat Plinij uerba supra posita, hīs quæ de libro. 8. Theophrasti subiū-
 ximus, nō puto dubitabit, qn Plin. sicuti tunicas Frumēto plures contra
 Hordeum maxime nudū ad Theophrasti scripsit imitationē, ita in cæte-
 ris sequendo Theophrast. *Βρόμον πάλυτον*, id est, Auenā maxime opertā, ue-
 luti interpretať Theodo. dicere uoluerit. Cur uero sensu contrario maxi **B**
 me nudā scripserit, non magis scirē reddere rationē, quam cur idem Plin.
 Aegilopen circumligādo se Hordeum dixerit interimere, cum nulla A-
 uenæ species quæ id faciat agnoscat, sicuti neq; Lolij, quod tuam alter-
 am in Aera destruit defensionē, ideo scilicet Pliniū Aeram dixisse non
 Lolium, quare ipsi plus Lolij speciem, quā Lolium significare uideatur.
 Nam æque ignorat, ubi terrarū talis Lolij species oriatur, quæ circūligan-
 do se Triticum enecet. Sed cur Plinius in hīs adeo apertis erroribus tam
 operose defenditur, abs te præsertim, qui scias hoc in ipso loco, ubi Plini-
 us Aeræ atq; Aegilopis naturam peruertit, in tantum fuisse hallucina-
 tum, ut Teramnum & Ateramnum, quæ duo uocabula coctile atq; in-
 coctile leguminum affectus plariscq; in locis apud Theophrastum signi-
 ficant, ipse pro herbis noxijs acceperit: quarum altera, Ateramnos scili-
 cet, circa Philippos in pingui solo interimit fabam, Teramnos uero in
 macro, cum quidam uentus afflauerit. Quem quidem adeo crassum Plin-
 nij errorem nesciens aliter excusare, locum esse uitio codicis decurtatum
 suspicaris: qui etiam libro nono, capite decimosexto mirari te dicas, Plin-
 nium eosdem pisces modo græce, modo latine nuncupare: quod & in re-
 bus alijs, ueluti in herbis Plinium plaruncq; facere nō diffiteris, nihil tes-
 tantem, eodem ne sint, an diuersæ. Si hoc idem in alijs genere erroris Plin-
 ius admisit, cur non etiā in Aera ac Lolio, Aegilope & Avena poutit ad-
 mittere? Vel si in hoc Plinius non errauit, cur ubi dedit in alijs similibus

A de se admirandi occasionem.

¶ De GLASTO, ISATIDE.

Si ubi de Isatide inter Lactucas sponte nascentes lib. 20. scribitur, pro Syluatico Glastum, ut tu id uerbum castigandū opinaris, legatur, non a deo nos elidemur, qui Pliniū hoc in loco indiligentiæ accusauimus, quātum Plinij lectio quodāmodo uiolabit: quoniā a Syluatico ad Glastū longinquus est transitus. Quare uel nihil immutandū est, sicuti uideri in manu scriptis codicibus asseris: aut si Glastum loco uerbi Syluaticū, quamuis uiolenter intrudatur, iure Pliniū a nobis fuisse reprehensum, nisi hæc castigatio adhiberetur, iudicasti. Quantum uero rectius totus iste locus in Plinio emendabitur, si ita legatur. Alterum est genus quod Græci Isatim uocant. Vbi uerbum Esopus, quod neq; græcum est, neq; latinum, si pro aliquo Lactucæ genere accipiatur, tuam subterfugisse censurā non parum sumus admirati. Tertiū est genus in syluis nascens, syluestrem Isatim uocant. Hic enim diligenter aduertisti ex manu scriptis codicibus, nisi ita legatur, locum fore defectum. Erit igitur secundum Lactucæ sponte in aruis nascentis genus, non Esopus, sed Isatis simpliciter appellata, tertium quod in syluis gignitur syluestris Isatis. Quartum uero genus, quo infectores lanarum utuntur, non syluatica Isatis, hæc enim est secundo generi adiuncta differentia, sed potius satiuā dici debet. Differt autem hoc quartum genus a secundo: quoniam istud scribitur, illud in aruis sponte nascitur. Si itaq; Glastū, ut rationabilius apparet, nullo modo interponat, iam nulla dubitatio relinquetur, ita in hac herba, sicuti in plæriscq; alijs, familiarē sibi errorem Plinium incurrisse: quando eam sub uarijs nominibus quasi essent duæ, non una, in locis adeo distantibus designauit. Pari enim incuria Atriplicem holus satium, atq; etiam sponte nascens, modo latina, modo græca appellatione tanquam herbas differentes enarrauit. Vnde etiam illud est consecutum, ut effectus aliquando contrarios utriq; subscripserit. De Atriplice siquidem, atq; eius proprietatibus, cum libro secundo differuisset, eamq; ex autoritate Pythagoræ morbos regios & pallorem facere tradidisset, mox de eadem sub Chrysolachani uocabulo libro. 27. scripsit, fuisse aliquos qui traderent, illam alligatam regium morbum habentibus ita ut spectari posset sanare id malum: quem etiam effectum de semine si bibatur cum melicrato, autor grauissimus Dioscorides, & plærque alij medici testificantur. Esse uero eandem herbam a Romanis Atriplicē, a Græcis autē Chrysolachanū nominatam, tibi probare super sedemus: ne id agentes Græcorū prouerbio subijciamur, Sus Mineruam. Aliter em̄ alijs, qui ausi sunt supra calceū ascendere, aliter tibi Hermolæe eruditissime, non solū magnarum, sed etiam minutissimarum rerum scientia prædito, scribendū iudicauimus: Tibi inquam, qui Plinium in uerbi Prasion ambiguitate sæpe hallucinantē notauisti: quæ forte hallucinatio causa fuit, ut de Balote lib. 27. scriberet, quā Plinius lib. 20. sub Marrubij nigri nomine notificauerat. Taceo mille alios huius generis

Atriplex.

apud Plinium errores, ne multa quæ tu in tuis castigationibus lectores A
commonuisti, nunc te uelle docere uideamur.

¶ DE PERSONATIA, AC PERSOLATA.

Ego Plinium in meo libello notandum putauī, quod libro. 25. eodem capite bis Personatiam descripsit, quam sicuti Græci utroq; in loco Arctium nominauit: altero tamē Personatiam, altero Persolatam, ut tibi uideo placere, dici latine insinuauit. Quam distinctionem nominum a Plinio cognitam ais, a quibusdam non fuisse perspectam: ob eam, ut puto, rationem, quod ego libro. 25. altero in loco ubi de Arctio fit mentio, pro Persolata Personatiā scribendum putauī. Sed cum tu quoq; fatearis, Persolara Persola. ratiocabulum a persola esse deductū, quod nomen apud Latinos, teste Placidio grammatico, qui de Plautinis nominibus scripsit, personam significat, siue Personatiam, siue Persolatā altero in loco legeris, nihilo magis ab errore Plinius eximitur, qui bis eandē herbam modo sub Persolara uocabulo, eodem etiam capite pinxit. Sed tu forte non adeo Plinium defendere quantum me accusare uoluisti, qui Placidium grammaticum Placidius grammaticus. non uiderim. Ego uero id crimen in homine nulli rei minus, quam uerborum studio incumbente, non multum puto inexcusabile, sed una aquæ guttula ablui expurgariq; posse. Illud aliquanto difficilius in Plinio excusari queat, quod ex tantilla uominum uarietate, rem diuersificari, hoc est, aliam esse herbam Persolatam, aliam Personatiam iudicauit.

¶ DE ECHIO, ATQ; VE ALCIBIO. B

Non reprehenderemus Plinium scribentem libro. 27. se qualis esset Alcibios apud autores scriptum non reperisse, nisi ipse Plinius libro. 25. eandem Alcibium sub Echios nomine eodem quo Dioscor. modo pinxisset: adeo, ut Plinius putasse uideatur, aliam esse Echin ab Alcibio, quam tamen non differre in nostro libello probaui: quoniā eosdem effectus tam de Echi, quam de Alcibio, & Plinius ipse, & ceteri autores prodiderunt: qui etiam auctores non seorsim de Echi, seorsim uero de Alcibio, quemadmodū Plinius, sed de Echio tantū, quam alio nomine uocari Alcibiadiū testantur, tractauere. Cum uero tibi uideatur ea quæ dicatur Echios atq; Alcibiadium diuersam esse ab altera, quam Nicander Echin atq; Alcibiū appellat: ego me fateor hanc apud Nicandrum distinctionem non agnoscere. Illud satis habeo exploratū, in libro Dioscor. uel Pauli, nullam huiusmodi nominū, ac multominus rerum differentiā deprehendi: quandoquidem de Echio atq; Alcibiadio solum agentes, non alias illi uires adscribunt, quam Echi atq; Alcibio Nicander. Ut uero proximius sit non differre, siue Echis, siue Echios, siue Alcibium, siue Alcibiadium ea herba a diuersis autoribus nominetur, quemadmodum qui eam Alcubiācū, non autē Alcibiadiū uocant, rem plane eandē, non diuersam intelligunt.

¶ DE HELIOTROPIO.

Vbi de HELIOTROPIO scribit Plinius, ais quibusdā uideri

C eundem autorem Heliotropium cum Cichorio confundere : quoniā & Heliotropium cęruleo flore describat, & cibo gratum esse dicat, quę duo Cichorio conueniant. Ego uero & alia adiunxi quę de Heliotropio scribit Plin. Cichorio pariter congruentia: ut qđ semipedalem altitudinē nō excedat, & nō nisi pingui cultoque solo nascat: quę omnes notę aggregatę, Cichorium manifeste designant. Tu uero priores duas ita refutas, qđ nihil impedit uescendo esse tam Heliotropium, quam Cichorium: nec constat in Dioscoride, λευκόν ἄνθος, id est, candidum, an γλαυκόν, id est, cęruleū scribere oportuerit. At ut ad utrunq; respondeam, & de Cichorii radice qđ esui sit, & de flore quod cęruleus sit, sensu atq; experientia probatur, quę de Heliotropio non audes affirmare: quando etiā in dubium reuocas, qualis Heliotropij flos a Dioscor. describatur, cęruleus, an candidus. Ego autem illud certe scio, multos quos uidi, & quidē antiquos Dioscor. codices, λευκόν, non autem γλαυκόν scriptum habere: & nisi mea me fallit opinio, puto te eandem scripturam in tua translatione secuturum.

¶ De L A S I N E.

Quosdam ais, uerbum Lasinem corruptum esse nescientes, Pliniū culpare, quasi hanc herbam libro. 28. inutiliter repetierit, Laginem uocando, non lasinē. Tu uero pro Lasine lasionē censēs legendū ex Theophrasto, tam libro Plinij. 21. quam etiam. 22. atq; ideo aliam statuis a Lagine, de qua idē Plinius agit libro. 28. Demum ut meę modestię consulam, mihi

D hi putas recantandū: quoniam non sit tanta inter Laginem atq; lasionem affinitas, quantam tibi uisus sum existimare. Quasi uero ego in nostro libro tenuem tantum uocis sonum secutus, ac non multo magis naturę proprietates, eandem esse cum lasine laginem apud Plinium iudicauerim. Quoniam quę de lasine libro 22. scripserat Plinius, eadem fere in lagine libro. 28. repetijt, ut quod pthificos iuuat, quod lactis ubertatem faciat, quod infantibus illita capillū alat, quod in cibis placeat, quod uentrem stimulet. Sed uide quantum mihi contulerit cum te homine doctissimomo de huiusmodi rebus disputatio. Ea enim quam tu adduxisti autoritas Theophrasti, longe me fecit ad ea quę pridē scripseram confirmanda audientiorē, nedū mouerit ad recantandū; nisi recantare pro eadem repetere cantilenā accipiat. Suspiciari me in meo libro scripsi, quutrobique, & libro. 1. 22. & libro. 28. pro lasine uel lagine, & elxine & eusine legi deberet. Adeo non nesciui quod tu mihi obijcis, uerbum lasinē esse corruptū, ut etiam quo pacto castigandū esset admonuerim; cuius castigationis illa ratio fuit: quoniā Plinius eodem libro. 1. 28. nō modo laginē, sed etiam Echitem, & tenue Scamoniū eandē herbā a quibuscūq; uocari testaret. Ego uero non agnoscerem plantā, quę proprie tenue Scamoniū dici posset, pręter illā quam Dioscor. sub Elxines, Euxines, & Cissampeli quoque nominibus pinxit, folijs Hederę similibus omnibus, seq; inuenerit circuncuoluentē: ob quā etiā naturā sicuti Diosc. Cissampelū, ita Plin. Cōuolulū alibi nominat. Sz de q̄ antea tm̄ suspicabar, nūc certā ex Theophra

sto habeo noticiā: in cuius codice, quē scis etiā Pliniānis esse corruptionē, **A**
 sic pro iasione elxinem uel eufinē, ueluti apud Pliniū pro Lagine uel La-
 sine puto scribendū: nā de Lasine Plinius lib. 21. ita scribit. Lasine unū fo-
 liū habet, sed ita implicatū, ut unū cū sit plura esse uideant. Theophrast.
 aut, a quo, ut par est, Plinius accepit, de flore lasionis lib. 1. de historia plā-
 tarū eadē quē Plinius de flore lasines tradit in hæc uerba. Nonnulli folio
 uno emergūt, descriptionē tamē pluriū ostendētes, ut flos in lasione. Nō
 ne hæc flori eius herbæ, quā Græci Elxinē atq; Cissampelū, Plinius, ut di-
 xi, Conuoluolū alibi uocat, mire conueniunt? Est em̄ hic flos, ut Plinius
 inquit, rudimentū naturæ Lilia facere condiscantis: & cū unū foliū tantū
 habeat, quibuscūq; tamē quasi incisuris ita distinguit, ut uideat in quinq;
 diuisum. Eadē autē herba dicta latine Conuoluolum, sicuti hoc in loco,
 libro scilicet primo de historia plantarū, apud Theophrastum pro Elxi-
 ne, uel Eufine uitio codicis lasione nominatur, ita libro secundo de causis
 Lasine æque corrupte uocāt: quod tamen uerbum ueluti diuinans Theo-
 dorus Volucrum uertit. Quare cum Dioscorides atq; Galenus multo
 sint, ut te non latet, tam accuratæ doctrinæ, uirum, in lingua græca emen-
 datiores quā Theophrastus in eadē, uel Plinius in nostra, quid est quod
 dubitemus laginem & lasinem apud Pliniū, lasionē autē & Asinem apud
 Theophrastum nomina itidem deprauata, ex uerioribus codicibus casti-
 garē: cum præsertim quid sit Græcis Elxine, uel Eufine, quidue Latinis
 Conuoluolum, uel sensu ipso monstrante noscatur. Quid autem sit eisdē **B**
 Græcis lasione, aut Asine, seu Plinio Lasine uel Lagine, ab illis etiam qui
 se omnia in Plinio scire profitentur ignoratur.

¶ D E S I O, & S I L A O.

Male me Pliniū accusantē, quasi duas herbas fecerit quæ sit una, in tu-
 is primis defensionibus notauisti: quoniā tibi non uideatur Siū esse Cris-
 siones, sed tantum similis herba. In secundis contra me latam sententiam
 pene reuocasti: nam Silaū uerbū esse corruptū in Pliniano codice, & La-
 uer potius esse legendum iudicasti. Cuius descriptionem tu quoq; fateris
 ad eius oleris naturam proxime accedere, quod Græci Sium uocant. Et
 quoniam Dioscor. ait Sium a Romanis Lauer appellari, quam tu etiam
 concedis esse illā herbam, quam uulgo Crisiones appellant: ita tandē me
 cum, & cum Dioscoride sentis, quod Sium quidē sit Lauer, sed Lauer o-
 doratum: quandoquidem Sium herba est odorata, teste Dioscor. Lauer,
 siue Crisiones minime. Sed cum idem Dioscor. duo Sij genera faciat: al-
 terū odoratū, ob quā naturā luncus aromaticus alio noīe dicit: alterū ino-
 dorum, qd quia Nasturtij refert saporē, ideo etiā Cardamine a Græcis uo-
 cat: cur sicuti duplex est Siū, atq; ut tu quoq; insinualti, Lauer, odoratū. s.
 & carens odore, non etiā Crisiones quidam esse inodori, quidā odorati
 dicant? Quo quidē admissio, mea stabit sententia, Siū esse eam herbā quā
 Crisiones nominamus: quā cum bis descripserit Plin. & sub Sij, & sub Si-
 lai, siue ut tu legendū putas, Laueris nomine, iure est a me incuriæ, ne di-

Sium.
Crisiones.

Cam inficitur accusatus, qui quæ una herba erat duas fecerit, sicuti ob id etiam merito possit reprehendi, quod duo Sij genera in unâ naturam confuderit. Nā quæ de Sio scribit Plinius, quod latius sit Apio, atq; in aquis nascat pinguius, nigriusq; , quod calculos frangat, quod dysentericis & mulierum mensibus proffit, hæ omnes sunt Sij odorati apud Dioscoridē proprietates. Quod autem Nasturtij saporem reddat, quod lentigini & mulierum uirgīs in facie illitum nocte momento cutem emendet, ut de Sio pariter scribit Plinius, hoc non de eodem genere, sed altero potius in odoro, quod ut diximus, a sapore quē reddit, Cardamine a Græcis nuncupatur, Dioscorides retulit.

¶ De SIGILLO LEMNIO.

Venio ad Sigillum lemnium, quod ego autore Galeno medicorū omnium longe doctissimo rectius terrā quam milton, id est, rubricam nominari monstraui. Tu contra Nicandrum affers, ac Celsum: quorū alter id terræ genus Miltū, alter Miniū uocat. Sed cur non etiam Andromachū medicū antiquissimum allegasti, qui in suæ theriaces compositione Terram lemniam Milton appellauit? Præstat autem, inquit Galenus, in eiusdem compositionis expositione, non Milton, sed terram potius dicere: eam, ut puto, cauens confusionem, quam uisus est fecisse Plinius, Terrā lemniam inter rubricas & colorum genera libro. 5. & 3. numerans: cum tamen, ut idem Galenus inquit, aliud sit lemnie terræ genus, quo fabri lignarij pro rubrica utuntur, quod uerius Miltos nominatur, picturæ potius quam medicinæ accommodatum. Ego igitur non adeo de nomine, quā de re ipsa a Plinio dissensi. Nam etsi & Cinnabaris, & Minium, & pleræq; forte alia æque medicis ac pictoribus seruiant, utrunq; tamen usum lemnio Sigillo contingere neq; tradit a Dioscoride, diligentissimo alioquin in huiusmodi rebus explorandis autore, a Galeno autem rubricā a Terra lemnia plane distinguente negatur.

¶ De CINNABARI.

De Cinnabari non putas eam opinionem, quam secutus est Plinius, a Dioscoride improbari: quoniam idem Dioscorides simpliciter scripserit: putauerunt quidam Sanguinē draconis esse Cinnabarim: nō dampnans, sed referens aliorum de Cinnabari existimationem. Sed qui defendi possit, huiusmodi de Sanguine draconis opinionem, non iudicari a Dioscoride falsam, qui de Cinnabari non lib. 2. inter medicinas ex animalium sanguine sumptas, sed potius. 5. inter metalla tractauit? De Cinnabari quoq; metallo in Hiberia & Colchis nascente, ut te non latet, agit Theophrastus. Et si contra te cognomine tantum Barbarum, autorem lingua & natione Barbarum licet allegare, Aucois pariter in suo Colliget, non aliter de Cinnabari quam de metallo scripsit. Galenus etiam medicus nobilissimus sui de simplicibus medicaminibus lib. uoluminis. u. Cinnabarim metallis adnumerauit. In altero autē de eisdem medicaminibus ad Paterianum tractatu, eorum aperte sententiam improbat, quam Plinius com

probauit, ita scribens. Cinnabaris non est Sanguis draconis, ut quidam A putant. Siue autem hæc sint uerba Galeni, Pergameno Asiæ ciuitate oriundi, siue alterius eodem nomine insignis medici, satis constat tantorū uirorū iudicio, ea quæ de Cinnabari prodidit Plinius, esse fabulosa: nō tam en ob id, ut nobis obiecisti, Pliniū irrisimus. Absit enim a nobis tanta temeritas, ut hunc celebris nominis autorē, tam de humano genere bene meritū, ludibrio habeamus. Sed neq; tanti fecimus, ut nefas putauerimus ipsi aliqñ non credere, ut quod quidā legulei, qui solis nituntur autoribus a nobis exegerunt, Plinij autoritatē sine ratione rationē esse censuerimus.

¶ De T V R B I T.

De Turbit autem de quo in chirographo quæris, difficile est etiā quo nomine apud Dioscoridem censeatur determinare. Turbit enim est nomen barbarum: Barbari autē autores de ipso uarie loquuntur. Aliud siquidem de ipso scribit Serapio, aliud Mesues. Quare si a me petas quid sit apud Dioscor. Turbit, a Serapione descriptū, possum tibi sine aliqua hæsitazione respondere, esse Tripoliū: licet hoc nomē apud Serapionē al legantē in eo Diosc. sit deprauatū. Nam quæ de Tripolio Diosc. ac Plin. scripserūt, qd in maritimis nascit locis ubi allidit unda, neq; in mari, neq; in sicco, folio Isatidis crassiore, palmeo caule & mucrone diuiso, radice alba, odorata, calida gustu, & reliqua: hæc eadē Serapio de Turbit scribit, qd Caricamū uitiose, ut diximus, pro Tripolio nominat. De quo uel co dicis, uel autoris errore minus sit admirandū: qñ & apud Pliniū non Tri poliū, sed Trifoliū potius corrupte legi: adeo, ut Simon dubitauerit, an sit idem caput de Trifolio apud Pliniū, & de Tripolio apud Dioscor. & de Turbit apud Serapionē. Pandectarius autē duo capita scripsit, alterū de Tripolio secundum Dioscor. alterum de Turbit secundum Serapionem: quasi Turbit apud Serapionem sit aliud a Tripolio apud Dioscor. qui forte error Pandectarij, una cum Simonis dubitatione, inde etiam habuere occasionem: quoniā in latino Dioscor. cuius uerba citat Pandectarius, scribitur Tripoliū habere folia similia Apio: cum tamen uerius Dioscor. tradat esse similia Isatidi herbæ, hoc est, illi quam uulgo Guadum appellamus, quæ in usu tinctorū celeberrima est. Apud Serapionē autē hæc similitudo neq; ad Apium, neq; ad Isatidē refertur, sed ad quandam plantam, quæ Arafatis nominatur. Quod uerbū puto apud Arabes esse corruptum, & pro Isatide, Arafatin scribi: sicuti etiam apud Pliniū nō folio Isatidis, sed folio satis crassiore palmo itidem uitiose scriptū inuenitur. Qui quidem locus fuit a me pridem in libro de Plinij, atq; aliorū medicorū erroribus castigatus. Si autem a me queris, quid sit Turbit, quod describitur a Mesue, apud Dioscoridē, dicere oportebit, Turbit illud Mesue non esse Tripoliū apud Dioscoridem, sed radicem alicuius herbæ habentis succum lacteum, acutum, ex genere Thithimalorum, seu lacticinorum, ut iuniores medici loquuntur. Tale em̄ est Turbit, quod describitur a Mesue, non habens foliū simile Isatidi, sed Ferulæ potius. hæc enim sunt eius

Turbith Tri-
poliū, scdm
Serapionem.

B

Turbith scdm
Mesue.

- C** uerba, ut nosti: Turbit est radix herbæ, cuius folia sunt sicuti folia Ferulæ, minora tamen, & est ex habentibus lac. Quo circa Actuarius, grauis apud Græcos autoritatis medicus, multum tamen Galeno ac Paulo ætate posterior, qui multas Arabum medicinas illorum nominibus memorat, inquit Turbit a Barbaris uocitatum esse radicem plantæ, quæ a græcis Pitiusa uocatur. In qua etiam opinione quidam alij Græci præter Actuarium fuisse uidentur, qui capite de Pitiusa apud Dioscoridem, ubi de radice fit mentio, uerba illa interseruerunt, quæ non puto esse Dioscoridis, sed glossema potius, *ἢ καλοῦσιν τούτῳ*. id est, quam radicem scilicet Pitiusæ uocant Turbit. Sed contra hoc est, quod hæc eadem radix a Serapione non Turbit, sed Sebram, id est Esula nuncupatur: quod palam fiet conferenti ea quæ Serapio de Sebram ex Dioscor. atq; Galeni pariter scripsit autoritate, cum hijs quæ ijdem Græci autores de Pitiusa prodiderunt. Quamuis Auicenna capite de Sebram aliud potius uideat describere, quam radicem Pitiusæ. Imo si uerba Galeni libro. 8. de simplici medicina in Pitiusa attendimus, & alia comparia. 2. Canone, capite De Mezetegi ab Auicenna scripta, liquido apparet, quod Mezetegi apud Auicennam sit Pitiusa apud Dioscoridem: ita quod necessarium sit alterum duorum, uel Sebram non esse Esulam apud Auicennam, intelligendo per Esulam radicem illius herbæ quam Græci Pitiusam uocant, uel Auicennam in duobus capitibus secundi Canonis de eadem radice fuisse locutum. s. capite de Sebram, & capite de Mezetegi. Eadem eiusdem medicinæ repetitio superflua est apud Serapionem. Nam capite de Tithimalo ultimo loco nominat speciem Tithimali quæ dicitur Ptia: uult autem dicere Pitiusa: eadem enim de ea scribit quæ de Pitiusa Dioscorides. Paulo infra aliud caput scribit de Sebram, & in eodē allegat Dioscoridem: quasi Sebram alia sit a pitiusa medicina. Sed neq; illorum opinio est omittenda, qui putant Turbit esse radicem herbæ, quam uulgo Soldanā nominamus, passim in locis maritimis prouenientē. Hanc tamen opinionem esse falsam nos ita probamus. Soldana herba, uel eius radix non est Turbit a Serapione descriptū, quia illud Turbit est Tripoliū apud Dioscor. & habet folia similia Isatidi, ut nuper ostendimus: Soldana autē herba non est Tripoliū apud Dioscoridē, sed ad aliud caput referē, ut mox ostendemus. Itē Soldana herba habet folia quadamtenus Hederæ similia, uel Aristolochiæ rotundæ: Turbit autē a Serapione descriptū, sicuti etiam Tripolium apud Dioscor. habet folia similia Isatidi. Eadē ratione probatur, Soldanā herbam non esse Turbit descriptū a Mesue: quoniā istud Turbit habet folia similia Ferulæ, ut etiā antea dictū est: Soldanæ autē folia sunt omnino a Ferulæ folijs differentia. Simili argumento in libro de morbo gallico contra Gentilē probauimus, Soldanā herbā non esse Cachilē apud Serapionem: qm̄ Cachile secundū eundē Serapionem, habet folia Nasturtij, quæ nullā præ se ferunt foliorum Soldanæ similitudinē. Hic autē uberioris doctrinæ gratia super adiungimus autores Arabes, Soldanā herbā neq; ad

caput de Cachile, neq; ad caput de Turbit retulisse, sed Græcorum imitatione ad caput de Caulibus. Est enim Soldana herba uulgo a nobis dicta illa, quā, Dioscor. atq; Gal. Brassicā marinā appellant: quod liquido apparebit, si quis inuicē contulerit ea quæ in herba Soldana oculis intueatur, & quæ de Brassica marina Dioscor. scribit. In hac tamē herba mihi uidentur aurores Arabes eatenus aberrasse, quatenus de Caule domestico atq; syluestri, ac subinde marino eodē capite cōtinuatim tractauerūt, tanq̃ hæ omnes forent eiusdē generis proximioris species: qđ de syluestri qđē atq; domestico Caule concedi posset: qm̃ tantū satiui atq; syluestris differentijs distant: de marino autē Caule nequaquā, qui omnino ab alijs duobus diuersificat, ut non modo Dioscor. sed etiā Gal. testificantur: quorū autorū sententia Brassica marina, & Brassica satiuā, uel etiā syluestris æquiuoce dicunt. Putasse autē Arabes Caulē satiui atq; syluestre, ac præterea marinū quandā habere inter se non modo figuræ, sed etiā naturæ affinitatē, eo cōstat argumēto: q̃ omnes eodē, ut diximus, capite cōplectuntur. Et præter hoc etiā uerba Serapionis idē ostendunt, qui de Caulibus marinis ita scribit. Marini Caules sunt lōginiiores a similitudine domesticorū, quā. s. sint Caules agrestes. De illis em̃ statim antea locutus erat. Auicēna insuper tres hæc species etiā effectū cōmunitate consociat, ut cum. 2. Canone de Caulibus scribit in hūc modū. Syluestris, marinus, ac domesticus maturat phlegmones & duricias. Qui quidē effectus a Dioscor. Cauli satiui atq; syluestri ex parte assignat: marino autem Cauli a nemine adscribit, & nulla experiētia comprobat. Verior autē est Græcorū opinio a nobis tacta, q̃ Caulis agrestis atq; satiuus tantūmodo sint figura colore, & naturæ pprietatib. similes, nisi q̃ agrestis est albior & calidior, & siccior, sicuti omnes alię plantę syluestres sunt in eodē genere satiuis, se cundū has duas qualitates, ut inquit Gal. fortiores: marina autē Brassica penitus ab illis ambabus euariat. Hæc idco in Arabicis autoribus notanda cēsumus, ne quis putaret nos Soldanā herbā, ut illi fecerūt, forte qđ esset apud Diosc. atq; Gal. Brassica marina nescientes, in Brassicarū species cōnumerare. Sed qm̃ multa interfēuimus ut te pleniori officio dederemur, iam ad illud redeamus de quo præcipue ab initio quærebatur, qđ sit Turbit apud Diosc. Forte autē in tanta tum Arabū autorū, tum etiā Latinorū super hac medicīna opinionū diuersitate, melius quæreret, qđ sit apud Diosc. radix illa quā pro Turbit officinæ uendunt. Ego qđ diu multūq; laboraui, ut herbā uidentē uiderē, cuius radix Turbit nuncupat. Nā qui radicē tū aridam ad nos afferūt, neq; ubi nascat. neq; quali folio, aut flore Turbit insigniat sciunt dicere, nisi q̃ unus tū pharmacopola id mihi de flore Turbit est testatus, qđ de folio Tripoli scribit Diosc. q̃ uidelicet mane candidus, meridie purpureus, uespere phœniceus appareat. Qđ si mihi fuit uere relatū, pculdubio Turbit, quo nos utimur, est Tripoliū apud Diosc. Sed qm̃ hoc de flore miraculū uix forte ipsi Diosc. credat, ne dum alicui pharmacopolæ, omnino satagendū, ut foliū ipsum uiride in-

A
Soldanam
esse Brassicam
marinam.

B

Turbit uerū.

C spiciamus, & an sit folio Ifaridis aut Ferulæ simile, uel etiã neutro, diligẽti
 • us consideremus. Fieri em̃ potest, ut radix illa qua utimur, neq; sit Turbit
 Mesue, neq; etiã Turbit Serap. tantã uideo in his rebus incuriã, quę sunt
 in usu frequentissimo medicorũ. Si quis em̃ dixerit esse Turbit Serapio,
 illud obijcere possumus, qđ Turbit apud Serapionẽ est idẽ qđ Tripoliũ
 apud Diosc. Radix aut̃ Tripolij scđm eundẽ Diosc. odorata est. Qua ue-
 ro nos utimur pro radice Turbit, omnino caret odore. Si uero alter asse-
 rat hanc esse turbit descriptũ a Mesue, cum sit illud turbit secundũ eundẽ
 Mesuen ex genere habentiũ lac, seu lacticiniorũ, hoc est, earũ plantarum
 quę habent lac maxime acutiũ: interrogabimus ipsum, quidnam tandem
 erit ex hijs quę a Dioscor. uel Serapione describuntur? an aliqua species
 Thitimalorum? Sunt autem septẽ uel octo, sed nulla earũ esse potest Tur-
 bit a Mesue descriptũ. Nulla siquidẽ ex illis habet folia similia Ferulę, qua-
 lia habet Turbit a Mesue designatũ, ut constat ex Dioscoride & Serapio-
 ne, singulas Thitimalorum species per folia ac flores, & reliquas proprie-
 tates describentibus. Sed neq; Lathiris est, quã iuniores medici Cataputi-
 am minorẽ uocant, Auicenna autẽ Mendanã, ut constat ex hijs quę de
 Lathiri Diosc. & de Mendana Auicenna similia scripserũ: neq; Peplios,
 de qua Dioscor. agit inter alias quę lac acutiũ emittunt. Huius em̃ radix
 inutilis est, ut inquit Dioscor. & de hac quoq; Auicenna agit secundo Ca-
 none, sub nomine Bebilis, capite diuerso a capite De turbit: eadẽ ratione
D neq; Peplion, id est, Portulaca syluestris. Nam hanc quoq; Auicenna. 2.
 Canone Bilomon nominat. Translatio autẽ librorũ Hippocratis de regi-
 mine acutorũ Feliciniũ uocauit, & nõ radice, sed folio, uel fructu ad usum
 medicinę adhibetur. Habet etiã folia similia Portulacę, unde illi nomen,
 non autẽ Ferulę, sicuti Turbit descriptũ a Mesue. Deniq; per singulas spe-
 cies earũ plantarũ, quę succo lacteo & acuto manant, discurrendo, non ui-
 detur cuiq; earũ descriptio Turbit, quę apud Mesuẽ reperitur cõuenire.
 Forte autem neq; uere scribitur a Mesue, Turbit esse & genere earum quę
 lac habent. Siquidem hic idẽ autor inquit, Mezereon esse plantam la-
 cticiniorũ maiorẽ, quę tamẽ planta ab Arabibus Mezereon nominat: ea-
 dẽ a gręcis Chamælea uocat, ut cõstat conferenti caput de Chamælea ap-
 ud Diosc. cum capite de Mezereon apud Serapionẽ, & etiã apud Auicenna:
 nisi qđ Auicenna etiã ipse, licet sub nomine Mezereon, Chamæleã
 describat, quã constat non esse de numero lactariarũ, siue lacticiniorũ, in-
 quit Mezereon esse lacticiniũ magnũ: ut uideant Arabes, Auicenna præ-
 fertim, ac Mesues capite de Mezereon, in duplicẽ errorẽ incidisse, & qđ
 Mezereon, quę a Gręcis Chamælea uocat, in lacticinia posuerunt, & qđ
 Chamæleontẽ albũ & nigrũ, cũ Chamælea siue Mezereon confuderunt.
 Nam Mesuẽ quoq; non fuisse secundi huius erroris expertẽ probari po-
 test ex hijs, quas ipse Mezereon in fine capitis tribuit, pprietates, quas nõ
 Chamæleg, quam Arabes Mezereon uocant, sed Chamæleonti potius al-
 bo uel nigro Diosc. assignauit. Quę em̃ de Mezereon Mesues scribit, qđ

Mezereon

interficat lumbricos, & qđ collutio eius ex aceto confert dolori dentium, **A**
 & quod sit unguentū ex eo ad scabiē bonū, & linimentū ex eo & sulphu-
 re delet morpheā, albaras & lentigines, sunt fere pprietates, quę Chamæ
 leonti albo & nigro, nō aut Chamæleæ, id est, Mezereon a Diosc. tribu-
 untur. Serapio uero est capite de Mezereon similē confusionē Chamæle-
 ontis, & Chamæleæ, ut cum de Ixiā uerba faceremus ostendimus, in eo ra-
 men magis est quam Mesues Auicenna probandus, qđ Mezereon haud-
 quāq; fecit ex genere lacteiniōrū: & qui uerum Mezereon, hoc est, Cha-
 mæleā agnoscunt, sciunt eā nō habere lac. Dixi aut uerū Mezereon quod
 a Græcis Chamælea dicitur: quia apud nōnullos Arabes, Ioannē. f. Sera-
 pionē, ueluti Simō annotauit, Mezereon est Mirdane, uel Mēdane: quę **Mendane.**
 autē Mendane ab Auicenna uocatur, est Lathiris apud Græcos, & Cata-
 putia minor apud medicos iuniores: quā certū est, nō esse Mezereon, ne-
 q; ab Auicenna, neq; a Serapione, neq; etiam a Mesue designatū, ut satis
 constare ex uarijs descriptionibus arbitramur. Et quia aliud caput de Mē-
 dane, aliud de Mezereon Serapion atq; Auicēna scripserūt: nō solent aut
 autores Arabes duo capita, sed unū tm de eadē simplici medicina scribe-
 re, nisi forte nominū uarietate decepti, quę una sit, geminā eā crediderint.
 Nam qđ de Auicēna supra dubitauimus, ne forte de Esula duobus capiti-
 bus egerit, & capite de Sebram, & altero de Mezetegi, hunc liquido erro-
 rē in Serapione deprehēdimus, qđ capite de Tithimalo ultimo loco nomi-
 nat speciē Tithimali, qui dicit Ptiās: uult autē dicere Pitiūsa, cuius radicē **B**
 quidā esse Turbit, ut supra ostendimus, existimauerūt. Et paulo infra a
 liud caput scribit de Sebrā, in quo easdē tribuit Sebrā pprietates, quas Pi-
 tiūse Diosc. neq; meminit, sed de eadem planta etiā inter species Tithima-
 lorū fuisse locutū. Supra aut diximus, ut ad id propter quod hæc omnia
 subiunximus reuertatur, Turbit apud Serapionem esse Tripoliū apud
 Diosc. qui qđ Serapio neq; ipse Mezereon, sicuti neq; Tripoliū Diosc.
 lacticinij annuerat, Simon aut Genuensis in litera L, ubi de lacticini-
 is facit mentionē, etiā Tripoliū inter ista collocauit. Quia em Mesues po-
 nit Turbit inter lacticinia, Turbit autē apud Serapionē esse plantā quam
 Diosc. uocat Tripoliū, nesciens Simon hoc nomē Turbit apud duos au-
 tores æquiuoce dici, apud alterū de planta habēte lac, & foliā Ferulæ si-
 mili: apud alterū de planta carēte lacte, & foliū Isatidi, id est, Guado simile
 gerenti, propter uerba Mesue de Turbit, Tripoliū quoq; inter lacticinia
 cōnumerat. Vide qđ difficultates, & qđ inexplicabiles, occurrunt me- **Cautela**
 dicis iunioribus, Arabū autorū doctrinā sequētib; ob eorundē autorū
 nō modo a Græcis, sed etiā a seipsis discordantiā. Quare nulla alia inter
 tot, quę de simplicibus medicinis habent ambiguitates relinq; uia, nisi ut
 ad sensum iudicē cōfugiamus: ut si plantā uiuentē habere possimus, cuius
 radix p uero Turbit affert, nunqd sit ex genere lacticiniorū, uel alia, discu-

DE BUGLOSSA.

(tiamus.

De Buglossa autem, de qua quæris, an ea qua pro Buglossa utimur, sit

C uera Buglossa, si tibi qđ sentio respondero, uereor ne sicuti tu admodum docte dubitasti, ita ego nimium proterue uidear uniuersam nostri temporis medicinā euertere. Nam si probare contendero, Buglossam, quam medici iuniores ad usum medicine adhibēt, nō esse uerā Buglossam, cur etiā inquiet aliquis, Lactucā qua uescimur, uerā esse Lactucā non inficiaris? Non ita tū sumus animati: absit em̄ a nobis tanta temeritas, ut omnia iuniorū medicorū placita uelimus demoliri. Sed sicuti multa eorū probanda cēsemus, ita plura sunt in quib. autores ueteres magis sequendos iudicamus, atq; in illis p̄sertim, in quibus ijdē medici iuniores inuicē uidentur dissentire. De Boragine Simon Genuensis in litera B, ita scribit. Borago herba nota, cibo apta, & medicinæ: & flos, & folia, & semen Buglossa dicit̄: spēs eius syluestris. Non reperio aliquē autorē autenticū, facientē capitulum de utraq; si scribit de una, nō scribit de alia. Hec ille. Pandectarius aut̄ aliter sentit, nam. 2. capite scribit alterum de Boragine, in quo allegat Dioscor. alterū de Buglossa, in quo citat Serapionē ex eiusdē Diosc. autoritate de Buglossa loquentē. Montagnana uero in qđā cōsilio scribit hęc uerba. Borago aut̄ non placet, qā planta multū uentosabilis, & uentositiua: qđ ostendit̄ ppter multitudinē eructuationū quas efficit. Et licet pnat̄ temperata, quia est species Buglossę, quę temperata est, de ea parum ab autoribus scribitur, & plura de ea credunt̄, quam ratione & antoritate uerificari possint. Auicenna tamen de ea nihil dixit. Vide quanta sit istorum autorū discordia. Alter dicit nullum autorē de utraq; s. de Boragine, & de Buglossa loqui: alter super ambabus herbis citat Dioscoridem: alter facit Buglossam speciem Boraginis syluestris: alter Boraginē Buglossę tanq; generi subijcit. Auicenna quoq; secundo Canone, capite de lingua bouis, notat sui temporis medicos, qui nō uera Buglossa uterent̄, sed alia quę non habet easdē utilitates. Quare in tanta medicorū tum latinoꝝ, tum etiam Arabū de herba Buglossa controuersia, quid mihi uideat̄ aperiā. Primum illud pro confesso habetur, Buglossam, græco interpretamento, Linguae bouis assimilari. Duæ autē sunt herbæ Linguae bubulæ, atq; ideo etiam inuicē similes: altera a nobis Lingua bouis, altera Borago nominatę: sed duę quoq; herbę itidē Lingue bubulę similes celebrant̄ gręcis nominibus apđ Gręcos: altera Buglossum, altera Crission ab eisdē Gręcis nuncupatę: adeo, ut minime dubitē duas illas herbas, quarū alterā Linguā bubulā, alterā Boraginē sermone nostro uocitam̄, ad duo capita apđ Diosc. debere referri: quorū alterū est de Buglossa, alterū de Crissio. Nam & hoc propter magnam quam habet cum Buglossa similitudinē, Buglossum magnū pariter a Gręcis appellat̄. Verū diligentius considerantib. descriptio Buglossi apđ Diosc. plus Boragini cōuenit: descriptio aut̄ Crissij, siue Buglossi magni plus alteri quadrat, quā nos uulgo Buglossam, seu Linguam bubulam nominamus: siquidē idē Diosc. inquit folia Crissij esse longiora folijs Buglossi. Quantq; apud Pliniū, qui Crissio lib. 27. capite, s. fere eodē modo quo Dioscorides describit eandem Crission

Borago.

Buglossa unde dicta.

habere folia non longiora Bugloſſo, ſeu ut ipſe interpretatur, Lingua bo- **A**
 uis, ſed potius minora ſcribatur. Quē puto errorē ex uocabuli græci ſimi-
 litudine, & codicis mendo quē Plinius habuit, contigiſſe: quoniam pro
 macrotera quod uerbum ſignificat longiora, microtera, id eſt minora ſcri-
 ptū inuenit. Ego uero in multis codicibus græcis nō ſolum impreſſis, ſed
 etiam manu ſcriptis apud Dioſcoridem *μακρότερα*, id eſt, longiora, non autē
μικρότερα, id eſt, minora reperi. Liquido autē ſenſui ſubijcitur, folia herbæ il-
 lius, quæ uulgo Bugloſſa dicitur, eſſe folijs Boraginis longiora. Itē idem
 Dioſcor. inquit, in ſummo caule Criſſij eſſe capitula purpurea, quæ ſol-
 uuntur in lanugines, quod etiam in herba Bugloſſa a nobis appellata ui-
 ſu deprehenditur: contra in Boragine capitula cærulea, non autē purpur-
 ea conſpiciuntur. In autore autem de ſimplici medicina leguntur hæc uer-
 ba: Bugloſſam Romani linguam bubulam, Lucani Corago. Naſcitur locis
 cultis & ſabuloſis. Forte autem pro Borago uerbo, Corago uitioſe ſcribi-
 tur, aut nomen coraginis una litera uariata eſt; in boraginē uerſum. Qd
 autē inquit naſci locis cultis & ſabuloſis, hoc idē de ſuo Bugloſſo Dioſc.
 tradit. Pandectarius quoq; ſi qua eſt huius hominis autoritas, in litera L,
 Liſinaltaur, quod nomen apud Arabes ſignificat linguā bouis, ipſe bora-
 ginē interpretatur. Quare forte melius fuerit, cū Bugloſſam, de qua Dioſc.
 ſcor. Gal. & autores Arabes utrunq; allegantes, ad uſum medicinæ adhi-
 bemus, Boraginē potius, quam illā quæ paſſim Bugloſſa nuncupatur re- **B**
 cipere. Atq; ita falſum erit id, quod Montagnana exiſtimauit, Auicennā
 nihil de Boragine dixiſſe: nā, niſi mea me fallit opinio, caput de Bugloſſa,
 ſeu lingua bouis apud Auicennam eſt caput de Boragine, ſicuti etiam apud
 Serapionē: falſum etiā erit id quod Simon ſcribit, qui putauit neminē
 autorē de utraq; herba ſimul ſcripiſſe. Si quidē Dioſc. apd' Græcos,
 & Plin. apd' nos, tam de Bugloſſa, quā etiam de Criſſio fecere mentionē.
 Negari autē non poteſt quin Borago ſit alterum duorū apud Dioſc. aut
 Criſſion, aut Bugloſſum, ab hijs præſertim, qui boraginē bugloſſē, uel
 bugloſſam boraginis ſpeciē conſitentur: quando & Dioſcor. ipſe Criſ-
 ſion habere folia ſimilia Bugloſſo, & Bugloſſum magnum uocari teſtifi-
 catur. Si tamen borago ſit criſſium apud Græcos, uerū erit quod a Mon-
 tagnana ſcribitur, tam multa de boragine a iunioribus medicis temere præ-
 dicari. Nam Dioſcor. hoc tantum de Criſſio retulit: quod ſi radix eius al-
 ligatur ſuper locum dolentem, ſedat dolorem. Plinius autē, quod herba,
 aut radix alligata, ſanat dolores uaricum. Quare medici iuniores utrum
 uelint acceptent, aut qd Borago ſit uera Bugloſſa, ut nos opinamur, aut
 quod eius herbæ uſus non ſit ad illa u. tilis, ad quæ ipſi arbitrantur.

DE CICERBITA.

CICERBITA autem, de qua etiam ſcire cupis, eſt & ipſa ſicuti Bo-
 rago etiam in hoc uſu Callimachi carmine indyta. Eſt enim illa quā The-
 ſeo apponit ruſtica illa Echate, ut Plinius meminit. Verum in operibus
 medicinæ minus hodie celebrata: quia forte medici iuniores non nouer-

Sonchus.
Cicerbita.

C runt quo nomine apud ueteres autores, qui de medicina scripserunt, nuncupetur: atq; ideo nesciunt eius utilitates, quod nos nunc indicabimus. Dioscor. ipsam Sonchū nominat, & a Romanis Cicerbitam asperam uocari testificat: quamuis hoc nomen, ut pleraq; alia Romana uocabula, apud Dioscor. sit deprauatū: quia non Cicerbita aspera, sed circita aspra in græco codice uitiōse legitur. Idcirco autē a Romanis aspera fuit cognominata, quia spinosa est cum in uetera scit. Græci sane adhuc herbā, quam nos latine Cicerbitā nominamus, uulgo Sonchum appellant: ut mirandum sit, Simonem Genuensem, qui multa herbarum uocabula a græca herbaria didicit, quid tamen esset Sonchus apud Græcos ignorauerit. nā de ipsa meminit in litera S, & adducit uerba Dioscor. de Soncho, quæ tamen herba sit, aut quo nomine censeat apud nos, dicere prætermisit. Neq; minus admiratione dignū, Plinium huic herbæ, tam in usu cibario frequentī, latinū nomen non reddidisse. nam & ipse libro. 22. capite eiusdem numeri, quam nos uulgo Cicerbitam nominamus, græco uocabulo Sonchū appellauit: atq; ita ipsam descripsit, ut dubitari non possit Sonchū apud Græcos esse herbā, quā Latini Cicerbitā uocant. Sed præterea idem Plinius una cū Diosc. tot huius herbe usus enumerat, ut me aliquando pudeat nostri tēporis medicorū, qui tū illa remedia probant, quæ magno impendio parantur, quibus meliora aliquando pauperrimus quisq; cœnat: fere tamen, de quo nos etiā magis pudere oporteat, non Indicas, atq;

Notent Medici ampullosi,

D Arabicas, siue externi orbis quærūt medicinas, sed quas natura illa omnium rerū parēs uulgo etiā exposuit. Mustela pugnatura contra serpentes, pastu se Cicerbitæ munit, atq; inter pugnandū eodē crebro repetito se refouet. Compertū est hoc apud multos, qui dimicationē consertā uidere. Nos Theriacam contra uenena, ab Aegyptijs magno emimus precio, cuius potissimā partē, quā basim uocamus, illi adhuc ignorant, præter multa alia simplicia medicamenta, ad eandē compositionē necessaria, quæ nostra hac græte neq; a Græcis, neq; a Latinis, nedū a Barbaris cognoscunt: quorū etiā uel unius defectus, si Gal. medicorū principi credimus, potest totam compositionē corrumpere. Naturæ uero opera sunt absolutiora, inuentu faciliora, nisi ob hoc ipsum uilescerēt. Sonchū autē, siue Cicerbitā, cuius occasione hæc interposuimus, magnā habere contra uenena, sed præcipue scorpionū efficaciam, testant tū Diosc. apud Græcos, tum etiam Plinius apud nos, & ex recentioribus Conciliator: qui Lactucellam, per quā ut puto Cicerbitā intelligit, quæ ut etiā inquit Plinius, Lactuæ similis est, nisi spinosa foret, septē alijs herbis annumerat, quæ Theriacæ equalē habent contra uenena potestatem. Atq; insuper Auicennā apud Arabes, si modo Cicerbita sit herba quā ille. 2. Canone Taraxacon nominat, ut scio plerōsq; ætate nostra medicos celeberrimos, ac præsertim Gerardū Veronēsem axistimasse. Nolo em̃ ego nunc de isto decernere, qui dudū opus ad hoc ipsum destinaui, ad declarandū. s. noīa Arabica. 2. Canone apud Auicennā scripta inueniunt. Quod idē opus forte maturius absol-

Theriacæ difficilis & rara compositio.

Lactucella.

uemus. quando te hoc quoq; non minus cupere, quam illa quæ nuper a nobis explanata sunt, intelleximus. Si tamen tuam in hacre auiditatem plusculum fuerimus commorati, æquo animo patieris, futurum illud maxime sperans, quod tibi in hac epistola contigit, si modo epistolæ nomen meretur, quæ fere ad uoluminis magnitudinem excreuit, quæ quanto tardius, tanto maiori cum scœnore est tibi reddita. De Cicercia reliquum est, quo tuis quæsitis omni ex parte satis fiat, ut etiã de Cicercia respondeam, hoc leguminis genus uulgo Cicerciam nominatum a Plinio libro. 18. capite. 12. Cicercula nuncupatur a Theophrasto libro. 9. de plantis, & a Galeno eundem Theophrastum allegante, libro. 2. de alimentis, Lathiron: hoc enim uerbum Theodorus, græce latineq; doctissimus, in translatione Theophrasti Cicerculam interpretatur. Vale Ferrariæ Calendis Februarij, M. D. IIII.

A

Cicercia.

PANDVLPHI COLLINVTII,
aduersus NIC. LEONICE
NV M Pliniomastigen
Defensio.

DE PRASIO, & PRASO.

RASIVM GRÆCE ESSE, QVOD



nos Marrubium, Prasum uero quod Porrum dicimus, primum Leoniceus edocuit. Didicit (ut opinor) & ipse boni cuiusdam uiri poëticam medicinam, in qua ita scriptum est, Folia Marrubij sunt Prasfa, Prasq; Porri. Quæ quoniam Plinius distinguere nesciuerit, Horminum, Baloren, Stachyn Porri folijs, non Marrubij, ut oportuit, constare dixit. Tum tres illos testes, qui unus sunt, quod supra docuimus, Dioscoridem, Galenum, Paulum, opinioni suæ adspulantes citat. Verat Hadrianus Imperator, his testibus fidem adhiberi, qui unum, eundemq; sermonem (ut de compaeto) afferunt. Verum ipse neq; errasse Plinium patiar, qui Marrubium græce Prasum dici. 20. lib. & Porrum Prasum. 7. & 25. aperte monstrauerit; neq; Dioscoridem crediderim, sed hunc ipsum Pliniomastigen: qui ideo Dioscoridem Marrubium intellexisse opinatus est, quod ipse quæ nam illæ herbæ sint nesciat; placetq; hominis inscitiae potius, uel codicis uitio, quam Dioscoridis adscribere. Ita enim a Leonice nostro fieri oportuit, cum Plinium emendaturus uideretur, non quam herbam Plinius pinxisset, negare esse illam, sed quæ, qualisq; illa nunc sit docere: non quid unaquæq; res non sit (quod de Deo dici solet) sed quid ea sit dicere: non destruere, sed adstruere: non ex Dioscoridis sententia, in re non manifesta Plinium euertere. Pariter enim & Dioscorides potest Plinij autoritate superari, sed uel ratione, uel rei ipsius euidencia. Nihil minus philosophi est, ut diximus, quam aliquid sine ratione dicere. In herbis quoq; designandis, non scribentis autoritas, non Leoniceni censura, sed uis & figura, & res ipsa consideranda sunt, palamq; exhibendum quicquid id est medicamentum, de quo disputatur. Quod si ignoretur (neq; enim scire omnia mortalis est) salua apud nos scribentis autoritas sit, & humane potius ignorantiam nostram fateamur, quam errasse alterum impudenter iudicemus. Sic nos quoq; de his, quoad fieri poterit, primumq; de Hormino transigemus.

DE HORMINO.

Horminum, quæ & Geminalis latine dicitur, frumenti genus esse, & inter frumenta connumerari, Theophrastus Plantarum. 8. Plinius uero naturalis historię. 18. aperte indicant. Nam frumenta ex satis tempore diuidi, Theophrastum secutus Plinius inquit, cum Hyberna facit, ut Triticum, far, hordeum: Aestiuæ uero frumenta, pannicum, milium, horminum. Galenus quoq; alimentorum primo, quando Horminum in pollinem redigi affirmat, inter frumenta posuisse uidetur. Verum frumentacea omnia harundineo folio constare, tam Plinius, q; eodẽ loco Theophrastus de frumentorũ & leguminũ differentijs differens, scribit, Plinius Horminũ

Ad idem cap.
pũr supra fo-
lio. 44. c

B

Ad id cap.
supra folio
44. c

C Porri folijs constare dixit: utrū ergo harundineis folijs similis habet foliū: Porri ne, an Marrubium: nam si ratione certandū est (ubi res ipsa non exhibetur) Horminū inter frumenta est, frumenta Harundineo folio constant, Porri Harundini similis habet folium. Qui ergo Horminum Porro similia habere folia dixit, ueriora certe enunciauit, q̄ qui Marrubij, cui nulla profus cum Harundine cognatio. Pari similitudine quoq; Plinius (ut est in tradendis herbarū notationibus acutus ac diligens) in Oriza usus est. Oriza etenim & ipsum frumenti genus est: quod Rizum uulgo dicimus, nulli ignotū. Hanc. is. describens Plinius, Porro similia habere folia dixit: nulla alia ratione, quam qua Horminū quoq; Porri folijs constare scripsit. Porraci enim folij, ad harundinaceum (quo frumenta eisdem censentur autoribus) nulla aptior est proportio. Adde, quod Horminum Plinius, Theophrastusq; Pannico, & Milio æstius frumentis adnumerant: at si Milij, Pannicie folia describenda sint, nullius herbae magis, q̄ Porri foliorū pingent exemplo. Sic Hormini quoq; folia Pannico, Milioq; connumerata. Porri folijs, non Marrubij (quo nihil in frumentaceis figuris ineptius) effigiari oportet. Hæc de Hormino, rationem sequutus, reiq; ipsius euidentiam scripsi, quæ si Nicolaus penitus inperisset, nec notissimi frumeti Plinio, nec Prasij Græci uocabuli ignorationem obiecisset.

DE BALOTE.

Ad idem capitulum supra fol. 44. c.

Balote.

In Balote uero describenda, quid est quod Prasij, & Prasii uicinitate errasse Plinium credamus, quem quæ uera Balote esset (ut quæ plurima ubiq; nascatur) ignorasse non nisi ignorantissimus crederet: Qui libro. 20. Marrubium inquit, Græci Prasion uocant: & ex Castoris magistri sui sententia; nigrum etiam Marrubij genus esse scribit: ut sciamus etiam Marrubium nigrum dicere potuisse, sicut Porrum nigrum dixit, cum de Balote ageret. Baloten inquit Plinius, Græci Porrum nigrum uocant, folijs maioribus q̄ Porri. Addit. Et uescentibus, & graueolentibus, canis moribus efficacem. In nullo Marrubij genere folij uesunt: at in Porro, Alio, Harundine uesunt. Maiora inquit, sunt q̄ Porri. Magna esse Porri folia, non ignorabat Plinius: ideo maiora, adiecit. Graueolentiam in nullo Marrubij genere (nisi manu teratur) esse, certum est. Ea quoq; genera si terantur, non graueolentiam, sed acrem, neq; iniucundū inter Abrocanum atq; Ablynthium odorem reddunt. In Porro nigro recte graueolentiā dixeris: quippe, quod foetidum, grauem, & capiti noxium odorem referat: atq; ideo in medicamentis non estur, sed apponitur: quod contra in Marrubij generibus euenit. Sed quæ sunt oculis commissæ fidelibus, nonne mouere plus solent: Plena Balote sunt prata, atq; in montium præcipue radicibus isdem quibus describitur signis Porri folijs grandibus, nigris, maculosis. Vnde ego Baloten dictam existimem. Eam latinorum quidam Vlceraiam, rustici Porrum caninū uocant: ex eo quod putem, dictam, quod canis moribus aduerfetur, nec tam herbae similis, q̄ potestatis nomen referat. Quid autem Dioscorides, quiq; eum sequuntur crediderint, Nicolaus uiderit. Nos Plinium Romano ista pensantem iudicio, remq; ipsam audiamus, quamq; & Dioscorides quidem, cum multa Balotes nomina enumeret, inter quæ & Marrubium nigrum est, & magnum Marrubium, & Isionis sanguis. Alios tamē Cynosprason dicere Baloten affirmat: quod aliud nihil q̄ caninum Porrum significat, ipsumq; nomen ad rusticam simplicitatem manasse iam diximus.

DE STACHY.

Ad idem fol. quo supra.

Ampeloprasum, Vitigneum Porrum, Porrastellum.

Stachyn quæ tandem si ignorare me fateor: pari quoq; uel certe maiori ignorantia uersari Leoniceum arbitror. quippe qui & Stachyn ipsam ignoret, & unius, utpote momenti, Pliniam credat errasse: nec Plinii uerba, mentemq; consideret. Scriperat uicissim uolumine Plinius, Marrubium a græcis Prasion uocari, & nigrum Marrubij genus inueniri: notiusq; illud dixerat, q̄ ut indicandum esset. At. 4. & 20. libro cum Ampeloprasum, hoc est, uirgineum Porrum, quod nos uulgo Porrastellum uocamus, Porri folijs constare dixisset, continuo adnectens subiicit. Ea quoq; quæ Stachys dicitur, Porri similitudinem habet, longioribus folijs, pluribusq;. Stachys quoq; inquit Plinius, ut Ampeloprasus Porri similitudinem habet, longioribus folijs. Si Græci Prasio, id est, Marrubio similem Stachyn dixissent: cum exploratissimum habuisset Plinius Marrubiū referat, quod folijs paruis, & obrondis constet, tunc em errasse Plinium credibile aliquando fuisset: si Stachyn ut Ampeloprasum Porro non comparasset, uel simpliciter Porro similem dixisset. Verum quando porracæ herbae Stachyn adnumerat, & longiora illi folia quam Porro facit, quis iam dubitet, non errasse Plinium in herbae similitudine, quam compertam habuisse: Porro etenim, non Marrubio nulli (ut ipse inquit) ignoto, longa sunt folia. Accedit, quod qui octauū Galeni lib. de simplici. medicamentis latinū fecit, Stachyn Porro similem esse interpretatus est. Magnum ueritatis argumentum, Plinium, & eum, qui Galenum interpretatus est (qualiscunq; ille fuerit) in eandem de Stachy conuenisse sententiam.

C De LEUCOGRAPHIDE.

A

Ad idē cap.
supra fo. 44. c

Leucographida lapidem esse, non fatuit Plinium: quippe qui uolumine. 8. & 30. secundā Galatidis speciem Leucographidē appellauit. quoniam lactea esset, candidis intercurrentibus uenis. Sicur Leucogeam, quæ lacteo colore simplex esset. Sinopiten uero, quæ sanguinets uenis distingueretur, suasque uires illis tribuit, ut intelligamus plenius distinctiusque aliquanto Plinium quam Dioscoriden de eius lapidis generibus tradidisse: Leonicenū uero (qua fuit in diligentia) de Leucographide lapide scribente Pliniū non legisse, atque ideo in eo calumniando grauius deliquisse: Leucographidem quoque herbam esse. 7. & 25. libro scribit Plinius, eiusque uires aperit: quas uero illa esset scriptū se non reperisse inquit. In quo quæso accusator hic noster errasse Pliniū calumniatur: An, quia Leucographida lapidē esse ignorauit? At hunc bellissime, ut diximus, distinxit, descripsitque. Nosque illum & pulcherrimū habemus, & uiro incomparabili Pico Mirandulæ, & Anthonio Fauentino præstantissimo philosopho cum hæc proderemus, ostendimus. An, quod qualis esset Leucographis herba, non reperisse se fassus est? At de eius figura scribentem aliquem non uidit: sed eandem uires inquit herbæ suæ Plinius, quas Dioscorides lapidi tribuit. Quid si errasse Dioscoriden Leonicene dicerem: qui quæ herba esset, lapidē credidit: qua illum ratione defenderes? Aut si hoc non recipis, nonne communis tam lapidi quam herbæ uires esse possunt: Iaspis sanguinem sistit, Leucogea lactis abundantiam facit, Topazius uenerē cohibet: sed eosdem quoque effectus Siderites, Lagine, Ligus, atque herbarum præstant plurimæ. Sed Dioscorides inquit Moroxum quoque uocari Leucographiden scripsit. Falsum hoc quidem: Moroxum Galenus fortasse dixerit. Morochthum certe Dioscorides, non Moroxum, ut tu peruersereturisisti. Sed & hunc Morochthum lapidem esse non fugit Plinium: qui hunc ultimū uoluminis capite. 10. commemorat: quem nos quoque habemus, & multis ostendimus in coctis artrit lacteo sudore manantem, & candidas lineas, tametsi porraceam uiriditatem præferat, in pannis ducentem. At Morochthum hunc, Leucographiden quoque dici Dioscorides scripsit. An ideo errasse Plinium prædicas, quia de Dioscoridis ignoti sibi hominis appellationibus non diuinauerit: An non satis puras, unum Morochthi nomen adduxisse Plinium, qui Leucographiden, & alium quoque esse lapidem quam Morochthum ostendit? Tametsi quosdam Leucographiden, Galaxiamque uocasse illum Dioscorides scribat. Prædara dialectici philosophi argumenta. Faretur Plinius, figuram Leucographidis herbæ non reperisse se: ergo errat accusante Leoniceno: Quod ingenue fatetur Plinius, quod non temere adstruit, quod non repperit, quod non diuinauit, ergo errat? Iam uel ex ista argumentorū formula uidere possumus, quo hunc hominem carpendi libido, & nouitatis ostentatio transuersum ferat. Leucographida ergo & lapidē esse, & herbam quoque esse posse, Plinio docente discamus, ut Prasum quoque, & Heliotropium tam herbas, quam eiusdem nominis gemmas designant. Morochthum quoque ideo Leucographiden a quibusdam dictum, quod candidas ducat lineas, uiridis ipse cum sit. Galatidis uero secundam speciem ideo Leucographiden dictam, quod lactea cum sit, candidæ illa inscribant uenæ. Leonicensi uero, qui nec ista pensauit in legendo Plinio, hebetiorē fuisse poscimus.

Morochthus

B

C De POLIO, & TRIPOLIO.

Ad idē cap.
supra fo. 44. d

Polium suauissimam herbam Musæo & Hesiodo autoribus, qualis esset, quibusue polleret uiribus, luculenter (ut omnia) descripsit Plinius, Miraculum addens, hīdem tradentibus autoribus, quod ter colorem mutet. Tripoliū uero rationem figuræ, potestate, soloque diuersam suo loco pariter assignauit. Accusator hic noster, omnia fere uerbum ex uerbo quæ de Polio dixit, transulisse ex Dioscoride Plinium refert, uerum in hoc errasse, quod Tripoliū miraculum Polio adscripserit, contra quam Dioscorides fecerit. Simul, quod Tripoliū radicem dari epaticis in farre coctam prodiderit: quod apud nullum inquit, grauioris autoritatis medicum legitur. Iam & ex his quoque non transulisse ex Dioscoride Plinium satis constat. Verum age Nicolæ, effare obscuro, ne nostra fluctet oratio, sæpiusue idem repetendum sit. Aut Dioscor. non legit Plinius, quod supra docuimus: & nihil est quod tanto uiro inputes, si Musæo, Hesiodo, Theophrasto, totque illis autoribus plus minus, contraue scribat quam Dioscorides dixerit. Aut uidit quidem (ut tu autumas) sed neque Dioscoriden per omnia sequi illi uisum est. Et non uideo, cur si li Dioscoridi credendum magis censeas, quam Plinio, tot, tantorumque uirorum autoritate subnixo: quemque uersimile est, in eo tūa Dioscor. dissensisse, in quo uel ratione, uel experientia, uel grauioris uiri autoritate p̄motus, melius aliquid, aut uerius inuenisse putauerit. Non possumus nunc utrius herbæ, Polij, Tripoliūque, quæ tandē illa sit uidere miraculū. Neque enim aut regio, aut tempus patet. Sed quis apertam calumniam tuam non uideat: qui ideo errasse Plinium dicis, quod Musæo, & Hesiodo autoribus, eodem libro, duobus in locis de Polio scribat, con-

Herbarij ue-
teres.

Ficatella.

C tra ea quæ solus Dioscorides scripserit? Si Dioscoriden negauero, qua illum ratione, quo auro-
re defendes? Ego Musæum, Hesiiodum Dioscoridi opponam: Plinium quoq; Dioscoridi po-
steriorem, atq; ideo sapientiorē: qui & Dioscoriden (ut tu credis) & priscos omnes quos citat,
uiderit. Tū obsecro quale tuum est hoc enthymema? Non legitur inquis, apud aliquē medicū,
Tripoliū radicem dari hepaticis in farre coctam: ergo errauit Plinius qui hoc scripsit. Quid hoc
argumenti est, obsecro? Quia tu nō legisti, errauit Plinius: Nonne potuit a Castore suo Plinius
hoc didicisse: uel experimento comperisse? Nonne ab Hippocrate, Heralistrato, Chrysippo,
Praxagora: Num Diodice, Num Herophilo: Num Dieuce, Dionysio Metrodoroo; herbarijs:
quos tu nunquam uidisti, nec nos habemus: quicq; uel hoc ipso magnam habere Plinio gratiam
debeamus (ut uir rarissimus dicere Picus solet) quod illos nobis utuncq; refutauit? An nescis, o-
portere eum qui hoc argumentandi genere uti uelit, tria primum principia ponere? Legisse se
scilicet omnes medicorum libros, Tum uero intellexisse. Postremo memoria tenuisse. Num ti-
bi hæc adfuerunt omnia quæso, cum Plinium in Tripolio errare dixisti, quia tu nunquam apud
aliquem medicum legisti? At nos qui nec medicinæ artis scientiam fatemur, nec græcorum ua-
nitatibus additi, tam multa contemnimus: sed nostrorum quoq; & neotericorum ingenia &
admiramur & colimus: nefasq; esse & studioso homine indignum putamus, si oblatum qua-
lemcunq; librum uel semel non percurrimus. Tripolium ipsum scimus (quando & uirentem
Venetijs, & pictā uidimus, & herbariorum narratione didicimus) communi usu Trifoliū ma-
rinum dici: & Turbittellā, Soldanamq; uocari, & ab remedij ipsius de quo agimus facultate Fi-
catellam. Epar enim quodcunq; ex eo ficatum uulgo dici coepit: est quoque saginatorum fico-
suum iocinera gularē proceres laudauerunt. Vnde & Ficatellam Tripolium quoq; nuncupant,
quod epaticis (ut Plinius inquit) id est, ficato laborantibus asferre præsidium potest. Plurima
enim in Hæturie maritimis nascitur: & eo præsertim litoreo tractu, qui a uadis Volætrænis
ad ostia Tyberina protenditur. Huic & Iacobus Cornetanus medicus singulare uolumen dica-
uit: egregiasq; eius laudes epaticis cecinit. Quin & Præclarus Auicennæ enarrator Gentilis, Con-
siliorum libro qua parte Hydropis remedia colligit, mirabiles (ut ipse inquit) esse huius herbæ
effectus tradit. Et (ut ipsius quoq; asferam uerba) a tota inquis specie confortat epar, & ab eo e-
ducit aquam, quæ duo quasi basis in cura sunt hydropis. Num tibi uideatur grauiorem aliq-
ue medicum de Tripoli uiribus Plinio adsupulantem (quod tu negaueras) inuenisse? Addis &
aliud plane frigidius. Galenum autorem esse inquis, quod omnium uiscerum uitij Polium au-
xiliatur. Et hoc quæso quid argumenti est? Galenus omnibus uisceribus auxiliari Polium di-
cit, Plinius omnia ferme uiscera singularim enumerat, quibus Polii auxiliatur: in quo igitur
guis? Ille genus, Plinius generis species distinxit. Miraris præterea Plinium in Tripolio dixisse:
uisam illam quibusdam eandem esse quæ Polium: atq; ex eo cōsequis, Plinium illorum opini-
onem sequutum fuisse. Vnde obsecro noua hæc argumentorū ratio? Cum Polij Tripolijsq; dif-
ferentias, nomen, figura, solo, potestate diuersis locis assignauerit Plinius, quia quosdā duas
herbas unam putasse dicit (ut omnia quæ de illis scripta sunt referat) tu idem credidisse Plinium
arguis, qui iam diuersas esse firmauerat. Quæ ista obsecro concludendi necessitas? Dixerunt qui-
dam. Ergo Plinius, qui contrarium scripsit, credidit? Videre iam possumus, qua contradicendi
libidine Leoniceus feratur. Non argumentum, non rationem asserit, non autorum numerū,
non experientiam aliquam, quibus errasse Plinium necesse sit credere. Errasse (ut summatum di-
cam) toto hoc suo libello Plinium clamitat: nullo alio fere argumento, quam quod a suo Dio-
scoride (ut ipse putat) dissentit. Ego contra, ideo Dioscoridi fidem adhibendam non esse con-
tendo, quando a Plinio doctissimo homine, & romano & posteriore, & multis ac magnis au-
toritatibus fulto, solum Dioscoriden dissentire contingat: Plinij quoq; fidei atq; auctoritati, aliud
nihil quam rationem, experimentumue contrarium esse posse.

DE PAPAVERE HERACLIO.

Si eam diligentiam Nicolaus noster, operamq; in uestigandis herbarum notionibus differen-
tijq; impendisset, quam in cumulandis Plinij (ut ipse putat) erroribus adhibuit, utilius profe-
cto aliquid uitæ excogitasset, nec se magnorum hominum calumnijs inquinasset. Nam dum al-
iorum errata persequitur, in magnos ipse plurimosq; errores incidit. Quod uel ex hoc Papaue-
re de quo nunc agimus, perspicuum fieri potest. Radiculam græci Struthion, hoc est, Passercu-
lum uocant: quod cum herba, tum flos ipse, tametsi inodorus sit, egregie tamen pulcher est pas-
serculorum specie uisendus. Heradium Papaueris genus, Struthio simile esse, non tam Diosco-
rides quam, g. plantarum Theophrastus scribit. Plinius, qui (ut tibi uidere) si utrunq; scriptorem
conferas, ut in plerisq; omnibus sic in Papaueris generibus describendis Theophrastum sequi-
tus, plura quoq; & notiora herbarum signa commemorat, quoniam herbæ huius quoq; figu-
ram non ignoraret. Heradium Papauer inquit, si procul intuearis, speciem passerum folijs re-
præsentat. Ast hic noster communis salutis (ut ipse dese inquit) procurator, hoc ad Plinij erro-

tem retulit: Probabilius inquit existimari debere, herbam herbæ, quæ a uibus foliū habere per simile. Sed uideamus hominis literarū certe aliquem, rerū uero nullum usum habētis errorem. Conueniunt quidem Struthion, & Heraclium Papauer: non figura modo in his quæ diximus, sed & uiribus quadam inter se proportionē notādis. Nam ut Struthion lanis, sic Heraclium lanis splendorem affert. Si probabile est, herbam herbæ (quod negat nemo) cur non & probabilius a Plinio dicitur (ut expressius herbæ signa demonstret, & nominis ac similitudinis quasi quandam rationem reddat) Heraclij folia procul intuentibus, speciem passerum representare? Non animaduertit in calumniā præceptis Nicolaus, cui semper noua sunt omnia, morem hunc Plinij, tum herbariorum omnium esse, qui herbas ipsas compertas habuerunt, atque ideo alijs cognoscendas tradiderunt, non herbas modo similes, sed & animalia, ac surdas interdum, & diuersissimas prorsus res ad exemplum citasse: quo facilius, promptiorque uestigantis herbas diligentia fieret. Sic & in syluestris quoque Papaueris genere Cornicularium unum dici Theophrastus scribit, quod fructus inflexi ut cornicula figurantur. Sic cum Psyllium describunt, flores caninis capitibus similes pingunt: cum Echion, uiperis: cum Antirrhini fructū, uitulinis naribus: cum Myosotin, murinis auribus: cum Alektorolophon, gallinaceis cristis: cum Chenopū, anserinis pedibus: cum Lagopum, leporinis: cum Hippurin, equinæ caudæ: cum Alopecuron, uulpinæ: cum Scopiuron, a Nepa: cum Polypodium, a radice polyporum cirris simillima nominant. Quin & insectorum quoque similitudinem retulerunt. Cum Asplenii folijs, Scolopendrarum figuram assignent: cum syluestris Sesamifeminibus, Ricini foetidissimi animalis exemplum. Quid cum Cynosbati folia, uestigio hominis similia esse dicunt? Cum Omphalocarpi, hoc est, Aparines femina, umbilico: Cum Pelecynum lentis morbū, bipenni, ut securi: Cum Centunculum, capitijs penularum: Cum Lonchitidis capitula, personæ comicæ linguam exerent? Quid (quod magis etiā mirere) & cum præfatione pudoris etiā dicendum est, nonne Orchis herba, uirilium testium faciem radice præbet, Cynosorchis uero caninorum? Nun herba est uulgo nota ad primū ueris initium, in aruis ac segetibus nascentis, acedarijs expetita, Fabarolam uulgo nuncupat, medici Sacerdotis testiculum, cuius radicem pendente cum testibus colem dixerit? Nun Theophrastus plantarū octauo semina quedam ad mentulæ speciem effigiare, Plinius uero Cynomorion herbam canini genitalis formā præ se ferre dixerunt? Et mirabimur, Heraclium Papauer speciem passerulorum procul intuentibus representare, Pliniumque illud appositisime dixisse. Multum semper aribus licuit, in inueniendis, explicandis, prodendis: rerum uiribus ac differentijs. Quid nos hic mussitat Nicolaus? qui quoniam nec Struthion, nec Heraclium nouit, nec similitudines rerum, causasque considerat, ideo errasse Plinium prædicat, quod passerulorum folia Heraclij similia dixerit: nec rationem ullam, experimentumue affert, quo conuinci Plinius erroris possit.

DE EMPETRO.

Empetrum a nostris Calcifragum uocari refert Plinius, calculosque frangere: ac non ideo calculos non frangit, quia nullus ex his, quos Nicolaus legit, hoc scripsit. Hanc e herbam uim esse Plinius dicit magnus autor, atque abunde laudatus: cuius ueram esse sententiam, & experimento compertum est, & hominum opinione receptum. Est enim Empetrum (quod nos Leoniceus ignorauit) ea herba, quæ acedarijs gratissima nunc habetur: & quam Venetia omnis, una addita, immutataue litera, Sampetram herbam uocitat: Basichiam multi dicunt: alij Baticulam, Picentes ab herbæ ipsius facilitate Rumpifaxum uocant, folijs ad Rutam ferme accedentibus, uerum crassioribus, acutioribusque: flore, semineque, quæ cum Anisi, cum Fœniculi speciem in muscarijs representent: odore iucundo: sapore inter acidum salisumque cibi appetentiam prouocante. Nasciturque (ut Plinius quoque docuit) in montibus maritimis fere, in saxis: quod toto illo tractu uidere licet, qui inter phanum Fortunæ, Garganumque tenditur promontorium: & in Istrorum caunibus, Liburnorumque scopulis, unde plurima in Venetis defertur: & satius quoque in Cœnobiorum hortis non facili cultura seruatur. Certis quoque rationibus adducimur, ut eam putemus esse, quam, marinam Batin alio in loco Plinius appellauit, aliud Empetri genus quod Saxifragum nostri uocant. Nec Plinium latuit: quippe qui illud libro uigesimo secundo inter Adianta genera posuit, ramulis nigro colore uirentibus, folijs Filicis, mire calculos pellens, frangensque: unde & nomen: non quod umbrosis petris (ut Græci forte putauerunt) parietumque asperginitibus nasci illam uideamus. Non ergo nomen similitudine decæptus est Plinius, qui utrumque Empetri genus, diuerso nomine Calcifragum, & Saxifragum prodidit, sed Nicolaus noster, qui nec Plinij uerba persequi, nec herbas ipsas (ut accusatorem decebat) agnouit.

DE BETONICA.

Pari quoque impudentia fertur, cum errasse Plinium uerisimile sibi esse dicit in describenda

Empetrum.
Sampetra.
Basichia.
Bancula.
Rumpifaxum

Serratura.

C Betonica, qđ folio non quercus (ut Dioscorides) sed Lapathi similē Betonicā pinxit: quodq; ea pictura Britannicā herbā ex Dioscoridis sententia, magis conuenire uideretur. Sed mirum prorsus, ut indiligens accusator apparuit, homo alioquin haud indoctus, qui Pliniū uerba, nec penset, nec referat. Betonica, inquit Plinius, Serratura a nostris uocatur, a radice spargens folia fere Lapathi ferrata. Quis Lapathū ipsum, Betonicamq; agnoscens (nemo enim unus est, qui ambas non norit) non graphice descriptā a Plinio Betonicā dicat: cum Serraturā uocari, & folia fere Lapathi, & ferrata habere illam uideat, meliusq; aliquanto q̃ quercus similitudine a Dioscoride designatā: Cum folio quercus, nō ipsa Betonica (a quercu prorsus dissimilis) sed Trixago magis, & Hierobotane describātur. Non ergo Lapathi folia simpliciter dixit Plinius, sed ferrata adiecit, quod subticuit, aut dissimulauit Nicolaus. Cum in Britannicā descriptione notissimā herbā folia nigra, oblongaq; eodem libro dixisse satis esse putauerit: nec ferrata adiecit: quoniā incisuris illis, quibus Betonica distincta non sint. Quid autē aut frigidius, aut iniquius dici potest, q̃ ideo errasse Plinium dicere, quia Dioscoridis uerba, similitudinesq; in pingendis herbis non usurpauerit, sed signa alia, & quā aptiora uidebantur, adhibuit.

C D E P A R T H E N I O.

Parthenij species.

In explicandis Pliniū de Parthenio (ut ipse putat) erroribus, in magnos Leoniceus errores incidit, ut ex herbarum ipsarum descriptionibus, differentiisq; cognoscere licet: quas intellexisse, distinxisseq; Plinium, Leoniceum uero confudisse, per illarum ignorationem intellegimus. De ijs igitur sic agemus. Tres herbas Parthenij nomine nūcupatas. 21. & 22. uolumine scribit Plinius (nam de quarta quā Mercurialis est, sermo nunc nobis non est) hisq; omnibus, suas quibus pollerent uires adscripsit. Ex eorum (ut est uidere) sententia, quos tam multos enumerat, prima quā Parthenium, Leucanthi, Thamnacusq; a Græcis, a nostris, & Celso Pelecynum, Muraliumq; uocetur, in hortorum sepibus nascens, flore albo, odore mali, sapore amaro. Alteram quā Helxine, & Siderites, & Perdicium, ab aue cognominatur, folia habens mixtæ similitudinis Plantagini & Marrubio: cauliculos densos, leuiter rubentes, femina in capitibus lapaceis, adhærentia uestibus, unde Helxinem dictam uolunt. Tertiam quā item & Perdicium, & Astericum, a nostris uero herba Vrceolaris dicitur, folio similis Ocy-mo, nigrior tñ, in regulis, parietinisq; nascens. Has Parthenij differentias si Leoniceus cognouisset, simulq; & diligentius Celsum, & diuicide ista scribentem Plinium, & suum illum Dioscoridem inspexisset, non temere adeo obstrepuisset. Quod ut plene intelligere possint studiosi, ego eas quæ sint apteriam, discerpentdoq; proponam, ijs locum faciens, qui ueriora contulerint.

Pelecynum.

Prima quidem & a floris candore Leucanthi, & a fructū, celsiusq; densitate Thamnacus nomen accepit. Eadem a Celso (in his forte libris, quos de agricultura scripsisse illum constat) siue ab odoris suauitate, siue quod unguentis flos aptissime conueniret, Muralium dicta est, quasi Myralium, y, pſylon in, u, nostrū uerso, quod ueteres (ut in Murrha, Murena, & Mure) frequentissime usurparunt, & familiare esse latinis scribit Cicero. Pelecynum idem ex eo cognominasse uidetur, quod frutex ipse odoris suauitate, ad se pelliciat. Siue, quod, ut Pelecynus quodq; herba, quæ in segetibus nascitur, ad miniculo indigens hortorum, sepibus subrepat: quod nostro quoq; æuo fieri, hominum uidemus industria. Hanc nos uulgo Genfeminum uocamus, flore albo, odore mali, sapore amaro. Hęc est illa Parthenium, quam rectius fortasse Amaracum dixere quidam, quæ sub ipsa quiescentē Ascanium, floribus, & dulci aspirans completū umbra. Vnde laudatum illud in Co insula quondā confectum unguentum, quod Amaracinum, Sampsuchinumq; dicebatur. Vnde forte in Genfemini uocabulum uulguis deflexit, ut non aliud fructus uel herbæ genus intellexisse illos apud Dioscoridem putem, qui Parthenium Amaracum dixerunt. Alioqui si ea Dioscoridi Parthenium esse, quam Cautam uocare Tuscos tradit, quo pacto tam breuis herbæ umbra complexum puerum, dulciq; scripsisset insignis uates: Cum Cautam ipsam nec umbræ ob breuitatem idoneam, nec odoris unguentiu oblectamento ob florum graueolentiam esse plane omnes intellegant. Melius uero, eodem Dioscoride autore, & Chamæmilum, & Anthemida quoddam uocasse illam, quæ Cauta dicitur, fortasse quis putet: cum inter Chamæmili species, quas esse tres prodidit, collocetur.

Duas etenim, quæ nunc etiā Cautæ, uulgo Coræ dicant herbas nouimus, unā quæ Sana cognominetur, & a quibusdam Millefoliū, non recte dicatur, nos Leucanthemon Plinio dictam 21. uolumine credimus, Abrotano odore similem, & flore albo, foliofam, suspiriosis uitam. Alteram Chamæmilo similiores, quæ ab odoris foeditate putidæ cognomen ferat. Ponit & Dioscoridis Parthenium Millefolium hoc esse, si non illi Coriandri folia adscripsisset. At secunda Parthenium iisdem quibus a Plinio pingitur signis, plurima inspicitur in aruis, stipulifq; nascens, folijs fere Mercurialis: cuius semen asperum, nigrumq; perdes appetant. Eam quando semina inambulantū uestibus hæreant, ut græcorum quidam Helxinem dictam uo-

auerunt, Romani herbam Lapariam. Sic uulgus quoq; per hæc tempora Grapellam nuncupat, quasi a rapiendo Rapellam dicas. Tertia uero est ea, quam ex eo quod folia caudiculis stellæ instar circumherentia habear, Astericum dicitur: & quod ipsa rapaci quadam lanugine hæreere uisibus possit, a Dioscoride dicta Helxine uidetur. Quod uero tergendis urceolis, uitreisq; uasis experimento sit efficax, a Plinio Vrceolaris, a nobis uulgo quoq; Vitriolum dicitur. Quod uero muris, parietibusq; nascatur, a Celfo Muralis. 2. de medicina libro, a nostri temporis Medicis recte Parietaria dicitur, Mineruæ sacra, atq; ideo Parthenium dicta, quod eam dea somno monstrauerit.

Vides, ut in nullo deceptus Plinius, si qui illum legant, intelligant, ab errore uindictur: Vides iam Conuoluuli huius nostri manifestam calumniam: ut sese suo cum Dioscoride uelut in Pampino contorqueat: Qui suam Parthenium & Chamæmelum uocet, & Solsequium & Miflesolium uocari a Romanis asserit: quibus quidem appellationibus absurdius nihil dici potest, apud eos etiam qui uel mediocriter herbariam attigerunt: qui & propria illa esse diuersissimarum prorsus a Parthenio herbarum nomina non ignorant. Et Leoniceus in primo quidem Parthenij genere, pro Pelecyno, quod ueteres & impressi habent codices, Perdicium scribit. In tertio pro Murali, Muralium ponit. Et quod de Murali in. 2. de medicina libro Celsus scribit, hic de Muralio in. 3. scribere illum impudenter affirmat. Tum pro Leucanthæ candidi floris herba, unde & nomen, Coram nescio quam, Cautam, ut arbitror, Dioscoridis uertens, autumat: non albo flore, sed luteo, candidis foliisculis coronato: non odore mali, sed Abrotani, ut Plinius, uel insuauis ac tristi: si eam quæ Putida cognominatur intelligit: ut iam quod Plinio primus obiecerat, in Nicolaum ipsum, uehementiusq; aliquanto retorqueri possit: qui non hominum modo, & rerum similitudine, sed græcæ quoq; eruditionis opinione deceptus, plurima intemperanter effudit.

DE CYCLAMINO.

Cyclamini herbæ, quam nunc porcinum Panem uulgus, medicij uocant, tria genera, Aristolochiæ uero quatuor apissime scribit, pingitq; Plinius: at hic noster accusator, Cyclamini radicem dicit ideo existimasse Plinium, uideri Aristolochiæ Rotundæ radicem esse, quoniam radici Aristolochiæ uim necandi pisces adscripsit. Huius rei argumentum hoc affert, quod ipse (inquit) a uiris grauissimis accepti, idem nostro æuo fieri, non Aristolochiæ radice, sed Cyclamini. Nonne preclaro usus uidetur aduersus Plinium Leoniceus, uel testimonio, uel syllogismo: Quia audiui inquit Nicolaus Leoniceus, Cyclamini radice pisces necari, fallitur Plinius etiam cum uidisse se dicat, qui Aristolochiæ radice pisces necari tradidit. O inexcusabilem calumniam: quia Cyclamini radix hoc facit, Aristolochiæ non facit. Quia de Cyclamini radice ab ignotis Nicolaus accepit, Plinius proprio testimonio de Aristolochia menditur. En præclari Dialectici argumenta: quoniam Tubere terræ (id est, primæ Cyclamini radice) sit ut pisces necentur. Malo terræ, hoc est, Aristolochiæ rotundæ radice fieri non potest. Fallitur Plinius, qui id uidisse se scribit non fallitur Nicolaus, qui audisse se dicit: At Plinius inquit, radicem Cyclamini id etiam efficere scribit. Verum id quidem Leoniceus: sed tertiæ Cyclamini, cognomine Chamæcissi, cuius non rotunda, sed sparsa sit radix: ut tandem agnoscas sine mente te debere, quod de Rapo terræ audisse te persuadere conaris. An cæcū, uel mendacē fuisse Pliniū putas Nicolaus, cum Campanos piscatores Malo terræ calcem miscere, piscesq; necare uidisse se scribit: num impossibile quiddam, aut supra fidem dixisse tibi uisus est Plinius: Sed & Tithymalum cognomine Corymbiten lib. 6. & 20. & Lactucam caprinam libro. 20. eosdem præstare in necandis piscibus effectus, idem ipse Plinius tradit. Verbasco herba tam fluuiales, quam lacustres pisces interimi. Et marinos etiam a Phœnicibus hoc modo cap. 7. historia animalium Aristoteles scribit. Nos quoq; experimento, usq; didicimus, & Cucumerem Asininum, & uiridia nucū putaminis confusa idem efficere posse. Quoniam ergo & Cyclamino, & Corymbite, & Lactuca caprina, & Verbasco, & Cucumere asinino, & Iuglandium corticibus pisces necantur, errat Plinius, qui Aristolochiæ radice necari dixit. Num tibi carneadea ista uidentur, Aristorelicæ demonstrationes, quibus inexpugnabile uerum necessario sequatur: Tum concludens pergis, atq; in hunc modum dicis. Aut igitur fatendum est, duas esse radices, quæ eosdem præstent effectus, aut illud dicendum erit, Cyclaminum rotundæ radicis, quantum esse Aristolochiæ genus. Vnde ista obsecro fatendi, dicendiq; necessitas Nicolæ: Primum quidem non duas modo herbas, quæ pisces necent, sed sex adduximus: multasq; alias idē efficere posse, nō dubitamus. Num grande, aut mirandum quiddam pures, si duæ pluresue herbæ idem possint: Deinde quia Cyclaminus pisces necat, Aristolochiæ genus erit quartum: At quintum dixisses. Aristolochiæ enim genera quatuor Plinius enumerat. Pari ergo ratione Corymbites, Tithymalus, & Lactuca caprina, & Verbascum, & Cucumer asininus, & Iuglandium cortices, quia pisces necant, inter

Tuber terræ.
Malum terræ.

Pisces necantes herbæ sex.

C Aristolochiæ genera reponentur: quasi unum effectum, non nisi unius herbæ genus præstare possit. Quod nec aniculæ quidem dicerent, aut empiricorum quicquam. At de Aristolochia quod pisces necet, a nullo inquis autore scriptum reperitur. Legisti ne omnes autores Leonice: Nonne ego te in Tripolio monui, oportere eum, qui ita arguit, legisse, intellexisse, & memoria tenuisse omnes, qui unq̃ scripsere autores: quo argumenti huius formula & ratio constare possit: Sed nonne omnibus autoribus rei ipsius euidentia potior? Hanc radicem etiam nū Campani Melum terragnum, hoc est, Malum terre uulgo dicunt: & in piscatu passim adhibent. Quod uir illustis, acerrimiq̃ iudicii Sigismundus Estensis frater tuus dux indytle (cum hæc proderemus) nobis retulit. At quæ nam ista peruiciacia: quæ frontis duricies: quæ impudentia est: a nullo autore scriptum inquis, cum Plinius scribat. Et quia nullum id scribentem reperisti, quoniam paucos legisti, ideo Plinio, qui se uidisse affirmat, credendum non est: qui tibi te auduisse dicenti credi putas. Cui ego in his quidem, quamuis iurato, metuam concedere testi: O in felice Plinium, O casta literarum studia, O uanos integerrimi uiri labores, lubricationesq̃ miseris. En post annos mille & quadringentos, sophistes unus, in hoc tandem uæsanæ genus prorupit, ut non errasse modo, rerum, uel nominum similitudine deceptū (quod & hominis erat) sed & mentitum quoq̃ Plinium in sinuer, quia id uidisse se affirmat, quod Nicolaus Leoniceus a nullo scriptum reperit. Non ergo de Plinij doctrina, sed fide nunc agitur. Prædare mehercle cum studiis actum: piger, pudetq̃ aduersus hunc hominem uerbis agere, qui iam non uerbis (ut Aristoteles inquit) sed pœna indiget. Iam uel hoc solo hominem intelligere possumus: qui etiam gracilifans addidit (ut obiter & sua quoq̃ pensemus) Cyclamini radicem, Rapum terræ uocari. Ex Dioscoridis magis sententia, quam Plinij autoritate latini hominis, & tuber terræ uocantis: quasi & hortenfe rapum, non terræ olus sit, sed aquæ, sola uero Cyclaminus rapū terræ uocari debeat. Tum non Cyclaminum (ut Celsus, Pliniusq̃ latini homines, & a Græcis ducta ratio postulat) sed Cyclamen, præclarus literator enunciat. Sed minutius istas persequi, opere precii fortasse non est: nunc ad reliqua pergemus: deq̃ Intibo & Heliotropio disseramus.

¶ De HELIOTROPIO.

In Heliotropij descriptione non errasse Pliniū, intelligat quicumq̃ perpenso iudicio æquus rerum existimator aduertet animo, Plinium ipsum Intybacei generis, Heliotropijq̃ nouissima rerum herbarum species, figuratq̃ primum descripsisse, tum etiam uim facultatemq̃ illarum adiecit. Neq̃ uerisimile esse, eruditissimum hominem in his quæ graphice adeo adnorasset, uno uerbo lapsum, clarissimarum herbarum noticiam confudisse. Quapropter codicis (ut opinor) uitio potius, quam tanti uiri autoritati unius uerbi adscribemus erratum. Diligentius igit oro ista considerentur, differentialisq̃ notemus.

Intybus nec ex lactucineo genere, nam ex alio dici potest. Nam omnia huius genera ita Lactucæ cognata esse uidentur, ut unum ex alio nasci uideas, posteriore semper per ratam aliquæ rationem decrescente. Lactucamq̃ in aliquo referente. Et Intybus uolus quidem est partim hortenfe, partim (ut Theophrastus inquit) aruense. Hortense dico, quod fatiui est: aruense, quod spontaneum, syluestre q̃ dicitur. Satiuum Intybi genus Seris dicitur: syluestre uero, Erraticum. Seridis autem, id est, satiui Intybi duæ sunt species: quarum una ut ipsum genus satia dicitur: syluestris uero altera: tamen utraq̃ hortenfis sit. Satiua Seris, id est, satiuius hortenfis Intybus, Lactucæ simillima est, candidior, latiore folio quam syluestris, caule crassiori, cui florum cauliculi per internodia ferme hæreant (ut in Pulegio solet) ab his internodijs ramusculi prodeunt. In quibus etiam flores cerulei nascuntur, qui & celerrime marcescunt. Hæc cibus grata est, sapore fere Lactuce, atq̃ inter hyberna olera deputatur. Syluestris uero Seris, id est, syluestris hortenfis Intybus medicatio: æstiuumq̃ olus est, angustiori, longioriq̃ constar folio quam Lactuca uel satia Seris, colore nigrior. Huic etiam caulis unus, & qui in sublime feratur, ramusq̃ late spargat: atq̃ ex ipsis ramis cauliculos, Acedarijs non ingratos. Et ex ipsis geniculis, unde cauliculi prodeunt, folia acutiora quam quæ a radice proficiuntur. Flores uero ceruleus, satia non absimilis: sapor ad amaritudinem uergens: in quo quidem apertissime differunt. Cum & amaris Intyba fibris Virgilius quoq̃ prodiderit. Hæc est laudata illa herba, cuius in medicina nostro æuo frequens est usus: quamq̃ uulgos nunc, medicis omnes Endiuia uocant: quasi paululum defleuens Intybiā dixeris. Erratici quoq̃, hoc est, aruentis syluestrisq̃ Intybi duæ sunt species. Vna quam Ambubeiam Celsus, & quidam dixerunt. Vel eo dictam: quod ad solem ambire uideatur, quasi Ambubeliam dixeris (tamen praue in Plinianis codicibus Ambugia legatur) Aegiptij Cichorium, & torpent grata palato, Cichorea a Columella dicta. Syluestri Seridi similior, amaraq̃ est. Et ipsa notior quam ut describi oporteat. Hanc quoniam magni in medicina usus sit ex græcis alij ab eximia utilitate Chreston, quidam Pancration, quasi omnipotentem cognominarunt, Vulgus quoq̃ pro locorum uarietate Cichoreā, Radiculū,

Intybus duplex.

Seridis species.

Endiuia.

Ambubeia.

Porcinum grumatum, Sponfam solis uocitant. Et quoniam ipsa ceruleum florem noctu claudat, solemq; sequatur, a plerisq; & medicis etiam Heliotropium non modo dicta, sed credita. Altera erratici aruenfis syluestrisq; Intybi species Seridifimilior, crispæue Lactuæ (unde & Picentibus nomen) amara quidem, nisi senescens, non est, caudice, folijsq; interdum rubentibus, crispis: flore in pappum desinente: cuius folia, radicesq; coctæ, crudæq; eduntur, cœnis gratæ. unde & nomen D.pnoïdes. Patauini Lacticinum, Crispinū Picentes, nos Cicerbitam dicimus.

Quatuor hæc Intybi genera Dioscoride, Plinio, Syluatico, atq; herbarijs tradita, quantum potissimum expressimus. Illud addendum uidetur, ne quid forte ex nominis uarietate dubitatio nis subrepat, Intybum apud multos Intubum scribi: eandem tamen herbam significari. Sed græcum illud, γ, psylon, nos in .u. nostrum uertere interdum consueuimus: ut cum de Parthenio ageremus, a nobis dictū est. Vtrumq; igitur tam Innubus, quā Intybus rectissime dicī.

Asit quæ græco nomine Heliotropium, latino Solaris, Verrucariæq; a quibusdam dicta est, uulgo Girasolis, ab radice stanti ramosa assurgit, atq; ab radice florere incipit. Huius quoque duo sunt genera, Heliotrophium, Tricoccumq;. Heliotrophio latiora quā Ocimo folia, ad Maluam fere uergentia. Flos maluaceus, pendulus. Cognatione etenim quadam ista similia sunt, similiteraq; mouentur, Heliotropium, & Malua (quod Theophrastus ait) atq; elegantissimus hortensium uates, Et Malache prono sequitur quæ uertice solem. Plinius quoq; cum tres colores purpureum referentes scribat, Vnus inquit in Heliotropio est: & in aliquo ex his plerumq; saturatio. Alius in Malua, ad purpureum inclinans. Alius in Viola conchylorum uegetissima. Tricocco uero folia Ocimi, flos candidus subrubus, incuruus, Scorpiurusq; ideo dictus: quod semen, floremue ferat scorpionis caudæ per simile. Ambobus æterna folia, perpetuo enim Solaris uret, ut Theophrastus inquit. Alioquin haud satis rusticis natura consuluisse, si non toto anno illum solis rotatum, horarumq; circuitum nubilo etiam die spectare posset. In quo ergo obsecro Intypaceum genus Heliotropiumq; conueniunt, ut falli potuerit Plinius, qui ista descripsit, uiresq; suas singulis assignauit? Intybis folia decidua, Heliotropio æterna: Flos illis ceruleus, huic rubens: Folia illis ad Lactuam pro portione respondentia, huic Ocimo similia: Facultates uiresq; diuersæ, hæc quoq; Plinius ut notissimas scripsit. In quo ergo errauit? In eo, Nicolaus inquit, quod Plinius .20. uolumine ita scriptum inuenitur. Heliotropium noctu contra hit ceruleum florem: Heliotropium uero non ceruleus, sed rubens flos est, ut diximus. Quid si ibi non ceruleum, sed purpureum, uel puniceum, uel subrubentem scriptum esset? tum quadarent omnia, tum nihil haberet Nicolaus quod obijceret. At quæ nam ista inhumanitas, quæ imprudentia est, Plinium nostrum incitæ potius accusare, quam librariorum erroris damnare? Si ea quæ maiora potioraq; uidentur, hoc est, figuras, colores, potestatesq; diuersas notissimarum herbarum tradidit Plinius, cur uno uerbo eum lapsum Leonice putas, qui tot uerba congesti, ut duas, & eas diuersas herbas esse monstraret? Non sunt ista Nicolæ, non sunt hominis ista, non philosophi, quo plures grauissimi uiri errores (ut ipse inquis) cummlarentur: ea quoq; dispunxisse, in quibus errasse Plinium dicere, tam sit nefas, quam absurdum, familiarissimas etiam rusticis herbas illum ignorasse.

Vide obsecro Nicolæ, qui te philosophum nuncupes, quantum inter philosophiam, & grauè bonumq; uirum interit. Atq; ipsum audi Augustinum, Augustinum inquam non grammaticæ subtilitatis, nec græce uaniloquentia, sed uere philosophiæ professorem, de se ita loquentem. Ego inquit his scriptorum libris qui iam canonici appellantur, hunc timorem didici honoremq; referre, ut nullum eorum scribendo errasse audeam credere: Aut si aliquid in eis offendero, quod ueritati contrarium uideatur, nihil aliud existimem, quam mendosum esse codicem: uel non esse assequutum interpretem quod dictum est: uel me minime intellexisse non ambigam. Hæc bonitas, hæc ueritas, hæc philosophi hominis moderatio. Hos animos, hanc mentem induere studiosos oportet, cum magnorum uiuorum libros beneq; de litteris meritorum legunt. Tollendum ergo abradendumq; ceruleum illud (quod subdiciū esse nemo non intelligit) & puniceum, uel purpureum, uel subrubens inferendum est: qualem paulo infra Plinius florem supraq; designauerat. Et quoniam his quas supra diximus rationibus monstratum satis est, errare Plinium in re quam ipse manifestam fecisset non potuisse, mendosi codicis uitium unius uerbi abolitione castigandum est. Quod si ideo errasse Plinium Leoniceus putat, quod Ambubeia quoq; solem ceruleo flore sequatur. At hoc & Tithymali quartum genus, & syluestre Sesamum utrunq; Heliotrophium e re ipsa dictum, & Malua, & Lupinum, & Lotus ægyptia faciunt, herbarumq; plurimæ. Nec quod Heliotropium in cibis placere dixerit, ideo errasse Plinium putandum est. Neq; enim uideo, cur tantus ille syderis amor impedimento sit, ut Heliotropium decoqui, mandiq; non possit. Sileant ergo boni huius uiri prædara commenta. Et quoniam ipse neq; Heliotropium herbam cognoscit, atq; ideo neq; decoctā gustauit unquam, patiatur obsecro & Plinium scribere, & nos credere, quod Heliotropium quoq;, ut Intybus in

A

Intybus.
Inrubus.
Heliotropiū.

Heliotro-
phium.

Tricoccum.

B

Augustin
modestia.

Cibis placere possit; si ipse nec rationem ullam, nec experimentum quod obstat afferre potest.

De PENTAPHYLLO.

Egregie defensum a nobis in Heliotropio Plinium, negabit nemo, quod unius omnia in-
terurbantis uerbi uitium, non Plinio, sed codici, ut par erat, tribuimus. Nam & eodem argu-
mento in Quinqesolio, ut ipse inquit, excusare Pliniū, paratus fuerat Nicolaus, nisi delicatus
nimis exactor, quod omnia ad numerū opinionī, quā de Pentaphyllo cōceperat, non respon-
derent, satisfactum sibi non putauit. Sed tam in Plinio excusando nunc primus ipse, q̄ in accu-
sando (ut semper) errare uisus est. Quod in hoc de quo agimus Quinqesolio perspicuum fa-
ciam. In hoc maxime errasse Pliniū Leonicenus credidit, quod Quinqesolium herbam, etiam
fraga ferre dixerit. nam quæ fraga fert herba, inquit, non quis, sed trinis constar folijs. Ve-
rum triplici in errore uersari Leonicenum, ante omnia scire oportet. Primum quidem, quod
Quinqesolium illam esse arbitrat, quæ & in hortis, & agrorum limitibus, tum semitis, uisq̄
passim conspicitur, quæ quidem uulgo, & Quinqesoliū, & Pes Coruinus dicitur. Hanc enim
Quinqesoliū esse, de qua ueteres medici loquerentur, affirmasse illū plerisq̄ constat: cum de
nostra hac defensione, deq̄ sua accusatione sermo forte incidisset. Auulsūq̄ terra ramuscu-
lum (nam & in horro res agebatur) ostendisse, dixisseq̄ illam Quinqesolium esse, in qua Plinius
tam euidenter errauerit. Deinde, quod per imperitiā herbā fraga ferre posse nullā credidit, nisi
eam, quæ trina folia habet, q̄q̄ melius Trifoliū dici adseuerat, & quam docti, uulgusq̄ Fragari-
am herbam noscunt, pariter & appellant. Tertio, quod Foliū quid sit, quoque modo accipi opor-
teat, in saluberrimæ herbæ descriptione parū intellexisse uisus est. Adde si placet & quartū (quan-
do & ipse minutissima quæq̄ in Plinio carpat) quod fructus hos, si Quinqesoliū, siue Trifo-
lij, non fraga (ut semper Vergilius, & in suo Palemone noster Maro) sed incite fraga Leonice-
nus appellat. Nos cum Theophrasti, mox Dioscoridis, postremo Plinij, de Quinqesolio dicta
excussimus, & uerum esse autorem Pliniū; & calumniatorē esse Leonicenum ostendimus.


Quinqesoliū.

D Quinqesoliū, siue Quinqepennæ radix (lib. 9. Theoph. inquit) cum effoditur, rubra est;
inascens uero nigrescit, atq̄ quadrat. Habet foliū Vitis, sed pusillū, & colore simile uirgineo
est, & auget, & desinit cum Vite; folia oīa quinq̄, unde & nomen. At quarto Dioscor. cū multa
Pentaphylli noīa enumeret, inter quæ & Pentadactylon, & Pseudoselinon, & Quinqesoliū sunt,
Ramos inquit fert tenues, unius palmi, in quibus fructus: folia habet Menthæ similia, quolibet
in furculo quinq̄, raro uero plura, in circulū sinuatim diuisa, Florem habet cum pallore subal-
bidum (ita enim ochroleucon interpretari posse uideo) radicem subruffam, oblongam, Helle-
boro nigro crassiorē, quæ plurimum in usu est.

Plinius uero quinto & uigesimo, Quinqesolium inquit, nulli ignotum. Cum etiam fraga
gignendo, commendetur. Græci uocant Pentapeton, siue Chamæselinon, siue Pentaphyllon.
Cum effodit, rubra habet radicē. Hæc inascens nigrescit, & angulosa fit. Nomen a numero
foliorum habet. Etip̄sa herba incipit & desinit cum Vite. De Pentaphyllo igitur, hoc est, Quin-
quesolio hæc habentur. Nullus etiam, quod sciam, his autoribus uerustior, illam pingit. Nam
Galenus eius tantum uires, non figuram aperit.

Primū illud ex his satis constat, uulgarem illam Leoniceni Quinqesolium, nō esse hanc de
qua agimus. Nam & illi nec flos albidus, nec in furculis fructus, nec radix rubra, nec crassa, nec
inascens, aut quadratur, aut nigrescit, nec uitis egressum, digressumq̄ sequitur, sed perpetuo
uiret. Hæc si quis neget, herbæ ipsius conspекtionē conuincitur. Sed & illud quoq̄ liquido con-
stare arbitror, cum Plinij autoritate, tum Dioscoridis pictura, Pentaphyllon hanc nostram, fru-
ctum quoq̄ ferre: cum etiam fraga gignendo, cōmendari illam scribat Plinius; tum ramos unius
palmi tenues, in quibus fructus sint, habere illam Dioscorides referat. Folium uero non esse,
quale Leonicenus arbitratus est, ex omnium descriptionibus intueri licet: Nam Theophrastus
solum habere illam Viti simile prodidit, & folia omnia quinq̄; Dioscorides uero folia illam si-
nuatim falcatimue diuisa, quolibet in furculo quinq̄. Tum in nominibus Penda&ylon illam
uocat, quo nomine & Cici quoq̄, siue syluestre Sesamum cognominatur, cuius folium palam
est Viti simillimum esse: tum Pseudoselinon, quod falsum Apium dici, potest.

Plinius uero Chamæselinon, quasi humile Apium, eadem uterque ratione cognominant,
quod & Apium Viti simile quiddam habere uideatur, & folia ad hunc quoq̄ modum sinua-
ta, a quorū deinceps numero Quinqesoliū, & Quinqepenna dicta est. Quæ cū ita sint, ideo Quin-
quesoliū dicta est, q̄ huiusmodi integra folia, quinq̄ ab radice emittit: nec foliisculis quinq̄ (ut
quā Pedē coruinū uocari supra diximus) aut uulgaris Leonic. Pentaphyllō distincta, sed porre-
ctoribus quinq̄ (ut ita dixerim) angulis, ad Vitis, Apijq̄ similitudinē in sequentē ferme modū
effigiata est. Hæc & Pentaphyllon illa est, quæ Diosc. autore fructus edit, quæ fraga ab Plin. ap-
pellant, cuius eximia a Diosc. uires Plinij tradunt, quæ in Theriac compositionibus addit,



que purgandis domibus adhibet, cuius radicē plurimū in usu esse, Dioscorides dixit. Quæ si Leonicenus noster, acrioribus oculis inspexisset, nec uilissimam herbam, cuius in medicina nullus usus esset, pro utilissima & celeberrima demonstrasset, nec in tempeſtue adeo in Plinium adlataſſet. Herba uero illa, quæ distincta tria folia habet, quamq; in Italiæ montibus plurimam & cœnobiorum hortis satiatam passim fraga ferre uidemus, suum nomen habet, Fragaria ab herbarijs, a Plinio Fragaria dicitur. Nec uerisimile cuiquam fuerit, hoc loco Quinquifolium, tot appellationibus, tot etiam signis demonstrare uoluisse, si Fragariam intellexisset herbam quæ uulgaris est, & quam ipse fraga in superioribus appellasset. Atq; ideo non simpliciter Quinquifolium fraga ferre dixit, sed copulæ etiam scilicet adiectione descripsit, cum commendari illam etiam fraga gignendo dixerit: neq; enim etiam augmentem copulam addidisset, nisi & aliam esse herbam, quæ fraga ferret, agnouisset; ut quam ipse prioribus uoluminibus indicasset.

His illud adiiciendum uidetur (ut minus mirum sit, Quinquifolium quoq; fraga ferre posse) Fragariam illam nostræ huic Pentaphyllo, de qua agimus, proportionem quadam similem

A

adeo esse, ut eiusdem generis cum ipsa esse uideatur. Nam & ipsam hæc commentantes obseruauimus, radicē subruſſam habere, & digito sæpe crassiorē, & senescentē nigrescere: tum nō nisi ramusculos quinq; ab radice emittere, raroq; plures, in quib. prima illa foliuscula diuidantur.

Duas ergo herbas esse dicimus. Vnam quæ fraga, aut certe fragis similes fructus edat, quæ Pentaphyllo, & Quinquifolium Dioscoridi, Plinioq; uocetur, quæque ad medicos usus excimia sit. Alteram quæ uulgaris est, & fraga ferat, nulloque alio, quam fructus ipsius nomine designetur: cuius decimoquinti primi & uigesimali uoluminis capite Plinius meminit. Quod si me interroges, quid nam & hodie Quinquifolium hanc esse putem, quam uel eius appellationem credam: Dicam quid uestigans inuenirim, atque ut nihil unquam decernens, sic nihil retinens, quod studiorum ingenia ad ueritatis inquisitionem mouere, excitareque possit. Est Venetijs in eo uico, quem Specierum uocant, sepalsarij cuiusdam non ignobilis taberna, cui pro titulo insignique sit Aethiopis caput. In ea liber est Herbarius, tanta arte ac diligētia pictus, ut natus paginis illis suis herbas, non effigiatas credas: in eo pictam uidimus ipsam prorsus quæ hîc diximus signis herbam, folijs quinque, quæ & ipsa quoque ut pinximus, porrectiores angulos, sinuatosq; haberent. Sed & fructus, quos Fraga dicas, tum ad ipsam herbam latinum nomen Sanicula, Germanicum Sanicel scriptum est: citanturque inibi, de Sanicula hac scribentes, in Diadimidijs Galenus, & Petrus Hispanus is, qui postea summum Pontificatum gessit, & Ioannes uigesimalis primus nuncupatus: q̃ eum de medicina librū scripsit, qui Pauperum thesaurus inscribitur: tum Ceruensis Episcopus quidam, & Laudensis Maxphæus, & Gilbertus Anglicus, Chirurgi. Ea Sanicula, Pentaphyllo nō sit, cur affirmem non habeo, cur negem non uideo. Hæc habui de Pentaphyllo, Fragis, Sanicula, quæ dicerem, per quæ fieri oportere censeam, non errasse Plinium, sed iucundissimæ herbæ nomen, potestatemque docuisse.

Fragariæ herbæ duplices.

B

Sanicula.

De A D A R C A.

Similis quoq; intelligentia transuersum hominē rapuit, dum errasse in Adarq; descriptione Plinium calumniatus est. Neq; enim esse aliud Adarcam credidit, quam quod in suo Dioscoride legerat: quippe qui unius ad dictus iurare in uerba magistri, quicquid oculis primum offertur arripit.

Interrogo te Nicolae, quoniam Dioscoride autore Adarca, siue Salstaginis, siue spumæ cuiusdam species est, nonne & eodem Adarcæ nomine Harundinis genus esse potest? Non credo inquires: quoniam trium uiri isti mei de una tantum Adarca loquuti sunt. At si Plinius & Harundinem, & spumam esse dixisset Adarcam, num putares homini credendum & eruditissimo? Quid hæres? quid subsistis? Agnosce tandem quæso tuam istam in euoluendo PLINIO, librandisque scriptis indiligentiam: qui nec A D A R C A E uocabulum latinum putes: cum Adarcen pronuncies. Audi Plinium plus aliquid de Adarca, quam Dioscorides fuisse illi

C adseclæ differentem. Est & in Italia (i. s. uolumine inquit) nascens Adarca nomine palustris: ex cortice tantū sub ipsa coma utilissima dentibus, qm̄ uis eadē est quæ Sinapi. Tum .xv. uolumine de eadē Harundine uerba faciens, Sinapis inquit naturā, eisdemq; effectus habere tradit Adarca inter syluas tacta, cortice plenior sub ipsa coma nascens. At. i. s. primi & trigēsimi uoluminis capite, Inter aquantia inquit dici debet: & Calamochnus latine Adarca appellata: nascit circa Harundines tenuis spuma atq; dulcis & marinæ, ubi semē miscet: uim habet clarā: ideo apocis addit contra perfricōnū uitia. Tollit & mulierū lentigines in facie. An Diosco. Adarcam ignorasse Plinius tibi uideatur? quam ideo latine Adarcam dictam non inrudite fortasse quis putet, quod ei harundinum generi facillime hæreat, quod Adarca appellatur: Inciuile quiddam agis Nicolae (uel Iulio Cæso autore) qui nec tota quidē perspecta lege audeas iudicare. Qui de cimum sextum Plinij librū legeras, primum & trigēsimum quoq; & totū legere debuisti. geminam enim Adarcam esse uel sine Dioscoride didicisses: Vnam scilicet quæ Harundo sit, quæ ex plenior cortice qui sub coma est Sinapis uim habeat, atq; utilissima dentibus sit. Alteram quæ Salsilago, spumaq; sit: & (quod nec Dioscorides quidem docuit) Calamochnus græce dicatur. Adarcam quoq; latinum nomen esse: neq; ideo non latinum nomen esse, quod a græco homine Dioscoride scriptum sit: cum Italicas appellationes græcum hominem scribere, et necessarium quandoq; sit, & nouum non sit. De summi ergo uiri Plinij in Adarca iudicio non ante iudicium ferre debuisti, quam de reipso, deq; tua in legendo Plinio diligentia cogitare.

¶ De RUBRICA LEMNIA.

De natiuis coloribus agens Plinius, Natiuam esse Sinopiden quæ Rubrica esset edocuit, optimamq; eam esse in Lemno insula. Tum tres Sinopidis species expressit: rubram, minus rubentem, medianq; r̄s & pictoriam pariter & medicum addens usum. Tum palmam lemniae dat ei quæ signata uenundatur, Sphragisq; ex eo cognominatur, atq; in medicina præclara habet. Hæc Plinius sua illa inimitabili breuitate percurrrens, ac ueluti rerum dicendarum multitudine pressus, reliquorum colorum genera rationeq; persequitur. Posterior Plinio Galenus medicus hoc agens (ut qui tantis occupatus non esset) longam exorsus fabulam, ut Lemnum insulam terræ Sphragidos gratia uenisse se diceret, Itinerarium conscribit, & Cœlefyriam, Palefunam, Cypriumq; quondam litratas, tum Thraciam, Thessalicamq; enarrat, & Myrinam Lemni ciuitatē ad occasum sitam, in cassum uenisse se. Sed propter naue nauclero tum quidem Lemno fuisse, Italiamq; perisse, Roma uero redeuntē peragrasse Macedoniam se, Philipposq; commemorat, & Thasum insulam primum, mox Lemnum appulisse: inde in Ephesium urbem ad Orientalem insulæ plagam positam uenisse, atq; inibi omnem terræ Lemniæ rationem didicisse. Hæc est Galeni tandem de Lemnia terra elegans historia. Hic Nicolaus noster frigidissima quædam suo more comminiscitur: quasi ideo errauerit Plinius, quia Galenum, qui tum forte nec materno quidem utero prodierat, non imitatus est: neq; aliud ex Nicolai tandem uerbis hoc in loco colligitur. Sed in quo errauit Plinius obsecro? An, quia non ut Galenus fabulatus est? Ast hunc Romanæ grauitatis hominem esse diximus, milibus rerum occupatum, nec potuisse tum quidem cum Galeno nauigare. Immo uero quinto & uigesimo uolumine cum de terræ generibus scripturus esset, Singula inquit, a græcis plurimis uoluminibus tractata sunt. Nos in hjs breuitatem sequemur utilem, nihil necessariū, aut naturale omittentes. An ideo errauit, quia non terram lemniam, sed Sinopida, uel Rubricam appellauit? At ea terra rubra est, & illam Vitruuius. 7. Rubricam nominauit. Tum Sinopiden ipsam, coloresq; natiuos omnes, & e terra nasci, & terræ esse genera, Plinius multo ante prædixerat. An quia lauandæ eius terræ, pastillorumq; conficiendorum rationem cum de ipsa ageret non (ut Galenus) edocuit? Sed. 7. & .30. uolumine breuius multo Galeno, aptiusq; descripsit. An quia Galeno terram Lemniam appellare illam uisum est, non Rubricam, Plinius uero solo Rubricæ nomine, uel Sinopidis usus est? Sed sicut de Galeni longe posterioris appellationibus Plinius diuinare non potuit, ita Galeni quoq; autoritate defenditur. Qui. 11. simplicium, de nominibus inquit, ut semper diximus, certare non oportet, sed de rerum ipsarum uiribus disciplinaq; tractare. Ceterum nun tres esse Sinopidis species dixit Plinius? Nun palmam Lemniæ dat quæ signata uenundatur? Nun eius medicinas aptissime docuit? atq; hæc omnia multo ante Galenum? Nun sine Galeno intelligere mortales uel ex hoc ipso Plinio potuissent, esse medicatum in Lemno coloris uel terræ, uel luti genus aliquod, quo & pictores uti possent, & quod remedijs efficaciter adhiberetur? Quid Plinio uel admirabilius, uel salubrius, Galenus, Dioscoridesq; de terra Lemnia retulerunt? Quinam tandem error Plinij? Quænam ista insolens Nicolai accusatio, eruditorum omnium uocibus scriptisq; ferienda? Plura in hoc dicturus non sum. Plinium lege, enarrationemq; Galeni, & calumniantem in his Leoniceum inuenies, Dioscoridemque mendacem: cui nec Galenus quoq; eius ante laudator, falsa dicenti pepercit.

Calamo-
chaus.

Adarca unde
dicta.

Adarca du-
plex.

Galenum ta-
xat.

D

A

Irisum enim se a peritis in Ephesia inquit, quod Caprinū sanguinem terræ Sphragidi misceri, ex Dioscor. lectione crediderit. Hæc est illa de qua ante loquuti sumus uanitas. Verte in Dioscoriden tuum tela Nicolae: qui in librorum suorum initio testatus est, non se illa quæ in his scribit ex aliorū uanis opinionibus didicisse, sed usū, experimentoq; uel concordī scriptorū narratōne comperta habuisse. Vbi ergo caprinum sanguinē, lemnæ terræ misceri Dioscorides uidit? Irrisere Lemni Galenum, Dioscor. autoritate de caprino sanguine interrogantem. Quamq; ut hoc quoq; obiter notemus, non recte in Coriandro loquutum Dioscoriden, septimo simplicium Galenus arguit: ne semel tantum aberrasse Dioscoriden putes.

Non hæc Plinio Nicolae legisti, qui parce, modesteq; de seipso prædicans: quæ uana, supra q; fidē sunt, obiter uel notat, uel rēcit, uel in his autorū fidē appellat: tū audita ab se, tum lecta, tum uisa diligenter ac summa cum fidē distinguit. Quæ dubia scriptorū uarietas facit, ea legentium iudicio examinanda relinquit: ab se uero ignorata generose faretur: ut plane intelligere possis, Plinium Romanum hominem grauissimum scriptorem, naturæ, & aris miracula referentem, solo Dioscoridis, & quandoq; etiā errantis iudicio, multoq; minus tuo taxandum carpendumq; non esse.

De Cisso, Cistho, Lada.

Propter Cissum Cisthumq; orta est (ut ille inquit) tempestas ista: nec ulla fere est taberna, quæ Leoniceno isto, suo cum Dioscoride exultante, non Cissum, Cisthumq; personet: nullæ scholasticorum aures, quas sua cum Cistho Cissoq; non obruderit, atq; ad fastidium facietatem q; perduxerit: cui non satis fuit a Politiano nostro tum egregie defensus in his Plinium, tum se amice prudenterq; communitum, sed rursus (ut qui deterior si corrigis fiat) non modo prioribus calumnijs incubuit, sed in maiores quoq; ineptias incidit, & crimina in Plinium molitus est: edito etiā ab se libello, in quo non falsa modo, sed inscitæ & temeritatis plena cuncta congegit. Cuiusuis hominis esse errare (inquit Cicero) nullius nisi insipientis in errore perseverare. Leonicenus uero in errore illo suo, quem probe Politianus castigauerat, usq; adeo perstitit, ut illud dicere ausus sit: nesciuisse Plinium Cissum a Cistho distinguere: pluribusq; argumentis demonstraturum se pollicetur, quam in dictatis prius fecerit: tum libellum illum suum Plinij errorem titulo insigniuit. Nos igitur nihil Politiano aduersari, qui grauiter diseretq; (ut est Hercules robore) pro Cisso respondit & Cistho: leuiori (ut opinor) uia, & quæ patronum bonam causam tuentem debeat, de his in hunc modum uerba faciemus.

Iam illud primum omnium satis constat, Cissi, Cisthiq; differentias non ignorasse Plinium, qui, s. uolumine Cissi, idest, Hederæ uiginti genera luculentissime descripsit: quarto uero & uigesimo Cisthi duo tantum genera: & utroq; in loco, ita Cissum a Cistho discreuit, magnitudinē, folijs, flore, natura, ut nulla ipsas cognatione, præterquam nominis uicinitate teneri dixerit. Hæc quæ diximus, qui utriq; in locis Plinium leget, facile intelliget in hoc non errasse. Quod uero in marem, foeminamq; Cissum distinxerit: quoniam communis ea sit, primaq; inter syluestrium plantarum differentias, mas scilicet, & foemina (ut Plinius, & de historia plantarum primo Theophrastus affirmat) iam & hic palam est, nec in hoc quidem errasse Plinium: utq; obiter non uidisse Nicolaum Theophrasti libros intelligas, qui, s. uolumine Cissum quoq; in marem ac foeminam diuidit. Sed qua fronte Plinium negat, & Theophrastum? Floris quoq; differentias in Hederis, hoc est, Cisso Plinium posuisse, quis, nisi Leonicenus, uitio dabit? An quia flores Hederæ non habet? At Hederas florere passim uidemus: & plantarum primo Theophrastus scribit. An quia florem similem esse dixit syluestri rosæ? Ast huius florificæ differentia e re ipsa fidem sumere licet. Et eodem. s. uolumine Theophrastus non alijs magis plantæ utriusq; Hederæ flores similes esse dixit, quam syluestri rosæ, quamuis minores: & mari quoq; Hederæ florem ad purpuram inclinatum. Sed & syluestri rosæ similem esse Hederæ florem non incongrue dictum est: color albens, figura, lanugo, foliusculorum quoq; numerus conueniunt, magnitudo dispar: tum maris flos ad purpuram accedens. Sed tales esse flores Cistho Nicolaus asseuerat: atq; ideo deceptum in Cistho & Cisso Plinium clamitat. Imo uero contra. Nam (ut Politianus quoq; bellissime notauit) Hederæ flos concolor, utriq; enim albens, sed mari in purpuram uergens: Cistho uero discolor: mari siquidem rosaceus. Quod si nec Politiano quidem credendum Leonicen. putauit, arfuit Diosc. diligentius inspicere debuit: qui mari quidē Cistho mali punici florem (quo nullus rubentior) foeminæ uero albidū pinxit. Sed tam sine oculis, tam sine mente in Plin. ferit, ut nec Pliniū intellexisse, nec Diosc. aut Theophrastū, quidē legisse uideat. In tanta ergo uiginti generū Hederæ differentia, & duorū Cisthi tam graphice a Plinio descripta, in notissimæ plantæ, passimq; nascentis Hederæ flore, quis, nisi errans, errare Pliniū potuisse iudicabit: aut tanto autore Theophrasto desipuisse? Sed & in eo q; ideo errasse Plin. Leonic. affirmat, quod post Hederarū remedia. 4. & 10. 11. de Cistho loquens, dicat: Sub his nasci maxime Hy-

B

Cissi & Cisthi differentia.

C pocifthis: uidetur inquit Nicolaus credidisse Plinium sub Hederis quoq; Hypocifthisdem quodq; nasci. nihil nō aliqd inq; particula illa, maxime, significare uidetur. Vide obscuro quas minutias Leonicen. ut Plin. taxet, inquirat, qbus in reb. urgeat, qui se p salute hoim differere testatus est. Post Cissi remedia, græci inquit Plinius, uicino uocabulo Cisthum appellant, fruticem maiorem Thymo: folijs Ocimi. Sub his Cisthi generibus nascitur maxime Hypocifthis. Hic Nicolaus inquit, quia, maxime, dixit Plinius, sub Cissi quoq; generibus, de quibus paulo supra dixerat, innuit Hypocifthisdem nasci. Innuit (inquit) Plinius. Et quia innuit, errat. Hoc est unum accusationis caput. Audiant obscuro studiosi omnes. Audiant uere calumniantis hominis inscitiam, audiant iniquitatem. Nusquam Plinius nec medicorum, aut herbætorum quicquam sub Hederis nasci Hypocifthisdem dixit: ergo inuentem hoc, non dicentem Plinium damnabimus? Aut facta (Claudius Venoces iuriconsultus inquit) aut dicta, aut scripta, aut consilia legibus puniuntur. In Plinio nil horum, sed cogitationem, & nutum, immo nec ista quidem, sed quem Nicolaus opinatus est in Plinio conceptum ipsum animaduersione dignū quid cabimus? Vnde ista philosophæ quæ ex schola promuntur? Non inquit Plinius, sub Cistho maxime nascitur Hypocifthis: sed sic: Sub Cistho nascitur maxime Hypocifthis. Ita sincerus habet codex, non quem Leonicenus prauè legit. Atq; ideo ita intelligendus est locus ille, quæ maxime Hypocifthis dicitur, ea sub Cisthi generibus nascitur. Hoc transposita illa particula, maxime, scilicet infert. Necq; maxime præcedentia semper implicat, includitue (quod cum uulgo Leonicenus opinatur) sed id interdum designat, quod solum, tantum, duntaxatq; significant. Quasi maxime id sit, idq; fieri dicatur quod soli illi de quo dicitur competit. Sicut & maximū dicimus, quod uni soli tribuimus. Atq; hoc præsertim uerum est, si absurdum quidpiam, aut ambiguum, falsumue sequi necessarium esset: si per maxime particulam, quæ iam dicta essent includerentur. Sic eruditiores grammatici, iuriconsultiq; de maxime, ad uerbis disputare solent. Hoc est quod Plinius latine expressit: Sub his Cisthi generibus nascitur maxime Hypocifthis. Ne quis forte uel sub Cisso, hoc est, Hedera: uel sub Ladanifera Cistho nasci illam crederet, quam aliud esse Cisthi genus non ignorabat. Sed & alioquin absurdissimum prorsus sequeretur, si Hypocifthis nomen, quod quasi subcisthium sonat (ut. 6. & .20. scribit Plinius) alijs plantæ, quam huic Cistho conueniret: & quod nullus unquam scripsit, id Plinius tacite intelligi uoluisset.

D In eo quoq; prauè legit Leonicenus Plinium, dum inter Hederas mentionem de Cistho factam credidit: ex eo quod libro. 4. & .20. ita scriptum uideatur. Sub his Cisthi generibus nascitur maxime Hypocifthis quam inter herbas dicemus. Ita uerus habet codex memorabilis uiri Guarini Veronenfis castigatus manu, qui in Ferrariensis Cenobij quod ad Angelos uocant Bibliotheca seruatur: Leoniceus uero (quod impressi omnes habent codices) sic legit: quam inter hederas diximus: quod quidem mendum esse bisariam constat. Nam de Cistho inter hederas nusquam dixit: & de Hypocifthis inter herbas (ut pollicitus est) 6. & .20. libro scripsit. Tam & si locū hunc quoq; Politianus noster, quæ est ingenij præstantia, uere latineq; defendit: cum in fin. ad Leonicenum epistola interpungi oportere locum illum ostendit: ut scilicet post uerba illa: sub his nascitur maxime Hypocifthis: moram punctumq; adhibeat: tum sequentia uerba, scilicet, quam inter hederas diximus, non ad Hypocifthisdem, sed ad Cisson Erithanon que sequuntur, & de qua Erithrono inter hederas uere dixerat, referre oportere non insubuliter censuit. Si igitur uitiosi sunt qui nunc impressi circumferuntur libri, uetusti & manuscripti codicis & uiri sine ulla dubitatione doctissimi Guarini Veronenfis testimonio probe a nobis defensum est Plinius. Aut si nec uitiosi quidem sunt, Politiani ingenium non erudite minus quam eleganter ab omni Leoniceni calumnia Plinium uindicauit.

Vrget subinde Nicolaus Plinium inexpugnabili (ut ipse putat) argumento: quod pro Cistho Cissum nominis uicinitate decæptus accæperit: diu scilicet libro duodecimo Ladanum a pastu Hederæ barbis hircorum scripsit hærescere: quoniam non a Cisso, hoc est, Hedera, sed a Cistho & Lada id odoramenti genus legatur: pluribusq; ista quam satis sit uerbis exequitur, suosque illos (ut solet) unius uerbi triumuiros citat. Ego uero Dioscorides legens in primo de Cistho loquentem, & Galeni quoque simplicium pharmacorum septimum, utrumque animaduerti, ambabus de istis plantis, Cistho scilicet, quam & Cissaron, hoc est, minutam Hederam uocant, & Lada, quam etiam Cisthon simpliciter dicunt, uno prope contextu uerba facere. Quin & Galenum quoque post duas Cisthos, Cissum continuo subiecisse. Ipsum quoque Plinium quarto & uigesimo post Cissi remedia Cisthum subdidisse. Tum sexto & uigesimo post Ladani facultates, Ladaq; herbæ mentionem, de Hypocifthisdem uerba fecisse. Itaque uidentur hi omnes diuersas omnino plantas simul designasse, pariterque illas cognitione quadam similes tradidisse. Cogitatio subit, nulla magis ratione permotos, quam quod nomine, solo, ladaniferaque potestate (ut est clemens rosidumque insulæ Cypri coelum) uicinæ

Maximæ, particula significationem,

essent pariter quoque commemorasse. Quin & Dioscorides ipse, & ladaniferam Cisthum, & eam quæ Hypocisthiden ferat (quæ & Cissaros, & Cistharos quoque dicatur) eiusdem generis fecisse uidetur. Qua quidem ratione permotus Sipuntinus, qui Cornucopiæ scripsit, quem que Leoniceus iniquissime reprehendit, quosdam autem inter Hederæ genera Cisthum connumerasse: quippe quam Galenus & Plinius (ut diximus) cum Hederis scribant: & a Cistho unde Hypocisthis fiat, Ladam, seu Ladaniferam Cisthum diuersam faciant: tum Cistho Cissari (quod quasi Hederulam significat) Dioscorides & Galenus adficiant cognomen. Quam obrem non absurde fortasse quis credidit tribus illis plantis odorificum illud pingue insidere posse, quod caprinis uillis hæresceret: magis uero in Lada, unde & pingui nomen. Atque id eo forte duodecimo uolumine dixisse Plinium, Hederæ flore derofo, passibus marutinis cum est rorulenta Cypros, hærescere barbis hircorum Oesipum illud quod Ladanum dicitur. neque enim tam Ladæ herbæ succum illud esse crediderunt, quam cœlestem rorem herbis illis insidentem, quem tam Cissus quam Lada, Cisthusue excipere quoque possent.

A
Cornucopiæ
autor Sipun-
tinus.

Sed melius multo, certiusque defenditur Plinius, quando nec hanc quidem de Hedera opinionem firmans, ino ut apparet improbens, Esse alios inquit qui Ladam appellant herbam; cui pingue illud insideat: colligendique facticij Ladani rationem docet. Tum sexto & uigesimo uolumine nihil hæsitans, Ladam herbam in Cypro esse confirmat, ex qua Ladanum fiat: & Ladani uires enumerat: ut eum non aliud credidisse sit certum. In quo ergo errasse Plinium dicet: Cissum, id est, Hederam agnouit: Cissum a Cistho discreuit: Hypocisthiden unde fieret expressit: Ladam Cypriam herbam esse, ex qua Ladanum feret, non dubitauit. Quod autem Hederæ flore derofo deperderetur Ladanum, ex aliorum sententia, non sua prodidit: cum eodem loco bis repetat, recentiores hoc tradere: ne suam esse sententiam putaret quisquam, cum mox aliam, ueramque de Lada prolaturus esset. Vides, ut suis uiribus nixa ueritas seipsam probe defendat: ut ab errore Plinius synceriter loquens uindictur: Non oportet (inquit iurisconsultus Paulus) uerba captare, sed qua mente quid dicatur animaduertere. Sic & Aristoteles dicendi causam querere oportet, ait, & quò præterea modo se habet in credendo qui dicit: utrum humano, an ita ut asserat atque persistat. Cum ex tot plantis igitur Ladanum fieri in Arabia, & Nabathæis Plinius scripserit: tum recentiores tradere, quod Ladanum in Cypro fiat Hederæ flore derofo: tum alios esse, qui ex Lada herba, hancque tandem sententiam postremo constantissime teneat, quis nisi inhumanus, inexpectans, iniquus, erroris Plinium insimulabit: Quis, nisi parum pensitans Leoniceus, qui non errasse Plinium modo, sed et cum etiam in hoc fuisse imprudenter insinuat: Quis Sipuntinum (ut Nicolaus) accusabit: uirum bene de literaria republica meritum: cuius labores uniuersa iam legit Italia: quia quosdā numerasse inter Hederæ genera Cisthum scribit: quasi grande sit uitium, in tractandis rerum generibus plurimorum opiniones, sententiasque referre, neque id ipsum in omni disciplinarum genere diligentissimus quisque facitauerit. Ac non cuiusuis historię fides pariter & ratio iubeant, omnia quæ ubique tractantur, in legendum notionem adduci.

B

Sed ne quid telorum præterea relinquat, quod in Plinium si potest non congerat, hoc quoque argumento errasse Plinium molitur ostendere, quod erodi a capris Cypriam Hederam dixit. Sed uide obsecro (quod sæpe monuimus) ut calumniam suam Nicolaus in accusando Plinio prorsus penitusque denudet. Platonem legimus, in Oratoribus irridendis oratorem ipsum summum apparuisse. Contra Nicolaus in accusando Plinio, accusatione dignissimum ipse, tum indiligens, maliuolusque uisus est. Quo pacto inquit Cypriæ capræ Hederam rodere possunt: cum Cyprus ad Asiam pertineat: In Asia uero Hedera non nascitur. Atque ideo frustra ab Harpalo satam in Asia Hederam, ipse quoque Plinius refert: hoc Nicolai argumentum est. Dic obsecro Leonice, age atque amice responde. Cur tota ista tua accusatione, aut Plinii uerba non discutis, aut subites, aut inueris, aut iungis, aut mutilas: quod ex plerisque nostræ huius defensionibus capitibus uidere licet. In Medis scribit Plinius frustra seuisse Harpalum, non in Asia (ut tu Plinii uerborum peruerfor scribis) ergo non de ea quæ proprie Asia dicitur (quippe in qua Media non sit) intellexit Plinius, sed de ea quam tertiam totius habitati orbis partem dicimus, huic (ut opinor) Cyprum deputas. Nam ab ea quæ proprie Asia dicitur, longo distat intervallo. Nulli enim in provincie Cyprus adiacet, sed mari omni ex parte circumflua cum sit, & propriam ipsam provinciam geographi faciant. Pamphilię, & Cilicie ad aquilonem occasumque opponitur: ad meridiem atque orientem, Aegypto & Syrię. Tertia ergo orbis pars Hedera caret: Ita inquis. Sed nonne, ex India & Mero monte Liber pater, & Alexander coronati Hedera redierunt: Nonne in sacris literis legitur, factum in Assyria Ionæ prophetæ ex Hedera umbraculum: Et quod Tacitus Diurnaliū primo & uigesimo scribit: Iudeorum sacerdotes, qui cibis, tympanisque concinerent, Hedera uinciri solitos: ut intelligas, neque hoc perpetuo uerum esse, in Asia HEDERA non nasci: cum & India, & ASSYRIA, & I V-

Cypri situs.

C dæa illam ferant, quæ Asiaticæ quidem sunt provinciæ. Sed ad rem redeo. In Asia inquit Hædera non nascitur, Sitid aliqua ex parte uerum. Et Cyprus ad Asiam pertinet. Et hoc sit sane uerum. Sed hoc quoque uerum est Leonicene, quod parte superiore Syriæ itinere a mari quinque dierum Hedera non nasci incipit. Hæc est Theophrasti quarto de plantis sententia. Strabo quoque trans Euphratem non nasci Hederam scribit: cis Euphratem non negat. Syria ergo, & citra Syriam quæcunque sunt regiones (in quibus & Cyprus est) ferre Hederam possunt. Tolle ergo tua ista argumenta Leonicene, atque abi. Et quod collegisti de Plinio (ut dicis) iam abijce. Et hæc mecum, cumque ipsa ueritate colligere non pigeat. Sed prius quæ ipse collegisti, & quæ falsa esse docuimus, iam nunc aperiamus. Tua ista sunt uerba.

Possum ergo (inquis) sic colligere. Hedera apud Plinium diuiditur in marem, ac foeminam: utriusque flos similis Rosæ syluestri describitur. Eodem autore in insula Cypro Hedera flore deroso, Ladanum hircorum barbis adhærescit. Sub Hederis quoque Hypocisthiden nasci aliquando significatur. Hæc autem omnia à nullo autore, excepto Plinio de Hederis scribuntur: aut sensu ipso, siue experientia comprobantur. Hactenus tua uerba. Nos ex his quæ supra diximus, & quæ uera esse Plinium, Theophrastum, Dioscoridenque legentibus apparebunt, atque ex Plinii sententia sic colligimus.

Cissum, Cisthum, Ladam, diuersas esse plantas: Cissum marem, foeminamque esse, & flores Rosæ syluestri similes habere, Theophrastus quoque præter Plinium scripsit: sub sola Cistho Hypocisthiden nasci, & ex sola Lada Ladanum depecti. Et hæc quidem syncerus autor Plinius prodidit: Leonicenus uero, nec Theophrastum legit, nec Plinium intellexit.

DE GLASTO, ISATIDE

DE Radicula.

Mira est profecto Leoniceni huius nostri, boni alioquin uiri, indiligentia: qui non modo herbarum figuras, potestatesque non discernit, sed nec Plinii ipsius quem accusat, uerba considerat, synceramue orationem ut scripta est refert. Suopre uero iudicio fertur, & mendosos satis, uel impressorū uitio codices, sua ipse lectione mēdosiore facit, dum quod taxet inueniat: quod & in his quoque de quibus nunc agimus herbis, & tota obiter defensione facile cognoscemus.

D Glasto herba, quæ Plantagini similis sit, Britannorum foeminas corpora oblinire, Aethiopum colorem imitantes. 22. uolumine scribit Plinius. Nihil hic de uestibus agitur. Corpora inquit Plinius, non lanam, aut uestes: quod falso Nicolaus retulit. Hancidem autumat eam esse quam Isatiden Græci uocant. Hoc argumento, quod Isatiden Dioscorides qua lanarum infectores utantur, a Romanis Gluttam, uel Glastum dici scripserit. Hoc si quis neget, nihil habet Nicolaus quo sententiæ suæ ueritatem comprobet. Huius rei hoc afferimus argumentum: quod Glasti uocabulo non Romani utuntur, sed (autore Plinio) Galli. Duos præterea Dioscoridis græcos codices legimus, in nullo Gluttæ, Glastiue nomen sub Isatide scriptum est. Sed cum Isatidis duò scribat Dioscorides genera, unum quo infectores utantur, alterum quod medicinæ tantum uisibus sit efficax, quod agrestem Isatiden uocat: primum illud a Romanis Rhutam, uel Alutam: secundum Rhutam minorem, uel Alutam uocari asserit, illi similem quæ infectrix sit. Ex duobus enim codicibus alter Rhutam, alter Alutam habebat: quanquam nos Dioscoridis codices sic castigare recte posse uidemur, si non Gluttam, uel Glastum (quod de suo Nicolaus addidit) neque Rhutam, uel Alutam (quod nostri habent codices) sed Luteam, uel Luteum inferamus. Est enim Lutea (ut tertio & trigésimo Plinius) siue Luteum (ut primo Vitruuius scribit) herba qua non minus Chryfocollam ceruleumue infici, quàm linum, lanamque tingi prodiderunt. Vnde illam insectiuam quoque Vitruuius nuncupat. Hactenus ergo non Plinius, sed Leonicenus mihi errare uidetur: qui Plinium, Dioscoridemque uel perperam, uel falso retulit.

Lutea.
Luteum.

Lactucæ gene-
ra quatuor.

Quatuor præterea syluestris Lactucæ sunt genera uigésimo libro inquit Plinius, Caprina, Esopos, Isatis, Syluatica. Caprina necantur pisces, Esopos ulceribus medetur, Isatis uulneribus prodest, Syluatica infectores pariter, medicique utuntur. Quam hic obscuro admonitionem Nicolaus desiderat: Syluatica Lactuca tingi lanas, inquit Plinius, primo Isatidis genere DIOSCORIDES. Non negat PLINIVS Syluaticam illam suam græcam Isatiden esse. An græcis adeo additum Plinium esse oportet, tantumue illis tribuimus, ut nisi de græcorum sanctuarijs promantur, nec herbas quidem describere, nec Romanas appellationes afferre Romanus homo interdum possit? At designare inquit, debuit Plinius, hanc Syluaticam Glastum esse, eiq; Plantaginis folia adscribere: quod in Glasto. 22. libro facturus erat: quod in hac Isatide Dioscorides fecerat. Vnde ista obscuro admonitionis designationisque necessitas: Suas Isatides Dioscorides sponte nascentis Lactucæ genera non facit: cum eas uocabulo indiscretas scribit, Distinctius aliquando PLINIVS de his tradit, nam

& alteram, hoc est, eam quæ Dioscoridis secunda est, Isatiden uocat. Alteram, id est, Dioscoridis primam (quæ & ipsa Isatis a Græcis dici potest) Syluaticam nuncupat. Re conueniunt; appellationes, distinxit Plinius. Admonere potius Dioscorides debuit suas Isatides, syluestris Lactucæ esse genera, & distincta illis nomina tribuere. In quo ergo errasse arguitur Plinius, qui cum re a Dioscoride non dissideat, uberius tamen de re ipsa differuit: Syluaticam præterea, Glastumque non unam esse herbam putauit Plinius, ut admonitione opus esset, sed (ut apparet) diuerfas. Iam & hic non Plini, sed alter Leonici error ostenditur: qui Isatiden Glastum esse putat: Glastum uero nostri temporis Guadum. Vis hoc quod dicimus, manu (ut aiunt) tangere? Communia, inquit Plinius, sponte nascentibus Lactucis signa sunt: candor caulis, sæpe cubitalis, thyrsus & folijs scabricia. Tum propria Syluatice Lactucæ signa demonstret: Similis est inquit Lapathio syluestri folijs, nisi quod plura habet & nigriora. Glastum uero simile Plantagini esse dicit. Si ergo Syluaticam (siue Isatiden mauis dicere) Nicolaus putat Glastum esse, aperte fallitur. Glastum Plantagini simile est. At Plantagini nec caulis unus, nec cubitalis, nec candidus, nec scabrities folijs. Si Glastum ob id Syluaticum, siue Isatiden credidit, quod Guado, quo nostri temporis insectores utuntur, Glasti uocabulum simile sonum habere uideatur, nihil hoc absurdius. Guadum enim (ut est uidere) Plantagini simile non est: ut Glastum dicitur. Quippe Plantago ipsa uiridis, subatra, neruosa, folijs acutior: nec caule uno, nec candido, nec scabro: Guadum contra enerui folio, candicante, caule alto, & syluestri Lapathio, quam Rumicem uocamus, persimile: cuius folia Betæ candidæ similia tradit Plinius de Lapathi generibus decimo quinto uolumine scribens. Guadum præterea cyaneum colorem lanis reddit, Glastum uero atrum corporibus Plinio: ita ut Aethiopicum nigrorem referat, cæruleum Casari. At uulgus inquit Nicolaus, Guadum uocat, quod paucis mutatis literis facile e Glasto transit. An nescis Nicolae (ut Anneus quoque inquit) persimium esse ueritatis interpretem uulgus? Quod si à sono arguendum est, quo fœtulum quoque uasorum sinceritas exploratur, Guadum ex eo uulgus nuncupat, quod cyaneum (ut diximus) colorem lanis reddit: quasi Bladum dixeris. Eum enim colorem, qui primus candidis lanis a Guado inditur, uulgus Bladum uocat: uicinus uero multo est Guado Bladi cæ Glasti uocabulum. Quidnam igitur simile cum Glasto non habet Guadum? Non figura, non color, non nomen, non potestas. Quarto uero Lactucæ syluestris generi, hoc est, Syluatice, seu primæ Dioscoridis Isatidi: Guadi signa omnia prorsus conueniunt. Ergo ut Isatiden illam, siue Luteam, siue Luteum, Dioscoridis Pliniique Syluatice nostri temporis esse Guadum dicimus. Sic Glastum, nec Isatiden, nec Guadum esse credimus: uel certe Guadum ne sit, non sine ratione dubitemus: eam uero transalpinam herbam esse putamus, gallici nominis, Plantagini similem, atrum colorem referentem, qua barbari tingerentur, cuius Caesar, & Propertius inuenire, quo terribiliores hostibus uiderentur. In eo uero non conuenire Plinium, Dioscoridemque dicimus: quod Isatides duas, Dioscorides non esse Lactucæ sponte nascentis species dixit. Tum quæ Plinio tertia est Lactuca, non Isatiden in syluis nascentem, ut Plinius, sed agrestem Dioscorides nuncupauit. Postremo, quod insecticem illam Isatiden, quæ Plinio in syluestris Lactucæ generibus quarta est, Dioscorides etiam Isatiden similiter ut alteram uocat: & folijs Arnoglossio comparat (quæ & ipsa non simpliciter Plantago est, sed minor Plantaginis species, ut ex ipso nomine quinto & uigesimo Plinius indicat, folijs Rumici certe similior) Plinius uero syluestri Lapathio, hoc est, Rumici similem pingit: & Syluaticam nuncupat: ut quæ facultates diuerfas sortitæ essent, & nomine quoque differrent. Ita quanquam in his non paria tradere uideantur, re tamen ipsa, facultateque conueniunt: sed ita, ut plenus quidam & eruditus in Plinio uidere possis. Eos enim scriptores tum Aristoteles, tum iurisconsulti maxime probare uidentur, qui in enarrando ita describunt, ita partiuntur, ita dinumerant, ut omnes rei de qua agitur species & nomina facile dignoscantur. Sed ne quid sciens præteream, quod rei de qua agimus lucem aliquam afferre possit, quando in Luteæ herbæ & Guadi mentionem incidimus, scio herbam esse qua bombycina & quæserica dicuntur insciant. Ea in Bononiensi satua plurima nascitur, caule singulari, cubitali, colore luteo, minimis ab radicibus foliisculis: cuius semina ad Bliti ferme speciem totum caulem occupant: Gualdam insectores nuncupant. Estiment uolentes, an hanc Luteam illam, siue insectuam esse credendum sit: atque an Gualdæ uocabulum Guado uicinum admoneat, non esse a Glasto Guadum (quod Leonicienus opinatus est) ductum. His ingenia ad uestigandum excitamus, nihil decernimus: refelli, doceri, corrigi sine contumacia patiemur, quod hic in plenum, & tota defensione testamur.

Radicula uero quæ a nostris dicitur, eademque Lanaria, a Græcis uero Struthion, & uulgo Ostrutium nuncupatur, quid obsecro cum Glasto, Isatide, Syluatice commune habet, autore Plinio? Diuersissimæ prorsus herbæ, in quo conueniunt, ut sese ab illis explicandis

A

Glastum,
Guadum.Rumex,
syluestre
Lapathium.

B

Scriptores
probat.

Gualda,

C bonus iste uir Leoniceus, uelut in stupa pullicinus hærens, sudare uideatur? Radicula aculeatus suffrutex est, ut in sexto quoque Theophrastus meminit, caule ferulaceo, languinoso, oleæ folijs, flore pulchro, inodoro: Struthion, id est, passerculus a Græcis dictus, non Isatis: (ut tu sincere Plinianæ lectionis euerfor addubitas Nicolae, & radice magna, quæ non lanam tingit, sed (ut quarto & uigesimo Plinius scribit) lanam tingentibus præparat, candorem, molliciemque afferens: atque adeo, uel lanas quæ remedijs quibusdam adhibentur, Radicula curari non oportere nono & uigesimo scribat Plinius: & oues quæ confusæ præparentur radice lanariæ lauari iubet Columella. Cuius quidem Radicis tam multæ atque eximie ad eo in medicina uires, adeo remedijs efficax potentia, ut aureum poculum a Medicis cognominata sit. Quid nam horum unquam Leonicene in Glasio, Isatide, Syluatica, in tuo Guadolegisti? Cur Plinium accusas? & tuo isto cum Pataino Antistite torqueris, Petro Barocio, quem ego eruditum hominem, sanctumque uirum esse audio. Tu tuis istis ambagibus, grauissimam illius inseris sententiam, quasi & ipse tecum de his ambigat. Si Plinianos codices, quos & tu mendosissimos fateris, non excutis, non comparas, non æstimas, si nec Plinium eleganter latine, uere, dilucideque loquentem intelligis, si te nomen uarietas implicat, si te rerum obruit multitudo, cur Plinium erroris insimulas? Tingt Glasium corpora, non uestes (tingit uestes, Dioscoride autore) Isatis tingit lanas, Lactuca Dioscoride autore Syluatica. Ille Plantaginis, Lactucæ, Arnoglossi, Lapathi speciem referunt. At Radicula lanam non tingit, nec corpora: acuminata est, oleæ & passerulorum (uide & nomen) faciem præbet. In his ergo, ubi ista quam deploras nominum rerumque confusio? Nun tibi omnia bellissime (ut uides) Plinius explicuit? Tu cur teipsum non explicas? Tu cur nullo iudicio Glasium tingere uestes ais, autore Plinio, quod nusquam scripsit? Cur Isatidem Glasium a Romanis uocari Dioscoride autore impudenter affirmas, quod nusquam prodidit? Cur in Radiculæ descriptione libro decimonono non Struthion, sed Isatidem posuisse Plinium addubitas, qui & alijs quoque in locis Struthion semper, Isatidem uero posuit nunquam? Cur nullo probabili argumento, sed uano quodam, uulgarique sono permotus, nostri temporis Guadam, Glasium esse contendis? Tua ista interpretandi legendique puerilitas, & scribendi in omnes ambitio, non Plinij candidissimi scriptoris diligentia, pariter & elegantia, in caliginem, confusionemque perducunt. Quod uero nobis (ut facis) & Serapionem, & Auicennam, & Pandeſtarum scriptorem obijcis, prauè (ut putas) de Isatide, & Radicula sentientes, De his nihil est quod respondeam: illi uiderint quos medicinarum artis scientiam profectos, in te ut arietent iam intentos paratosque uideo.

D Verum priusquam Plinianæ defensionis, quod reliquum est, absoluamus, uel hoc unum breui oratione perstringere placuit: ut intelligas quo iudicio, quam indigne Nicolaus noster uirum bene de se meritum, suo isto libello pulsauit, Pandeſtarum scilicet scriptorem, a quo tam multa de simplicibus medicamentis hausit: quemque ferunt Nicolaum ipsum in manibus semper habere confuisse: atque ex eo libro tanquam ex oraculo, de simplicibus medicamentis uerba facere. Is de Isatide (ut diximus) obscurissimè, ambiciosissimèque differens, post Auicennam, Serapionemque districtos, in autorem tandem Pandeſtarum inuehitur, scriptorem mendaciorum, ignarumque appellans. Tum quod nescierit, quid apud antiquos Catapotia sit, accusat. Pandeſtarum scriptorem bonum certe hominem, multa studiosissime collegisse uidemus, dedisseque operam, ut & ipse (si qua posset) posteris aliquando proderet. Non alicuium fortasse, sed nec sic quidem contemnendum: immouero (quod sæpe quoque usurpari conuenit) Aristotelico more, gratiam illi habendam censeo, quod uera multa cum scripserit, ueris etiam inueniendis uiam (uel perperam scribendo) monstrauit & docuit. Quantum uero ad Catapotia pertinet, in quo noster hic tantopere assurgit, sic dixerim. Non ignorauit Pandeſtarum autem quid Catapotia uerbum signaret. Nam & in C. literæ descriptione, Catapotia inquit, pillulæ sunt. Et post paucos uersus, in eo quo de Catapotia herba scribit capite, semina eius herbæ accipit, & sicut Catapotia mandati insinuat: quæ Dioscoridis quoque uerba uidentur, sic in Chamæleæ descriptione, ex Dioscoridis sententia trochiscos ex Chamælea & Absinthio fieri docet, ut Catapotia, pillulas certe designans, non herbam. Non enim ex Chamælea, Absinthio, & Catapotia (ut Nicolaus insinuat) sed ex Chamælea, & Absinthio ut Catapotia. Sic unius literæ mutatione: qui, ut, dixit, & dixisse a mordaci homine accusatur.

Vides iam apertam Leoniceni de utilissimo scriptore calumniam. Nesciuit (inquit Nicolaus) quid Catapotia esset Pandeſtarius: at ille in C. litera pillulas esse monstrauit. Catapotiam inquit herbam addit Absinthio & Chamæleæ: & hoc quoque falsum est. Nam ex Absinthio & Chamæleæ trochiscos fieri docet, ut Catapotia, id est, pillulas.

Et quoniam sæpe illum de sua ista Catapotia clamitantem, atque in medicos inuectum esse audiuius, hoc quoque his subnectere benigna interpretatione (ut hominem decet) uisum

Radicula, aureum poculum,

Pandeſtarij defensio.

Catapotia.

est. Non latuit nostri temporis medicos, catapotia pillulas significare: quippe quod Pandectarius ipse (ut diximus) & is quem Aggregatorem uocant, catapotia exponentes, pillulas dixerunt: sed quoniam in nulla pene herbarum frequentius, aut efficacius euenit, præterquam in huius genere: ut eius semina (quæ & Ricinos ab insecti specie appellant) pro catapotijs, hoc est, pillulis sumantur (quod Dioscoriden quoque, & cæteros tradidisse uidemus) ideo herbam ipsam catapotiarum semen ferentem (quam propria quoque appellatione nuncupant) singularem quadam demonstratione, et ob remedij præstantiam seminumque ipsius usum, ut Catapotia passim diceretur receperunt. Est autem Catapotia herba, quam uulgus per hæc tempora Cazzapuzolam, nunc Guardalhortum uocat. Proprium uero eius nomen Lathyrus est: cuius quarto uolumine Dioscorides, 7. uero, & 20. Plinius & uires & figuram scripserunt. Quod uero ut iam non catapotia, sed catapotia dicatur linguae usus increbuit, nequaquam mirandum. Cum, u, &, o, uocalium tanta cognatio sit, adeoque in uerbis polles magister usus, quod ut quondam uultis & uolitis, & uiuus & uiuos, & curuatus & coruatus, & publicum & publicum, & colpam & culpam, & Herculem & Hercoleum dixere prisca: ut est in ueteribus tum libris, tum epigrammatibus uidere: sic Catapotia pro Catapotia non incongrue, aut certe sine piaculari crimine enunciare possimus. Hæc pro Pandectarum autore bono certe homine, aduersus Leoniceni contumeliâ, quasi ex itinere respondisse sufficiat. Nunc ad Plinium reuertamur.

Lathyrus.

DE ECHIO, & ALCIBIO.

Eandem herbam esse Echium, & Alcibium Dioscoride & Nicandro autoribus Leonicenus putat. Quoniam uero utriusque seorsum Plinius mentionem facit, hoc quoque inter errores deputat. Is mihi errare uidetur, qui sciens, prudensque compertum se habere aliquid affirmat, atque in eo obstinatus hæret, cuius contrarium plures sapientioresque consueuerunt: in hac causa nemo, nisi peruersi iudicij errare Plinium diceret. Echij Plinius genera, faciem, uires, usumque describit: Alcibium quale esset, apud autores non reperisse se dicit, sed cuius herbe figuram non reperisse se dicit, eius uires quas reperit tradit: uel ex hoc intelligere omnes possunt, Plinium Dioscoridis libros non uidisse. Nam & Alcibium quale esset a Dioscoride (si modo illam posuit) didicisset. Nicandrum nobis uidere non contigit. Dioscorides certe non Alcibium, sed Alcibiadii, & Alcubiicum scribit Echion uocari. Si eadem herba est Echius & Alcibium, atque eadem utriusque potestas, atque idem usus, unam habes herbam duobus nominibus a Plinio descriptam: qui Alcibij qualitatē non reperisse se fateri maluit, quam impudenter aliquid affirmare: si diuersæ sunt herbe, nomen utriusque habes & uires. In quo ergo uel eruditorum aures, uel medicorum industria, uel ægotantium desiderium, uel uita offenditur? Quis errare consistentem hominem nisi errans Nicolaus iste contendit? Numen confessis aliquid patet, Ouidius inquit. Facetur in genere Cicero, se nescire quod nescit. Si ergo uerum fateri, si impudentem non esse, si non temere aliquid affirmare error est, errauit certe Plinius. Quam sint friuola, & nullius ponderis Leoniceni nostri inuenta, uidere iam licet: qui (ut opinor) nulla magis ratione adductus in hos sermones incidit, quam ut Nicandros nobis & Pamphilianos efferret: quasi ipse ideo magnus censendus sit medicus, aut Plinij censor, si speciosa nobis græcorum nomina, magno ore pronunciet.

Plinius Dioscor. nō legit.

DE CENTUNCULO.

Clematidis apud græcos genus primum, Italos Centunculum uocare scribit Plinius. At Dioscorides Gnaphalium græce dictam herbam a Romanis Centunculum uocari affirmat. Dioscoriden ueriora dixisse his argumentis Nicolaus insinuat. Primum quidem, quod identus effectus dysenterijs utiles Gnaphalio, & Centunculo a Dioscoride tribuuntur & Plinio. Deinde, quod in Clematidis speciebus describendis, nullam Dioscor. rostratis folijs pingit, ut Plinius. At nos uel uno uerbo questionem soluere facile posse uidemur. Plinius Clematiden Centunculum uocari ab Italis dixit: Dioscorides huic appellationi contrarium nihil scribit, sed Gnaphalium ab Romanis Centunculum dici tradit. Vtrumque uera dicere potuisse, absurdum non est. Nam quid prohibet, & Romanos Gnaphalium, & reliquam Italiam Clematiden cognominare potuisse Centunculum? Huic sententiæ fidem facit: quod Romanos non Centunculum modo, sed & Tucularem, & Albinam uocare Gnaphalium in tertio Dioscorides scribit. Plinius uero in sua Clematide, quoniam non de Gnaphalio, neque de Romanis, sed de Clematide, & de Italis loquebatur, ex his appellationibus nullam posuit. Leoniceni præterea argumenta quid habent roboris? quid dialecticum sapiunt? Nonne easdem uires ad dysenteriam efficaces, non Gnaphalio modo & Centunculo, sed & ipsi Dioscoridis Clematidi, tum innumeris pene herbis legitur? Neque satis infert syllogismus: Duæ herbe eosdem præstant effectus: ergo non duæ, sed una censei debent: tum quod Clematidis Centunculi figuram non pingat Dioscor. qualem Plinius, non ideo erroris conuincendus est Plinius. Neque enim probe claudit enthymema Nicolai, in describenda clematide. Signa quoque Dioscorides non commemorat, ponit Plinius: ergo et

Crac Plinius in demonstranda Clematide: Nam (quod in superioribus quoque diximus) mos ille Plinij, diligentiumque herbariorum esse videtur, quo faciliorem cognoscendis herbis vitam ostendant, ut similitudines afferant plures aptioresque. Centunculi, id est, primæ Clematidis folia inquit Plinius, rostrata sunt ad similitudinem capitij penularij, non capitij, ut prae Nicolaus scribit. Non tollit hæc descriptio Dioscoridis signa, sed auget. Non ideo Centunculus, qui ab Italici dicitur Clematidis primum genus non est, quia euidentiora signa Plinius quam Dioscorides attulit: Non video præterea, cur de Italica cuiusvis herbae appellatione, barbaro potius græcoe, quam Plinio ipsi in Italia nato & educato credendum sit. Cum præsertim (si uerum & cum uenit præfatione fateri uolumus) aberrasse plurimum Dioscoriden in romanis herbarum appellationibus nemo sanus negabit: quod multarum exemplo manifestum fieri potest, ut cum Parthenium a Romanis Solsequium uocari, Beticam uero Rosmarinum, Abrotanum quoque Ablyndium ponticum, Hedyosmon autem quæ Menta sit Nepetam, Melanthium uero quod Gith dicitur, Papauer nigrum appellari dixerit: cum apud Romanos diuersas esse tam herbas quam appellationes istas, non Plinius modo, sed & Celsus & Columella, & nostrorum temporum usus, & nomina in posteris seruata testantur: quare nihil est quod Dioscoriden, externum hominem, in latinis herbarum nominibus, Plinio fidiorem putemus. Nam cum Clematiden & Gnaphalium diuersas herbas Plinius probe cognouerit: quippe qui utriusque diuersa signa effectusque prodiderit: & non Gnaphalium, sed Clematidis genus primum Centunculum cognominasse Italos dixerit, quid aliud arbitrandum est, nisi aut Italicum hominem Italicas appellationes multo Dioscoride melius cognouisse: aut duas herbas Centunculi cognomen sic uocare potuisse: ut Parthenij quatuor, Ambrosiæ item quatuor, Helxines tres, Heraclij plurimæ cognominibus clauerunt.

Diuersas autem herbas esse & Centunculum, & Gnaphalium, uel hinc perspicuum est. Centunculus in aruis iacet: sic Dioscoridis Clematis, farnentis, pampinisue super terram longis (quod & ipsum indicat nomen) folijs uiuentibus, Lauri specie, sed breuioribus. Adijcit Plinius (quo manifestior herba fiat) ad similitudinem capitij penularum rostratis. Penula enim pluuiæ est tegumentum, ut in Hadriano Spartianus, & in Alexandro Lampridio testantur, cui a tergo Capidum aduersus hymbres futurum regmen adnectebatur. Quod non intellexit Nicolaus: qui capitij scribit, non capitij, nam penulæ nihil accedit quod caput dici possit, cuiusque ad exemplar effigij herba queat: Sed rostratum capitium accedit. Gnaphalium uero solum habet molle, breue, album, tomento simile. Tomentum enim molle illud linum, stipam, lanamue significat, quod etiamnum uulgo quoque tomentellum dicitur, quo in sulcendis, replendisque tum culciris, tum matris (quas nunc etiam mattarassas uocant) utimur. Atque ideo Gnaphalium dicta est herba ipsa, quod græco uocabulo gnaphalos, minuta illa lana sit, atque (ut ita dixerim) tonsura quæ in fullonica arte ex carduorum, aut forficum ductu trahitur atque excidit, quæ ad tomenticia quoque utebantur: ex eo & ipsa dicta, quod gnaphos carduus sit: Gnaphalium ergo herba ita cognominata est: quod breuitate, mollicieque gnaphalon, hoc est, tomento præferat. Atque ideo Plinius & Tomento simile, & pro tomento in usu esse dixit. Quare haud negauerim, potuisse Dioscoriden quæ ratione Gnaphalium interpretati sumus conijcere atque opinari, Gnaphalium etiam a Romanis Centunculum uocari: quod illo uelut tomento centones quoque in rustica supellestili ut mattæ concinnari possent. Sed non ideo errasse Plinium dicere æquum est, cum primam Clematiden homo Italus ab Italici Centunculum uocari dixit.

¶ De L A G I N E.

Possumus in hoc quoque accusatoris ingenium, iudicijque prauitatem damnare: quod liberiorum, impressorumque errores, quibus pleni sunt Pliniani codices, Plinio quoque adscribere non ueretur. Aut si id comprobari non posse uideat, uel in hoc taxet: quod Plinium frustra aliquid posuisse calumniatur, ut de Lagine quoque fabulatus est. Lagine ante omnia (quæ nisi græca impediat declinatio, a lacte gignendo nomen traxisse uideti potest) secunda Clematidis species est: non lagine, ut Nicolaus titubans legit. Frustra autem a Plinio eadem herba repetita non est (ut Nicolaus carpit) qui neque Plinij mirum in describendis plantis ordinem confyderat, neque quo pacto his idem repeti non modo possit, sed & debeat. Volumine. 22. Plinius, in quo de his agit qui inter aruensis olera, in usum quoque cibarium ueniunt, Laginem suo ordine commemorat, describitque eius etiam facultates quasdam, non omnes tamen aperit. At. 4. & 20. cum clematidis enumeraret species, ne quis Laginem secundum esse Clematidis genus dubitaret, Laginem illam uocari ab alijs dixit. Tum Lagines quoque uires uniuersas adiecit: ut intelligerent secundum Clematidis apud græcos genus Laginem quoque esse. Neque enim libro. 22. de Clematidis speciebus dicturus erat, sed de ea tantum Lagine quæ aruense olus, esculentumque

Taxat Diosc.

Penula.

D
Tomentum.
Tomentellum.
Gnaphalij-cymologia.

Lagine.

effert: ut eodem quoq; ordine, & capite de Scandice, Hellaphobosco, Sioq; dicebat. Ast ubi de Clematidis speciebus dicendum fuit (cum non omnis Clematis esculentum olus sit) quæ illa Clematis esset quæ Lagine diceretur edocuit: pariq; illam effectû scribere græcos notauit, & quas facultates in Laginẽ mentione omiserat addidit. Scio & laginem quoq; fuisse laginem, uolumine scriptam esse: sed uel aliud herbę genus, uel mendosum codicem putauerim: quando hanc de qua agimus Laginem, foliosos ramos habere, atq; humi adrepere ad Scamonię speciem scribant: illam uero unum tantum folium habere: quo sit ut diuersas prorsus herbas esse credamus.

Nec minus ineptam, superuacuatq; nominis in Lagine mutationẽ Helxines, & Eufines Nicolaus molitur. Nam dum, 4. & 20. secundam Clematideu Laginem ab alijs, Echitẽq; dici Plinius scribit, suspicari se inquit Nicolaus, ne codicis uitio lagine & echite, pro Helxine & Eufine positum sit, et sua quẽdam iam dudum trita de Helxine comminiscitur. Nos de his ad hunc modum dicendum putamus: Laginem pro Helxine non scripsit Plinius cum de triplici Helxine in superioribus dixerit: & de Lagine. 22. uolumine dixerit: Eufinem dicere non oportuit, quamuis enim Lagine (ut & uerum esse uidemus) Cissampeli, hoc est, Inuolucris speciem repræfenter, non ideo Eufines nomen quod Inuolucris proprium est Lagini tribuisset, sed e re ipsa quod longius serpendo feratur elegantissimo uocabulo Echiten uocari ab alijs illam scribit. Est autem Lagine quam pleriq; uulgo Corrigiolam dicunt (non eam tamen quę Polygonia sit) Plinios: eaq; in esculentis, & eo præsertim cibarij genere quod tortā dicimus utunt: mulieres quoq; in aqua & uino decoctam etiam nuxu lactis gratia sorbent. Neq; absurde tenue Scamoniũ quoq; dicta est, quod illi non absimilis uideatur: nisi quod minoribus longē folijs, leuioribusq; nec crassis uestitur. Quæ hic autem de Ligustro Nicolaus adiecit, ea sunt quidem & iam dudum a nobis decantata. Sed & Ligustrum ipsum Oliuastella uulgo dicitur. In eo tamen Leoniceus fallitur, quod Caprifolium uocari a quibusdam de caprarum pastu autumat, nam nec nomen, nec nominis ratio uera, illum enim seu fruticem, seu arbusculam dicas, capræ non attingunt. Caprifoliũ uero non Ligustrũ, sed Pixacanthus est, cuius quoq; nominis Syliardicus meminit.

Echites.

Lagine quæ sit.

DE ARCTIO, SIVE PERSONATA.

B

Vis & aliud uidere, indiligentis hominis argumentum de Personata. Plinius taxat, quod duplicem illam esse crediderit. Tamen ut id uerum esse comprobet, ne quid integri ad defensionẽ Plinio relinquat, nulla ratione Echion, pro Arctio, codicis uitio positũ dicit. Sed ne sic quoq; Plinium, aut seipsum intelligit: quod uerum esse mox agnoscis. Post Agarię descriptionem, Echion herbam. 25. uolumine continuo subiicit Plinius. Quæ quoniam capitula habeat, uiperis similia, ideo Echios, quasi uipera cognominatur. Duo huius genera, Pulegio similia, floribus coronata. Tertium lanugine spinosa, distinctum pingit. Addit præterea. Quidam Echion Personatam dicunt (non Arction, ut prauè inserere Nicolaus uoluit) quorum opinionem, quoniam longa foliorum & floris differentia improbarer, subiicit. Cuius scilicet Personatæ folio nullum est latius, grandes lappas ferentem. Ac si dicat. Tria Echij genera diximus Pulegio similia, cui parua sunt folia, & quæ floribus coronantur. Falluntur qui Echion dicunt esse Personatam, grandes lappas ferentem, cuius folio nullum est latius: quæ omnia a Pulegio similitudine maxime discrepant. Non intellexit in morsum præceptis Leoniceus Plinij uerba, illorum sententiam apposite improbantis, qui Echion Personatam esse dicebant. Nam ea parte, qua Plinius scripsit, Cuius folio nullum est latius: Leoniceus, cuius illud, ad Echion relatis: non ad Personatam, ut Plinius, & grammatica ratio postulabat. Neq; enim ideo duplicem Personatam esse credidit Plinius, quia quosdam Echion Personatam dicere, & ex aceto radicem dare scripsit. Nam hic de Personata non agebat, sed de Echio: de qua ut quæcunq; ab autoribus scripta compererat aperiret, ideo quosdam Echion dicere Personatam scripsit, & ex aceto dare potui. Non enim probe clauduit (quod sæpe diximus) Quidā dicunt, ergo Plinius credidit ac præsertim cum Echion triplicem pinxerit, & ex foliorum & floris differentia non esse Echion Personatam appetere senserit: atq; ideo post paucos uersus, non iam de Echio, sed de Personata notissima herbam speciatim uerba facit: eamq; Arction & Personatam Græca & Latina appellatio ne nuncupauit: neminemq; illam ignorare dixit: ut eos etiam uidelicet desingeret, qui supra Echion paruis folijs herbam Personatam latissimis constantem putauerunt. Bene ergo omnia quadrant. Sciatq; deinceps Nicolaus, hoc in loco bellissime significasse Plinium, atq; ita credidisse, aliud Echion esse Pulegio similem: aliud Personatam folijs maioribus cucurbitæ: quas uenam herbam esse quidam putauerunt.

Sed quoniã de Arctio sermo incidit, quando & pro Plinio & studiosis scribimus: ut hæc no

Citra legentes (quantulacumque illa sint) aliquid semper arripiant, quod in communem utilitatem conferre possint (quod tota defensione, quantum potuimus obiter curauimus, Leoniceus uero uitaui) hoc subnectere uisum est: quod Arction graeci duplicem esse tradiderunt. Vnam quidem, quae & Arcturion dicitur: cuius folia Phlomo (quam latine Verbascum dicimus) similia, crassiora tamen & rotundiora esse dixerunt: semen uero minuto Cymino simile: quod tam ipsum quam radix ischiadidis & dysuriam patientibus efficaciter daretur. Alterum, quam Arction, & Propositen, & Proposion, & Aparinem dixerunt: nos Personatam & Lappam. de qua agimus: ambas quarto Dioscorides pinxit, Plinius primam septimo & uigesimo: Alteram, quod diximus libro tradidit. Sed Aparines nomen a Dioscoride positum, non probauit: quando aliam esse a Personata Aparinem, & figurae & uirium diuersitate monstrauit.

¶ De C H A M A E D A P N E .

Quo plura in Plinium congerere Nicolaus nititur, eo se pluribus inscitiae notis commaculat: ut qui nec Plinii uerba, nec scribendi ordinem, nec rerum consyderet differentias. Itaque manifestas ineptias iam satis esse ridere quam refellere. Eidem plantae Plinium, hoc est, Chamædaphne diuersas descriptiones asserre, Leoniceus dicit. Sed quam diuersus sit ipse ab eo quem putabamus, ex hac ipsa Chamædaphne consyderemus. Plinius. 15. in describendis Lauri arboris generibus inquit. Est & Chamædaphne syluestris frutex: neque ultra de Chamædaphne uerba facit: neque illam pingit (ut Nicolaus prius arbitratus est) ex nomine uidelicet addubitans, ne herba esset, quam fruticem nominauit. Hic igitur uerborum Plinii textus puncto (,) signandus est. Tum pergit enumerando Plinius Lauri genera atque inquit. Et Alexandrina, quam aliqui Ideam, alij Hippoglotin, alij Daphnem uocant. Hanc uero Alexandrinam Daphnem pingit. Hecque illa est, quam Dioscorides quoque, ceterique describunt. At. 4. & 20. uoluminis. 14. capitulo cum fruticum, subfruticumque genera multa descripsisset. His subnectemus inquit, quae Graeci communicatione nomen in ambiguo fecere, an arbores essent. Tum proximo capite continuo de Chamædry, Chamædaphne, Chamglea, Chamglece, Chamcisso, ceterisque huiusmodi uerba facit. Atque inibi Chamædaphnem describit: quam uolumine. 15. tantum attigerat. Haec igitur ita se habent. Enumerat. 10. Plinius Lauri septem genera: tum tres Laurei fruticis species, Chamædaphnem, Alexandrinam, Daphnoiden: & Alexandrinam quidem, & Daphnoiden pingit: Chamædaphnem uero, quoniam inter illas relaturus erat quas nominum communicatio (ut ipse inquit) dubias fecerat, an arbores essent, an herbae. 4. & 20. libro pulchre descripsit: in quo de similibus herbis suo ordine loquebatur. Vides ut ob punctum (quod in iocis quoque dicitur) Leoniceus capitus est: Si inter duo ista nomina, Chamædaphnem, & Alexandrinam. 15. illi libro, morae aliquod, punctique interiecisset (quod uel ipsa grammaticae ratio per, & copulae interuentum postulabat) non in hos laqueos incidisset. Mirum subit boni huius uiri, & amici quidem Leoniceini naturam consyderant: quem si ambulantiem uideas, lentum magis & tardum, quam citatum uel celerem dicas: in accusando uero Plinio adeo praecipitem currere, ut in eo legendum, perconsensisque accusationis capitibus, moram omnem, tarditatemque oderit: non spiritum teneat, non animam, nihil interpungat, nullo puncto consistat. In hoc quoque sagacissimi ingenij uir Politianus, in ea quam de Cisso & Cistho ad hunc ipsum Leoniceum scripsit epistola, egregie notat, cum. 4. & 20. uolumine capite. 10. quia non interpunxit Nicolaus inter Hypocisthis, & quam inter herbas dicemus, parum sapere uisus est: maleque eo loco sensisse de Cistho: ita ob punctum, ut diximus, saepe conuincitur.

Punctorum
ratio & utili-
tas.

Chamæda-
phne duplex.

Sed ne Chamædaphnes nomen dubium aliquando legentibus ingerat, duas esse plantas scire oportet: quae Chamædaphne pariter nuncupentur. Hanc ipsam. s. de qua agimus, quae uulgo Laureola dicitur: & eam quae Vincaperuinea dicitur, coniugalibus coronis expetita: folijs quam Lauri longe minoribus: humi ad seipilli morem reptans: flore ceruleo, inodoro, rotundo, foliisculis quinq; sed continuus distincto.

¶ De O X Y M Y R S I N E .

De Oxymyr sine nihil est quod differamus. Nam cum frigida quaedam Leoniceus afferat, quibus coniungi posse (ut ipse putat) uideatur, Plinium de Oxymyr sine, Rusco, & agresti Myrto quandoque dubitasse: cum Plinio tandem conuenit. Vult (ut arbitror) Nicolaus ostendere, scire se, quod Oxymyr sine Bruscus esset, quem ueteres Ruscum dixerunt, auctore Plinio: quasi grande aliquid, ac secretius quiddam in herbaria prolaturus. Esti facultates suppetisset, Plinio quoque redarguisset, qui non ideo Oxymyr sinem non agnouit, quia plures de ea sententias recitauit. Sicut cum inueniri aliquos dixit, qui Acorum Oxymyr sinem radicem esse crediderunt. Sed inuenit tandem Nicolaus, Plinium a Castore suo, a quo tam multa, & hoc quoque didicisse, quod Oxymyr sine Bruscus esset, Atque ita nisi subuenisset Castor, interierat Plinius. Vide

quàm sint ocioſæ hominis huius commentationes.

¶ De AER A, & L O L I O.

Qui de herbis dicturus eſt, eum ego non tam librorum quam telluris, non tam literarū quā agrorum ſtudioſum eſſe oportere cenſeo. Nec ſatis eſſe ad herbariam perdiſcendam tradendamq; herbarios ſcriptores legere, plantarum uidere picturas, græca uocabularia inſpicere, magiſtri unius uerbis additum eſſe, ſed ruſticos, montanoſq; homines interrogare oportet: herbas ipſas inſpicere, ueſtigare differentias, & ſi fieri poteſt periculum facere, experiri: rimari quid una quæq; in morbis poſſit. Cum hæc uidentia ſunt, tum uero illud eſt hominis eruditi, grauis atq; prudentis, cum de magnis uiris iudicaturus eſt, diligenter eorum uerba perlegere, librare, excutere, ſibiq; ipſi perſuadere, nihil fruſtra, nihil temere a tantis uiris dictum eſſe. Tum uel benigna interpretatione, uel conſtanti iudicio quæ ſcripta ſunt tueri. At ſi id quoq; fieri nequit, & ſuadente ueritate contradicendū omnino ſit, tum (quod in Empedocle deſyderat Ariſtoſteles) ualidiſſimis ea rationibus, argumentis, demonſtrationibusq; conſellere. Hæc cum in ſuperioribus in Leoniceno noſtro ſemper deſyderauerimus, in quibus certas calumniæ notas contraxit, in his præſertim Lolio ſcilicet & Avena de quibus nunc agimus, mirū in modū erraſſe uiſus eſt.

Aera & Lolium Leonicenus inquit idem ſunt: Avena quoq; & Aegilops, idem. Mirari ſe ait, cum ſint eadem, Plinium illa pro diuerſis accepiſſe: aut græcis cognominatſe uocabulis, cum latina ſuppediarent. Miror ego Nicolaum ipſum unus cum ſit, tam diuerſa a ueritate ſentire: & latinus homo cum ſit, græcis magis uocabulis quam latinis rebus inſiſtere. Ac primum quidem eſt, Aera & Lolium idem ſunt: ſi Avena & Aegilops idem, non uideo, cur mirabundus adeo toto iſto ſuo libello Leonicenus errori tribuit. Si Plinius eandem herbam nunc latina, nunc græca denominatione commemorat, quod non Plinius modo toto opere, atq; in mentione piſcium præcipue, ſed quicunq; litteris aliquid mandauere, factitarunt. Nam ſi error eſt, utraq; linguam noſſe: et error eſt, eandem herbam utraq; lingua deſcribere. Sed nos ideo diuerſis appellationibus cognominatſe illas Plinium dicimus, quia quamquam unius ſint generis, diuerſæ tamen & figura & poteſtate ſunt & natura: in his primum Plinij autoritas, tum ratio, proxime res ipſa argumento nobis erunt. Sic igitur ordiemur ut rem ipſam lucidius explicemus.

Frugibus, ſiue ea legumina, ſiue frumenta ſint, quicquid noxiū eſſe ſolet, diuerſis nominibus a Plinio, Columellaq; tum accuratiſſimis quibuſq; ſcriptoribus appellatur. Nam quod cœlo prouenit noxiū, id nunc malum, nunc iniuriam uocat Plinius: ut hymbres, nebulas, uentos, grandinem, robiginem, uolucres. Quæ uero a terra afferuntur damna, nunc frugum peſtes uocant: in quibus uligo, amaror, caries: tum eruca, culex, limax, talpa, phalangus, atq; huiusmodi beſtiolæ continentur. Nunc morbos appellant, ut Lolium, Tribulum, Lappam, Aeram, Aegilopen, Pelecium, atq; eiſmodi cætera. Quæ uero uel ipſis ſeminibus accidunt, ita ut corrupta uel mutantur, uel degenerent, ſiue interiori ipſorum ſeminum cauſa, ſiue cœli terræq; intemperie, ea frugum uitia nuncupant. In hijs abortio, luxuries, uanitas, bromus, auena, urtica, ſiligoq; connumerantur. Hæc Plinius ingenioſiſſimus ſcriptor, ſua illa incredibili diligentia, miro ordine (ſi qui illum Leoniceno diligentiores inſpiciant) exequitur. De cœleſti iniuria, deq; terræ peſtibus nunc ſermo nobis eſt: de uitij, morbiſq; agimus frugum: ut intellegamus, non de uocabulis, ſed de rebus agi. Nec uerborum ſignificationes Plinium, ſed rerum naturas ſcribere: tantoq; grauius Leonicenum deliquiſſe, qui non res ipſas (ut Plinius) ſed gloſſas, uocabulariaq; ad Plinij accuſationem induxit. Morbus igitur propria ſignificatione (quantum ad rem pertinet) Sabino, Moſteſtinoq; autoribus, corpori aduenit, temperaliſq; eſt imbecillitas, & tolli remedijs poteſt: Vitium uero perpetuum impedimentum eſt, ut obiter iuriſconſultos etiam aſſeramus. Id noſter Plinius latinus homo, ad fruges quoq; (qua eſt elegantia) tranſtulit: ac Lolium Aeram, Aegilopen inter morbos deputat: auenam inter uitia: atq; ideo Lolio, Aeræ, Aegilopi (qui morbi ſunt) præſentia remedia ſarculum, & cineris cum ſemen iactatur curam remedio eſſe dicit. Quæ uero ipſi ſemini, aut radici inſunt mala (quoniam Vicia ſint) non præſenti, ſed præcedenti cura, neq; alia tolli poſſe inquit: atq; ideo medicari ſemina tam Virgilius, quam Columella & Plinius docuerunt: ne expectata ſeges uanis eludat auenis. Lolium igitur & Aeræ frugum quidem morbi ſunt, ſed diuerſæ herbæ ſub uno genere cum ſint, diuerſa quoq; ratione fruges lædunt. Nam Lolium recticaulis herba eſt, & Tritico ſimilima: nec completi, nec uincire illud poteſt: hoc tamen aſſert incommodi, quod terram occupat, exhauritq; & mixtum Tritico ſecerni oportet. Aera autem ipſa complexu necat. Quoniam uero Lolium noſſimū eſſet, nō pinxit illud Plinius: Aeræ uero quod ignotior noſtris eſſe uidereſ, deſcripſit. Quod minimū, ſ. ſemen (cuius fumo a balneis turba pellereſ) aculeato gigneret cortice, & complexu Triticū necaret, quod & reiſa quoq; maniſeſtū eſt, in quā degenerare Triticū, & Hordeū

Herbarij boni officium.

B
Noxia frugū uaria.

C posse (quod Theophrastus & Galenus scribunt) non negauerim, quippe quod Lolij species Aera quoq; sit. Sicut & illa etiam quam Lillirinam uulgo dicimus, quasi Lolliarinam; seu magis (ex Theophrasto) Linipirinam dixeris: quæ longiores quidem spicas, sed brevioribus ac densioribus ferat calamis; nec tuncis spicatum seminibus, sed in ramusculo alternatim dispositis. Lolium ergo triticeis pene folijs recto calamo nasci, nec complexu, uinculo uel ullo tritico adhaerescere, plus quam ut probari oporteat manifestum est: spicam uero hordeo similem; uerum angustiores, ac sine aristis profert; in qua exiguum quidem ut minutæ Aenæ, sed non ut Aera minimum semen, acuminato & obrotundo gerit tegmine; non recticaulis est, uerum impliat, circumnectiq; cum Triticum, tum Fabam, & complexu illo attrahit, nec atq;. Quis ergo Aeram & Lolium idem esse dicet: cum & grammatici quoq; scribant, Lolium græco uocabulo non Aeram, sed Zizaniam dici. Hieronymo quoq; in Marthi interpretatione dicente: Inter triticum & zizaniam, quod nos appellamus Lolium, quamdiu herba est, nec dum culmen uenit ad spicam, grandis similitudo est, et in discernendo aut nulla, aut difficilis distantia. Quid igitur Aera cum Lolio Zizaniæ (præter genus) commune? Age & hoc adiungamus, quod uulgo quoq; & in Cisalpinâ Gallia, & apud nos herba hæc (Aeram dico) si modo coniectura non fallimur (neq; enim decernentes, sed excitantes ac disceptantes dicimus) Veludula dicitur: quasi uolutula: quod Tritici scilicet, Fabæq; caulibus aduoluatur. Quod uero uertigines illa quoq; in pane si comedatur faciat (quod malū Lolio tribuimus) non propterea Lolium ipsum erit: cum noxias uires duabus, pluribusue, & diuersissimis etiam herbis esse nihil prohibeat, atq; his præsertim quæ generis unitate conueniunt. Sed & eandem herbam Lolium, & Aeram esse, tamen si Lolium Aera quoq; a quibusdā dicat, nec Dioscor. nec Galeni autoritate conuincimur: cū Aera quidem uires ambo describant, figuram uero qualitatemq; neuter demonstrat.

¶ De Avena, & Aegilope.

D Par in Avena & Aegilope ratio. De Avena Plinius, Galenusq;, quod homini in cibatu quandoq; sit, quod iumentis in pabulo referunt, nos quoq; in Gallia passim uidemus equos, mulosq; Avena uesci: Aegilope uero, quæ syluestris Avena sit, quos unquam uidit uel iumenta uel homines uesci? Tum Avena tritici & hordei uitium est: quod quotiens, quauex causa fiat, duodeuigesimo uolumine docet Plinius, Aegilops uero (ut eodem loco Plinius) Hordei morbus est proprius, non uitium, & hordeo innascitur: quod quinto quoq; & uigesimo uolumine refert: Aegilops dicens eiusdem nominis herba sanari quæ in hordeo nascitur tritici folio. Quis præterea nescit (populo etiam teste) duo esse Aenæ genera: Frugiferum uuum: Sterile alterum: uel prodente Virgilio, qui bis steriles Auenas dominari cecinit, et uri campum Aenæ frugiferæ segete scripsit, Auenam quoq; satiuam esse, & propriam naturam habere. 1. de agricultura libro Columella demonstrat. Eius quippe factionem docet, & partim in foenum uel pabulum cedi, partim semini custodiri scribit, Dioscorides quoq; ille (quo uelut Aiæis clypeo tectus Nicolaus insultat) de Avena, Aegilopeq; seorsum tractans, diuersas illas esse indicauit. Nam Bromi quidem duas species. 2. uolumine cum referat, secundam a Romanis inquit Auenam uocari: tum. 4. uolumine Aegilopem quoq; a Romanis Auenam dici affirmat. Adde, quod Ambabus glutini, quibus semina integunt, eiusdem formæ figuræ cum sint capillamentis hærentes, non spicis, aenæ tamen frugiferæ densiores grauioreq; sunt: tum semina alba, gracilia, quasi minutum hordeum dixeris: Aegilopsis uero maiora, nigra, hirsuta, gemmis bifurcata cuspidibus: quam Auenam græcam uigesimo uolumine Plinius nuncupasse uidetur: cum Bromi similis herbe (quod & ipsum frugum uitium est) figuram, facultatemq; enarrat. Vis Aenæ & Aegilopsis insignes alias differentias referam? Aena ex his est, quæ maxime in frumentaceo genere nuda sunt semina; ut hordeum quoq;, & halica. Ast omnium seminum, maxime Aegilopen, natura operuit. Aena præterea cum Hordeo fere & seritur & metitur: Aegilops uero (quod mirere) non nisi post annum ex semine suo (Plinio autore) nascitur. Si hæc igitur & Dioscoridis, & Plinii scriptis & rationibus, & rei ipsius euidentia, diuersa esse monstrantur, quis Nicolaum Leonicenum non errasse, immouero non piaculariter deliquisse defendet, qui Plinii doctrinam, singularemque diligentiam taxare non sit ueritus: Nec Aenæ genera, nec Dioscoridis uerba, nec rei ipsius differentias proprietateq; perspexit. Quid uero de his uocabulorum interpretes referant, ipsi grammatici uiderint. Nos Plinio, prudentissimo naturalium rerum scriptori, tum rebus ipsis, atq; oculatis (ut aiunt) testibus, credamus.

¶ De Nardo gallica, & Saluica.

Sed nec in Saluica qdæ, & Nardo gallica felici, accusator noster Leonici, uersat, est, Plinio pri-

num imputare uidetur, quod Nardum Gallicam appellauerit, quam Dioscor. C. celticam nuncupauit. Nonne hominū uita ex hoc Plinij errore periclitatur: Gallica Nardū dixit Plinius, cum Celticam Dioscorides dixerit: quasi quos græci Celtas dicunt, nostri Gallos non appellant: aut non omnes Galli celtæ quondam dicti sint, aut Celtæ galli non sint, ad australem Cemeni mondis plagam, & Massiliæ, ac Narbonis pelagus habitantes, rupeſq; Alpiū attingentes. Latine denominauit herbam Plinius, Dioscorides græce: a prouincia Plinius, a prouinciæ parte Dioscorides: re nomineq; conueniunt, & cognomine quoq; non diffident. Dioscoriden præterea scribere Nicolaus inquit, quod Nardum hanc gallicam, quæ in Liguria alpiſus nascitur, incolæ Saliuncam appellant: unde errasse Plinium insinuat, quod pro diuersis Nardum gallicam, & Saliuncam acceperit.

Sed diuerſas esse Nardum Gallicam, & Saliuncam herbas, origo primum facit ut credamus: cum in Liguria alpiſus, uel ad Ligerim amnem, qui in Gallia est (ut ex græcis codicibus unus habet) Nardus nascatur Gallica: Saliunca uero in Pannonia, & Norico, & urbe Eporedia, Alpiūmq; apricis. Figura præximè, & herbarum ipsarum diuerſa descriptio, quod uel uno quoq; Plinij uerbo facile datur agnosci: qui Nardum gallicam (ut Dioscorides) fasciculis alligari inquit, & comitem illi adnasci Hirculum herbam. Saliuncam uero incomitatam, humilem (ut Virgilius inquit) & breuem, & quasi manu pressam esse: atq; ideo ad coronamenta non pertinere (quamquam nobilissimi odoris sit) quia necesse non possit: Tantæ uero soliditatis, ut metallum esse cøperit: etiam si mendose, non soliditatis (ut uetus habet lectio) sed suauitatis scriptum sit. Facultas terio itē herbarum diuerſitatem arguit. Quamuis etenim odoratæ sint ambae, uires tamen differentes utriq; Plinius tribuit. Nomen postremo herbarum ipsarum differentiam prorsus aperit: cum Nardus illa siue celtica, siue gallica cognominetur: Saliunca uero, & Orcitumyra (autore Seruio) uulgo dicta est, hodie quoq; romana spica dicitur. Sunt qui eam esse putent, quam officinæ Rosam sanctæ Mariæ nuncupent. Quorum opinionem, quando Plinij picturæ multa ex parte congruit, non improbamus, & omnino probare subſistimus. Cum ergo & origine, & figura, & facultate, & appellatione Nardus gallica, & Saliunca differant, nō errasse Plinium dicere, æquum est: Leoniceum uero iure damnandum esse, qui nec ista priusquam accusaret pensauit.

Hoc ex abundanti adijcere uisum est: quod Saliuncam a Nardo Gallica diuerſam, Dioscoridis autoritate Pandectarius facit: tantum uero abesse, ut Dioscoridis unam esse crediderit, ut illum inducat eos arguentem, qui Saliuncam Nardum Gallicam esse dixerunt. Hoc tamen in græcis codicibus dicentem Dioscoriden non coraperimus: nec Saliuncæ in Nardo celtica mentionem fecisse. Sic qui Dioscoriden (eum dico quem per hæc tempora medicillegunt) non tam latinum quam barbarum fecit, si modo ueritatis aliquid ineptus ille interpretes alsecutus est, Saliuncam & Nardum gallicam (ut diuerſa) seorsum scribentem Dioscoriden facit: nos Plinium diligentissimæ eruditionis hominem, rationemq; ut diximus, & rem ipsam complectimur.

De SIO, & SILAO.

Vana quoq; & inepta prorsus de Sio, & Silao disputatio. In erratis Plinij Leoniceus deputat: quod Sium, Silaumq; pro diuersis posuerit. Leonici uero rationes superioribus quidem non dissimiles sunt. Quoniam inquit, sine dubio Silat, & Sij descriptio ei herbæ quæ uulgo Crifion dicitur, competit. At si pro Silao Sion legendum sit, frustra duobus locis eadem herba repetita. Sed uide, ut diligenter inspexit, ut dialectice argumentatus est. Duæ sunt herbæ & Silaus & Sium: nec frustra seorsum posuæ, ut dicit. Silaus nascitur glareosis & perennibus riuus, cubitalis Apij similitudine: coquitur ut olus acidum, siue acedum. Acedarijs enim herba ipsa competit. Hæc Plinij de Silao descriptio. Sij uero hæc est, Sium latius Apio, in aqua nascentis, pinguius, nigrius, copiosum femine, sapore Nasturtij: crudum coctumq; sumitur. Hanc quoq; Plinius Lauorem interdum appellasse uidetur. Confer Leonice, si placet, utriusq; herbæ descriptiones, & tuo Crifioni compara. Silaus Apio similis, Sium latius Apio, pinguius, nigrius. Silaus glareosis, & perennibus riuus nascit: Siū in aqua quæ & non glareosa esse potest: ut lacustris, fontana, putealisq; est. Silaus cubitalis est: Siū humile, aque paululū quiddā supertrans. Silaus coquitur ut olus: Siū crudū, coctumq; sumit, ut Lauere quoq; Plinius docet. Silaus acidū olus est: Sio uero Nasturtij sapor. Vnde Nasturtiū aquaticū appellasse Siū recentiorū quodam inuenio. Sapor ergo, color, magnitudo, ususq; differunt. Quis tam diuerſas herbas unam esse dicet? Age, & uires, potestatemq; comparemus. Calculis, renibus, urinis, lienibus, mensibus, dysenterijs, lentigini, cuti, ramicibus, equorū scabiei Siū prodest: Silao nil horū: sed id solū tribuit Plinius qd magna utilitate uescicæ coquit. Si eadē herbæ erant, cur non eadē ambabus uires? Neq; enim ideo parem potestatem Silao dices, quod uescicæ utilis sit: Sium uero calculis

Nardus Gallica, & Saliunca diuerſæ herbæ.

B

Sium.
Silauum.

Curinisq; proficit: quæ malam uessicam maxime infestare uidentur: quoniã & uessicæ plures etiam morbi contingere possunt: ut collectio, ulcus, scabies: quibus efficax Silai remediũ esse potest. Sed nec putasse Plinium, eandem herbam esse Silaum quæ Sium, ex eo quoq; inspicere licet, quod eodem loco Plinius libro .f. 25. post Silai remedium ad tres fere uersus in calculi curatio-
ne, Reliquum inquit ex uino, tum Sio, & Vrica marina: & daucum, & plantaginis semen ex ui-
no. Neq; uerisimile cuiquam fuerit, eodem pene uersu, Silai, Sijq; (si una herba esset) ut diuersa-
rum mentionem a Plinio factam esse. In quo hoc quoq; est animaduertere (ut mirum Plinij or-
dinem consideres) quod ab nono quinti & uigesimali uoluminis capite, unde generatim, mem-
bratimq; de singulis corporum morbis remedia subtexere incipit, nullam, aut raram ex his her-
bam describens pingit Plinius, quas superioribus libris ante descripserat. Magnum argumen-
tum, Silaum, Sium non esse: cum eodem loco Silaum, nusquam alias adductam pingat: Sium
uero, quam. 22. pinxerat, nominasse eodem loco satis duxit. Hæc cum ita sint, quis uel accura-
rum Plinij lectorem, uel iustum accusatorem Leonicenum dicet, qui cum Silaum, & Sium ean-
dem herbam, & quam nunc Crisionem dicimus esse crediderit, hoc saltem ignorare non debu-
it: Crisionem breuem herbam humilemq; esse: ut iam Silaus esse non possit, quæ cubitalis est.

Sium.
Crision.
Lauerum.
Lauendo.

Silaum.

Cannasfoliũ.

Vis ut & re ipsius uidentiam in medium afferamus: ne non tam Leonicenum refellere, quam nostra legentibus prodesse (quantum per nos fieri potest) uoluissè cognoscas: Sium eam herbam esse satis constat, quam rogata Gallia Crisionem, Umbria Lauerum, Pientes Lauendonem uocant: uidentur enim hæc quoq; appellationes cum priscis Dioscoridis, Plinijq; uocabulis conuenire. Nam Sium, Lauerum dici Dioscorides scribit. Et Lauerem pro Sio usurpare Plinius uidetur. Crision uero, unius syllabæ detractiõne, facile transit in Sium. Ipse quoq; herbæ cum natura, tum bene olens sapor floris etiam, & seminis non iniucundus odor facile persuadent. Silaum uero herbam glareosis, & perennibus riuus nascentem, edulis gratam, quæ in Ariminensi uicinisq; Flaminia uia riuus, & in Hetruria plurima conspicitur, cubitalis, sæpeq; altior, Pisaurenses Cannasfolium uocant: Ex eo ut opinor dictam, quod caulem inanem Cannæ similem habeat, quasi Canasilaum dixeris. Nosq; illam aceto saleq; conditam, non in-
gram experti sumus, frequenterq; gustauimus. Atq; ut Sium, Silausq; diuersæ apud Plinium herbæ sunt, sic Crision Cannasfoliusq; apud omnes diuersi. Hactenus quantum in nobis fuit his respondimus, in quibus Plinius Leonicenus iniquissime damnat: quod scilicet easdem herbas, ob nominum uarietatem, putauerit esse diuersas.

¶ De C I N N A B A R I .

Cinnabarin, qua in pictura, medicamentisq; utimur, quamq; nostra tempora Sanguinem draconis appellant, Dioscorides Metallicum esse purat (Leoniceno auctore) atq; in Libya nasci: tametsi fodiendi, concinnandi q; metalli huius (quod in alijs fecerat) rationem, autoritatemque afferat nullam. Leonicenus, qui solius Dioscor. autoritatem, sine iudicio, sine defectu sequendam esse semper censet, ideo errasse Plinium arbitrat: quod Cinnabarin scripserit elephantorum, draconumq; sanguine permixto fieri: dum pugnantès pariter decumbunt, obtrituc; elephanti interit draco. Verum non errasse Plinium tum maxime omnes intelligent, cum de Cinnabari quæ dicuntur, singula quæq; descripsero: & nodos illos quibus intricatum Leoniceni libellum uides, explicauero, priusq; ad stipulantem Plinio Iulium Solinum adduxero, de Cinnabari in collectaneis ad hunc modum scribentem. Dum ruunt elephanti, dracones obruuntur: sic utrinq; fusus cruor, terram imbuat, sitq; pigmentum quicquid solis intinxerit, quod Cinnabarin uocant. Hæc Solinus. Nunc de Cinnabari quantum collegimus eloquatur.

Cinnabaris quidem nomen non latinum, aut græcum est, nec Libycum, sed Indicum, sanguinemq; elephanti & Draconis permixtum significat. ut. 3. & .30. uolumine auctor est Plinius. Barri quoque, barbaro nomine elephanti dicuntur. Victorem, barriq; canem, rabidiq; leonis, geographus uates inquit: & nigros barros Horatius memorat: unde fortasse & nomen ipsum Cinnabaris manare potuisse uidetur. Colorq; est floridus, sanguinem repræsentans, inter eos qui mixtura finguntur connumeratus, medicinae habilis & picturæ. Cinnabaris quoq; alia dicta in duo diuiditur genera. Vnum quidem metallicum, natuumq; quod in Libya, alijsq; in locis effoditur, Hemathiti lapidi colore similis: quemq; a coloris quoq; similitudine aliquos Sanguinem draconis nominasse Dioscorides scribit: & ab Indica Cinnabari nomen accepisse non absurde fortasse crediderim. Cinnabaris alterum genus metallicum quoq; est, sed facticiũ: ex uiuo. f. argento & sulphure. Cuius consiciendi ratione Bulcasis quidã arabs cognomẽto Seruitor tradidit, quo pictores per hæc tempora (Cenabariũ uocant) utunt. Minus qd græci Mil-ton uocant, metallicũ quidẽ origine est: Plinio, Diosc. q; auroribus, sed fingit, digeriturq; ut Minium esse possit, colorq; floridus. Cinnabaris ergo prima, propriaq; indica, draconisq; sanguis est, Plinio, Solinoq; auctorib. Altera quæ ab indica Cinnabari nomẽ traxisse per coloris similitu-

Cinnabaris
duplex.

Bulcasis.
Cenabrium.

dinem uidetur, Metallica est, in duo diuisa: Natium scilicet, cuius Dioscorides meminit: et Facticiam, quam Bulcasis docet, approbatq; picturæ Syluaticus quoq; & Arduinus Pisaurensis, qui de uenenis egregium illud uolumen scripsit quod nuper e tenebris erutum, cum Haliabaris uoluminibus impressum uenditur: duo Cinnabaris metallica esse genera (ut nos quoq; notauimus) prodiderunt. Sed & rarissimus pictor Ferrariensis Hercules, nostri Apelles temporis, ut diligens, natus Cinnabaris frustum, quod in Italiam rarum inuehi asseruit, nobis donauit, atq; apud nos fidem eorum quæ scribimus aliquando facturus seruat. Minium uero non Cinnabaribus a grecis, sed Milton proprio uocabulo dicitur, cuius Plinius, Dioscoridesq; meminere. Nam qui Minium, Cinnabarinq; siue natium, siue facticiam idem esse putauerunt, apertissime & pictorum sententia, et nominis diuersitate, & re ipsa falluntur. Potestatis uero differentia Leoniceus in primis fallitur: qui superuacue (ne inepte dixerim) commune facit, ne Cinnabar, quam Cenabrium pictores uocant, in medicamentis quæ deorantur ponant medicis: cum id non solum medicis, seplasiarij; fugiant, sed nusquam a medicinarum autoribus scriptum sit, metallicæ Cinnabaris genera fortilibus compositionibus, antidotis, catapotijsue misceant. Si quis autem e uetustissimis Cinnabarin forte compositionibus usquam posuit, de Indica, s. Cinnabari, hoc est, Draconis sanguine, cuius periculosus non sit usus, quamq; medicinarum & picturæ utilissimam Plinius prodidit, intellexerunt. Quatuor igitur hi colores representare omnes sanguinem uidentur, paulo tamen dilutiorem Minium; unde omnis cum scriptorum, tum medicorum error manasse uidetur, atq; in primis Leoniceum nostrum inuoluisse. Nam græcorum quidam Minium Cinnabarin uocauerunt, quos refellit Plinius: quidam Cinnabarin sanguinem Draconis esse dixerunt, quos Dioscorides, qui Cinnabarin Libycum metallum esse dicit. Nec propter ea sanguinem Draconem non esse in medicamentorum, uel colorum genere Dioscor. ait, quia quosdam a coloris similitudine Cinnabarin libycam nominasse sanguinem Draconis scribant. Non enim hoc agit Dioscorides (ut parum considerans Nicolaus arbitrat) sed eos refellit, qui Cinnabarin quæ in Libya nascitur, sanguinem Draconis appellabant. Aperte ex hoc insinuas, & sanguinem Draconis, & Minium aliam quidem rem esse, quam Cinnabarin libycam. Non ergo a Dioscoride dissentit Plinius cum diuersa tradant, sed cum Serapione potius, Auicenna, Constantinoq; negotium est, si sanguinem draconis opinari sunt herbæ esse succum. Id quoq; cum pigmenti, tum medicamenti genus, quod nunc uulgo sanguis Draconis dicitur, qd q; seplasiarij mercantur, & quo utuntur medicis, duo habet genera. Vnum quidem in massam redactum, panis ferme instar, grauiusculum, fabrilis rubricæ colorem æmulans: quo ueterinarij medicis ad malagmata, emplastraue utuntur, nec nisi appositijs medicaminibus adhibetur. Alterum genus leue, rubens, splendidum, minutis glebulis grummiq; confiat, ad coagulata sanguinis atq; atris speciem, pyxidibus asseruatur, longeque preciosius, & in antidotarium usum uenit. Hæc duo genera (si diligenter colorem, leuitatem, nitorem, tum harenularum mixturam, saporemq; consideres) mecum quodq; fatearis oportet, illam esse Plinij, Solinij; Cinnabarim: nec metallicum quicquam, nec herbaceum sapere, sed quod terræ hæret magis, ac propterea harenosum, minusq; purum est. Illud primum genus artificio purgari, atq; in eiusmodi pastillos digeri, minorisq; uenire: Hoc uero quod pyxidibus asseruari diximus (ut est sincerius) sole decoctum, ac duratum, Sanguinem dices, uim illam medicam floridamq; colorem suscepisse, atq; ideo originis quoq; nomen tenuisse. Neq; enim, autore Plinio, uenenum habet Draco, imo ipsi us adipem uenenata fugiunt: atq; ideo medicinarum non minus utilis quam picturæ perhibetur. Huius quoq; Cinnabaris indicæ argumentum non leue est, quod Cinnabaris indicum (ut diximus) nomen est, non græcum, aut libycum: tum quod in hæc quoq; tempora negociantes Veneti, sanguinem hunc Draconis dictum, non e Tunete, Libycisue urbibus ad Italiam deferunt, sed ab Aegypcia Alexandria, in quam urbem uelut orientis emporium Indica omnia, & rubri maris, atque Aethiopum mercimonia comportantur. Hunc in modum igitur (quantum ex librorum, reiq; ipsius diligenti uestigatione accepimus) ista se habent. Auicennam uero, ac reliquos qui sanguinem hunc Draconis esse herbæ succum putauerunt, refellere propositum non est: illi de his uiderint qui arabicam medicinam diligentius coluerunt. Nos ista pro Plinio (ut potuimus) respondimus: quemq; in illo literarum omnium, linguarumq; gymnasio, in illo cōmuni gentium olim atq; artium domicilio urbe Roma, non segniter, neq; ociose morantem, uirū alioquin diligentissimū, sed insigni loco & dignitate positū, nō Cinnabaris modo, ue rumetia rerū omnū quæ sine ulla exceptione scribit, certissimas in tanto mortaliū concursu notiones habuisse, uerissimilius multo est, quam quemuis græculum gentis suæ uoluminibus insudantem. Nem quod ad Leoniceum hunc pertinet, qui non minori (ut est uidere) arrogantia quam in superioribus imperitiis, quod a P L I N I O de Cinnabari dicitur, putare se dixit esse fabulosum, ut qui rerum usum nullum tam facile mirabundus habere uideatur, non uideo, cur Draconum, Elephantorumque permixtus sanguis, de quorum inimicitijs,

A
Arduinus de
uenenis.

Minium,
Milton.

B
Sanguinis
draconis duo
genera.

C pugnifq; non unus aut alter, sed omnes fere historici & naturalium rerum scriptores tradunt, in usum medicinarū uenire non possit. Quasi non difficilius, aut incredibilius multis Chrysocolam, Miniumq; hoc est, auri, argentiq; saniem ex intimis terrarum haurire uisceribus, quam sit sum pugnacissimorum animalium sanguinem ex summa telluris cute colligere: ac muricum, Purpurarumq; saniem maiori certe quam Cinnabaris impendio ac labore conquisitam uisceribus Romę opibus, & totius orbis luxurię suffecturam, insectorum quondam officinę non emerint. Et non Indus quoq; & felix Arabs odorata illa excrementa (quę Muscum uocant) fortissimie pardorum genere animalis, petrarum saxorumq; mucronatis derasa uerticibus, ad nos immensis precij etiamnum comparanda transmittant: ac non lapidem quendam medicinarū quoq; usibus efficacem Lyncum lotio in harenis gigni, atq; ob id Lyncurium dictum medicis crediderint: et humanorum cadauerum saniem, in ea quam Mumiam uocant, fastidienda etiam remedijs mixtione, uel fabulossima inuentione receperint.

¶ FINIS Collinutianę Responsionis.

¶ HEREMANNVS Comes a Neuenare,
Ioannis SCHOTTO. S.

Annotationes Herbarum quarundam Schotte chariss, quas ad te misi, nolim edendas, nisi equus lector prius præfatione quapiā sit admonitus, me ista annotasse anteq; mihi Leonicenus sit uisus, quem comperi in eodē argumento fuisse occupatum: cuius tamen sententię in omnibus non accedo, ueluti de Hypericone, & paucis alijs. Visus autē mihi antē multos annos in Italia Leonicen. & illius quædā opuscula: quas autē de Plinij erroribus, atq; in hoc genere scripsit adnotationes, nō uidi, nisi ante paucos menses, ex quadam impressione Basiliensi. Ne uero lector quispiam nasutor, me ob id furti accusandum putet, quasi qui alienis uigilijs, tanq; proprijs uti uidear, malim nostra illa suppressi, quam alicui ansam dare falso calumniandi nostram innocentiam. Missurus tamen sum Gerardū nostrum post festa isthęc Natalia, qui mentem meam latius tibi exponet. Ille etiam Horatianum nostrum secum adferet, in quo castigando adhuc laboramus. Vale, Colonia. 16. Decembris. Anno M. D. XXIX.

D erroribus, atq; in hoc genere scripsit adnotationes, nō uidi, nisi ante paucos menses, ex quadam impressione Basiliensi. Ne uero lector quispiam nasutor, me ob id furti accusandum putet, quasi qui alienis uigilijs, tanq; proprijs uti uidear, malim nostra illa suppressi, quam alicui ansam dare falso calumniandi nostram innocentiam. Missurus tamen sum Gerardū nostrum post festa isthęc Natalia, qui mentem meam latius tibi exponet. Ille etiam Horatianum nostrum secum adferet, in quo castigando adhuc laboramus. Vale, Colonia. 16. Decembris. Anno M. D. XXIX.



HEREMANNI Comitis a Nuenare Annotationes aliquot Herbarum.

¶ De Oxylapathio, Lapathio & Rumice,

VNA DESCRIPTIONE DIOSCORIDES tres species Lapathi confundit: licet alteram satiuam, alteram uero speciem syluestrem esse dicat. Quod autem Lapathon inter olera antiqui reposerunt, facit, ut ego id ipsum minime credam esse Lapathiū acutum, id quod hodie sic uocat, herba scilicet omnino insipida, sponte crescens ubiq; fere. Quare mea saltē sententia, Lapathon inter olera connumeratū aliqua est ex herbis quas hortenses & satiuas appellare solemus. Vnde illam coniectura nō ualde remota suspicamur esse eam, quam hodie Spinachiam appellant, magnam habentem cum Acetosa similitudinē, nisi qđ folia habet molliora, magisq; pallentia. Accedit huic sententię Serapion

Lapathium
acutum.

Lapathum
Spinachia.

in cap. de Spinachia, ubi illi tribuit mollire uentrem, id quod etiam La-
patho Dioscor. tribuit. Altera autem syluestris species, folio proxima
Plantagini, forte est, quæ Lapathium acutum hodie uocatur, Quod au-
tem Oxylapathon uocat Dioscorides, & ipsum acri gustu esse describit,
magis ad eam herbam pertinere existimo, quam uulgus medicorum ho-
die uocat Acetosam. Quod & Serapion Arabs in sua descriptione ani-
maduertit. Nam omnia quæ ex Dioscoride citat in capitulo de Acetosa,
illa a Dioscor. narrantur de Oxylapathio. Credo autem recentiores me-
dicos errasse in hoc, quod Lapathium acutum a foliorum acumine di-
ctum putauerint: cum illud a sapore potius dictum esse intelligere debu-
issent. Nam & acetum dicitur, unde recte Acetosam, sed rectius Lapa-
thium acetosum uocassent. Constat autem Acetosam inter condimenta
atq; olera quæ cruda comeduntur, etiam hodie in usu esse coquorū. Vn-
de a ueteribus Rumex dicta, etiam inter cibos numerabatur. Lapathium
autem illud acutum quo ad scabiem uruntur medici empirici, tam est in-
sipidum, & etiam palato ineptum, ut nemo unquam id ipsum culinæ de-
putauerit. Alia etiam erroris causa, uideri potest semen utriusq; her-
bæ: quod adeo simile est, ut nisi folia diligenter inspexeris, sæpe unum pro
altero sumere possis. Verum Galenus distinguit Lapathij species, esse a-
liam quidem insipidam, aliam acuti saporis. Vnde utramq; herbam sub
Lapathij nomine comprehendere possumus. Ego tamen quoties Oxy-
lapathon ab autoribus ponitur, siue Lapathium acutum, ipsam Aceto-
sam ponendum esse affirmo, manifesto errore medicorū prodito in her-
ba quæ Lapathium acutum dicitur. Præterea in capitulo apud Diosco-
ridem, omnia quæ de Oxylapathio medicamenta scribuntur, multo magis
Acetosæ conueniunt, quam Lapathio acuto: ideoq; etiam a Serapio-
ne ad Acetosam referuntur: uidelicet, quod coliciis, ac dysentericis pro-
fit ex uino pota: quod stomacho detrahat fastidia, nimirum propter sa-
poris acumen: quod istibus scorpionum medeatur. Quod autem Lapa-
thio acuto magis in scabie & pruritu empirici usi fuerint, errori potius tri-
buendum, quam experimento putauerim: quandoquidem Acetosa si
eodem modo præparetur, multo citius pruritus tollit, scabiemq; exiccat
& sanat: quod nos ipsi non semel experimento comprobauimus. Quod
etiam Dioscorides ait Oxylapathon locis palustribus frequentius nasci,
non parum confirmat nostram de Acetosa sententiam.

Oxylapathi-
um, Acetosa.

B

Acetosa con-
tra scabiem.

CICLAMINOS, CISSAMA

PELOS, Volubilis.

Nota quod Dioscorides sub nomine Ciclaminos, Cissamphyllon, uel
ut alij rectius legunt, Cissampelon ponit. Idq; eo factum est, quod mira-
sit huic herbæ cum Ciclamino in folijs congruentia. Verumtamen diuer-
sas esse species etiam Dioscorides testat. Porro Ciclamen uerum, id est,
Panis porcinus, omnibus nota herba, cuius radix in precio habetur pur-
gandis melancholicis humoribus. Altera autē species, uidelicet Cissam

Ciclamen.
Panis porcinus

C phyllon, siue Cissampelos, est Conuoluolum apud Plinium uocatum, a nostris Volubilis media, uulgo Cymbalaris, aut Campanella, Cissampelos a Leoniceno. Dicta est Hædera uitalis: eo quod uitibus adhæreat, quemadmodum Hædera reliquis arboribus. Vnde etiam uineatoribus inuisa est, eam quotannis extirpantibus. Notat Leonicenus apertum errorem Auicennæ, qui pro Hedera hac usus est herba, in capitulo Cissos, seu rectius Cissos, quod est Hædera.

POLYGONION, GRAMEN, CENTVMNODIA.

Deingrass.

Hæc herba uerum Gramen est, Centumnodia dicta, siue Proserpinata. Quare ubicunq; Graminis mentio habetur, non alia utendū est. Miræ efficacæ herba, cuius si uires recte calleremus, profecto una innumeris morbis satisfacere posset. Recentiores pro Gramine aliquando alijs usi fuerunt herbis quam ista, uerum errore periculoso. Vnde hoc loco id ipsum admonere uolui. Pictura in meo Apuleio tam uiua est, ut exprimi magis dextere non possit.

ANTHEMIS, CAMOMILON,

Parthenion, Camomilla.

Dioscorides in huius herbæ uocabulo aliquoties uariat. Nam & Anthemium, & Parthenion, Camomilon ait uocari. Vtrumq; scilicet flore albeni per ambitū, intus uero aureo colore, siue luteo. Quare secundam spēm Hermolaus putauit esse Matricariā. Sed falsus meo iudicio, ex similitudine floris quæ est Matricariæ cum Camomilo. Serapion priorē pro Camomilla spēm recipit, hoc est, Anthemida. Nam quæcūq; in capite de Camomilla ex Diosco. adfert, ea sunt apud Diosco. de Anthemide dicta. Vtūq; uero res habet, ambarum herbarum descriptio indicat, eas omnino esse unius speciei & qualitatis. Nam odore pomi spirare ipsas nomen iudicat Camomilon, hoc est, agreste pomum, flores in ambitu albos, intus aureos habentes. Quare siue Matricariam pro altera specie capiamus, hoc est, pro Parthenio, ut Hermolaus credit, siue aliam herbam quamcūq; similem Camomillæ, certe eas esse cōsimilis prope effectus necesse est. Crescit in segetibus uulgo herba adeo similis Camomille, ut frequenter etiam herbarios decipiat: cum folijs & floribus nihil penitus differre uideatur, odore tamen est detriore. Germani eam herbam, Caninam, siue florem Caninum uocant. Odor eius capiti obest, & si crebro utaris, phrenesim inducere creditur. Forte hanc putauit Dioscorides esse Parthenion, quando illam odore subuiroso esse ait. Crescit inter segetes, & iuxta semitas, intermixta fere semper Camomilo. Quod autem potam cum melle adinstar epithimi, pituitam, atq; bilem per interiora detrahere Dioscorides asserit Parthenion, ideoq; melancholicis & suspiriosis opitulari, indicat ipsam uim habere euacuatoriam, fortioremq; quam Camomilon. Quod ego facile cum ex odore, tum etiā gustu illius herbæ iudicauerim: quam Germani Cynobothanen, siue Cynanthemin uocant:

Alia species
Parthenij.

Grundtblum

hoc est quod antea dixi, Florem Caninum : quamquam eam in usu esse non uideam, quare nihil etiā ausus sum diffinire. Quantum uero attinet ad tres species Anthemidis a Dioscor. positas, quarum una albos, altera purpureos, tertia uero mellinos flores habeat, puto de illis herbis esse dictum, quas Frumentarias uulgo appellamus. Inter quas sunt, quæ flores habent purpureos. Quidam Melanthion esse arbitrantur: eo quod semen nigrum habeat. Sed Melanthion odoratius esse conspicitur. Verū locus subobscurus est, quare alijs coniecturam permitto.

ΒΥΡΗΘΑΛΜΟΝ, CΑΡΥΤ

ΜΟΝΑΧΙ, CΗΡΥΣΙΟΝ.

Han herbam ob similitudinem cum Anthemide, nisi quod flores sint paulo ampliores, similitudine oculū bouis referentes, unde nomen græcum sortita est, ego crediderim esse eam, quæ apud nostrates a quibuscūq; flos sancti Ioannis dicitur, ab alijs caput Monachi. Quidam etiam uernaculo idiomate florem Orbicularem, siue Annularem, propter rotunditatem qua oculo assimilatur, appellant. Intus flores lutei sunt, in ambitu albi, quemadmodum Anthemis, siue Parthenion, id est, Chamomilon. In campis & circa oppida (inquit Dioscorides) nascitur, apud nos frequentius in pratis & aggeribus prope riuulos. Herba ad uarios morbos efficax, quamquam raro ea utantur empirici nostri temporis. Valet ad tinea, & serpiginem corporis, tam pota ex uino, quā etiam illita foras. Apostemata etiam rumpit potui data, uel tanquam cataplasma superposita. Cum radice & floribus eam carpere utilissimum est. Est & alia Buphthalmion apud Dioscoridem, quæ etiam Chrysanthemon uocatur, ab aureis folijs, ab alijs Chrysiion, in segetibus passim crescens, floribus omnino aureis, & oculi figuram referentibus.

Kyngesblum.
alias S. 30
hans blum.

ΑΡΓΕΜΟΝΙΑ, & ΕΥΠΑΤΟΡΙΟΝ.

Nicolaus Leoniceus inter medicos Italię præstantissimus, libro de erroribus Plinij & Auicennę, manifestissimum medicorum Arabum & omnium recentiorum in herba Eupatorio errorem monstrauit. Nam herba, quam hodie medici Agrimoniam corrupte, pro Argemone, siue Argemonia uocant, ea uerum esse Eupatorium, ex Dioscoridis descriptione facile probari potest. Cum contra nemo nisi iudicio penitus carens, Eupatorium esse credere possit, quod pharnacopolæ hodie sic uocant, quod & Auicenna & Mesue describere. Nam pro Eupatorio quidam utuntur herba Ambrosiana uulgo dicta, alij uero quadā herba, quæ iuxta aquas frequens reperitur: quarum nulla flores habet luteos, neq; semen quod cum maturuerit uestibus inhereat prætereuntium, deinde nec serratim intersecta folia uelut Canabis: quę omnia in Agrimonia luce clarius uisuntur. Quamquā autē Diosc. Eupatorium quibuscūq; etiā uocari Epatitin scribat, quasi ad epar referendū sit τὸ ἐν πάτριον ἀπὸ τοῦ ἐν χυμῷ ἥπαρ. i. iecur: tamē ipsum ab inuēto Eupatore, quēadmodū Valerianā, Centaurēā, atq; alias eiusmodi dictam potius putauerim. Quare quisquis est medicorū qui posthac Eu-

Agrimonia.
uerum Eupa-
torium.

Cpatorio uti uelit, Agrimonia Eupatoriꝝ loco utatur confidenter. Quę autem sit Argemone, siue Arthemon, ut Dioscorides uocat, non est meum diffinire, de prima enim specie apud Dioscoridem nihil adhuc certi possum statuere. De altera uero opinor idem quod Leoniceus, esse eam, quam Argentaream recentiores, & Apium hemorrhoidarum uocant, a colore foliorum dicta fortassis *ἀργυρόν*, i. argentea.

¶ **BORRAGO, BUGLOSSA.**

Quę hodie Borrigo ab Empiricis, & tota neothericorum schola uocatur, uerum est Buglossum: ut interim admirari etiam cogar Hermolaum Barbarum, cur dubitauerit Borriginem inter Buglossi species connumerare. Nam & foliorum habitus, & flos, & tota uirtus Buglossi cum Borragine omnino conuenit. Verū id quod uulgo nunc appellant Buglossum, syluestre genus, & uirtute etiam multo inferius est illo, quod in hortis seritur. In meo exemplari Apulei reperio Buglosson tam graphice depictum, ea similitudine qua Borrigo passim uidetur, ut mihi propter uetustatem codicis, ea pictura sola satisfacere possit, si alia argumenta penitus deessent.

Apuleiana pictura.

¶ **SANGVINARIA, GALLI CRUS.**

Herba Sanguinaria de genere Graminis est, in Italia crebrior nascitur. Pueri naso summitatem imponentes, mox sanguinem profluere faciunt. **D**Ea Galli Crus a ueteribus dicta fuit. Quare errasse Hermolaus uidetur, qui Galli crus putat esse Cristam gallinaceam, similitudine quadam nominis falsus, cum crista gallinacia apud Dioscoridem manifeste sit species Verbenę, Sanguinaria uero Graminis.

¶ **CHAMÆPITYS, & HYPERICON.**

Leoniceus Chamæpityn eandem esse putat quam & Hypericon. Licet autem Dioscorides Hypericon a quibusdam etiam Chamæpityn uocari asserat, ac Rutam quoque syluestrem, tamen uti diuersas postea species describit singulatim: Hypericon enim Rutę folijs, alterum uero Semperuiuę, atque illā aureis, hanc uero albis floribus. Quare inesse differentiā ambabus aperte reperitur. Verū nostri temporis medici aliam somniauerunt Chamæpityn, herbulam passim in segetibus crescentē, odore nullo, flosculis subglaucis. Ego suaderem loco Chamæpitys Hypericon dari: idque multo magis uellē, quam herbā illam insipidā, nihilque omnino habentem cum Chamæpity comune. Cum Hypericon etiā a quibusdam Chamæpityn dictam Dioscor. attestetur. Porro quę a Diosco. Ruta syluestris uocatur, eadem est cum Hyperico. nam una oīno descriptio est utriusque.

¶ **ASPLENION, SIVE SCOLOPENDRION, & POLYPODION.**

Scolopendrion quę hodie a Medicis uocatur, non est ea quam Dioscor. & ueteres descripserunt. Nam ea neque pilosa, siue aspera folia habet, neque scolopendre serpenti assimulatur maculis. Vnde licet Dioscor. a Polypodio eam discreuisse uideatur, tamen quia & Polypodion etiam Sco-

lopendron dicitur uocari, uel unam esse herbam, uel certe non admodum natura ac specie diuersas. Quare malim medicos ea uti herba pro Scolopendrio, quæ Polypodium hodie uocatur, in faxis nascens, hirsuta, & maculis ueluti serpentis distincta. Verumtamen reperiunt alia huic admodum conformis, ut ego unam fere speciem ausim affirmare, tamen si altera paulo magis referat Filicem, uulgo dicta a multis Cytracis. inter has alterutram Scolopendriam esse putauerim: adeo omnia cum Dioscoride conueniunt. De Polypodio id animaduertit Nicolaus Leonicens

PENTAPHYLLON, & TORMENTILLA.
Vir acris ingenij Io. Mainardus Ferrariensis, errorem manifestum deprehendit neothericorum in herba Pentaphyllo, Nam quam hodie Pentaphyllon uocant, herba est frigide complexionis, ubique crescens, insipida penitus, & radices habens adeo tenues, ut uix appareant. Cum Pentaphyllon herba a Dioscoride descripta, quantum ex uirtutibus & efficacia illius deprehendi potest, natura acris & calida esse uideatur, habeatque radicem subrubram, oblongam, Veratro nigro crassiorem. Quod autem uenenis præcipue medetur, fecit, ut Mainardus putarit esse eam quam hodie Tormentillam uocant: quæ licet plerumque septem folijs constet, tamen multis etiam locis quinque foliorum reperitur. Ego huic opinioni facile accederem, nisi Dioscor. in descriptione subderet, eam habere flores in pallido candidos, quamquam Ruellius uerterit, in luteo pallidos, quod magis placet. Tormentilla autem plane luteos, id est, aureos habet flores. Deinde idem Dioscor. dicit eam habere radicem oblongam, crassiorem, quam Veratrum, digiti maioris crassitudine: Tormentilla uero radiculam habet raro articulum digiti maioris excedentem, crassitudine nunquam maior articulo digiti. Nisi fortasse regionibus calidis, ubi Dioscor. uixit, crassioribus radicibus nasci Tormentillam suspicandum sit. Quod autem Dioscor. scribit, Pentaphyllon a quibusdam Hermodactylon, i. Mercurij digitum uocari, nonnihil confirmare uidetur opinionem Mainardi. Nam & Tormentillæ radix abrupta est, & oblonga, ad instar articuli, siue digiti. Vtuncque tamen uidentur omnes effectus a Dioscor. attributi Pentaphyllo conuenire, cum illis quæ neotherici Tormentillæ tribuunt. Nam & ipsa uenenis medetur efficaciter. Dissenteriam radix curat. Constringendi uim habet. Unde etiam ad oris atque gulæ uitia accommodatur. In febribus etiam indifferenter ea utimur. Vulnera consolidat. Breuiter, omnia præstat, quæ in Pentaphyllo narrat Dioscor. Quare moneo Empiricos, ut frigidam illam herbam, Pentaphylli loco non ponant inter antidota. Nam illa reperiendi uim habet, unde intus sumi non debet: cum omnia illa nisi in acutissimis morbis ex caliditate, usui sint penitus interdicta.

VERBASCUM, ENULAM

PANA, TAPSVS BARBATVS.

Enulam Campanam Dioscorides Verbasum Ideam uocari ait. Est autem Verbasum de genere Phlomidum, Phlomidæ autem esse, ex descriptio-

A

B

Ruellius uersio
probatior.

Tormentillæ
uirtus.

C

ne eam herbam quam hodie Tapsum barbatū uocant, mea sententia fert. Indicat id flos luteus, folia cū caule hirsuta, sed mollia, Lychnitim a græcis uocatam: quod ad lucernarū usum esse uideatur. Vnde apud nos uulgo Candelaria, ab alijs uero propter molliciem tactus, Lanaria dicitur. Quidam hac herba pice parumper illita, pro lucerna utuntur nocturnis temporibus. Apuleius Verbasum pro Enula Campana posuisse uidetur, nam & folijs, & floribus Enula Campana cū Tapso barbato magnā habet similitudinem. Radix autem Enulæ Campanæ acrior, magisque efficax ad uaria incommoda pellenda. Vnde Apuleius eam a Mercurio Vlyxi ostensam dicit, cum ad Circen ille transiret, aduersus maleficia efficacem. Itē & ad podagras. Dioscorides addit, ad uenena. Orthopnoicis, ruptis, atq; conuulsis medetur. Quæ etiam Phlomidī apud eundem Dioscoridem tribuuntur. Vnde manifestum est, unius esse generis Verbasum, Enulam, & Phlomidem, i. Enulam Campanam, & Tapsum barbatum, licet specie sint distinctæ.

STRICHNOS, SOLATRUM, VESICARIA, ALCHEKENGO.

D

QVam Dioscorides Strichnon, alijs Solanum, recentiores uero Solatrum uocant, illius porro speciem quandam hortensem, siue satiuam Dioscor. facit. Reperitur & hodie oleris quædam species foliorum magnitudine ut Britannica, siue Beta, dispositione autem similis Solatro. Quæ autem syluestris est, in tres quoq; uel quatuor species discernitur. Vulgatius illud est, quod circa sepes crebrius nascitur, etiam in agris aliquando, corymbis uirentibus semper, & herbaceis. Repercutiendi uim habet, refrigerat ex caliditate apostemata, locaq; exulcerata. Altera illius species, quam ex ueteribus Vesicariam quidam uocitauere, corymbis in uesica reclusis atq; rubentibus; eam hodie Alkekengi Arabica uoce nominant pharmacopolæ. Tertia species a quibusdam Hypnoticon, ab alijs Manicon, i. soporiferum, i. infanum uocatur. Ipsum hodie uocant Solatrum mortiferum, corymbos habet in uesica nigros, magnitudine cerasij syluatici: quorum si unum quis comederit, longiore somno obruitur: si plures, moritur. Ad nil ualeat, præterquam ad somnifera & merito inter uenena numeratur.

NYMPHÆA, VNGULA CÆ

BALLINA aquatica, Nenufar.

NON dubium, quin apud Dioscor. & Apuleium Nymphæa eadem sit quam hodie Vngulam caballinam aquaticam, siue Arabicæ Nenufarum uocant recentiores, Duplici flore reperit, albo, atq; aureo. Idē Dioscor. etiam testatur. Frigida est. Vnde acutis & calidis morbis appropriatur. Floribus potissimum utimur. Radix omnino inutilis est. Quæ albos flores habet, ad remedia magis conuenit. Eadem uero utriq; foliorū amplitudo & habitus. Flos albē paulo laxior, magisque ad Rosæ similitudinem uergens; altera in modum Lilij aperitur. Quæ omnia ex Dioscor.

Candelaria.
Lanaria.
Wulfrut.

Vesicaria.

Solatrum
mortiferum.

quoque descriptione licet deprehendere.

¶ INTUBVS, ENDIVIA, CYCHOREA.

Intubum ueteres uocauerunt, quē barbari corrupte Endiuia uocant. Recte id notauit Hermolaus. Est autem herba inter præstantissimas numeranda quæ satiuā est, & inter olera habetur. Endiuia uocamus. Syluestris uero Cychorea, siue Intubum erraticū uocatur. Endiuia certe præstantior quantum ad medicinam attinet. Inter harum species Taraxicon, & Scariolam ponit Dioscorides. Nam quod præstantissimum est Intybi genus, Scariola uocatur, hodie medicis incognitum. Vidi apothecarios pro Scariola speciem quandam Lactuæ agrestis, maxime syluestrem, folijs nigrioribus, magisque crispantibus quam sit Lactuā agrestis, siue Leporina, carpere, magno scilicet errore: cum sint natura ualde dissimiles herbæ. Ego Endiuia comunem sumerem.

Scandystel/
uel Scandystel/
stel.

¶ PES LEPORIS, DENS LEONIS.

Lagopus apud Dioseor. non describitur ex folijs & floribus. In exemplari tamen peruetusto Apulei, herbā sub nomine Pedis leporini pictam reperi, ea certe similitudine, quæ nobis exprimeret herbam uulgo dentē Leonis appellatam. Idque etiam ex effectu uidetur non fore alienum a ueritate. Scribit enim Dioscor. Lagopoda uentrem contrahere, & discurre duricies apostematū: quæ ambo præstat & Dens Leonis. Est enim admodum amara & stiptica, daturque apostematibus in potu cum uino cocta. Vnde a quibusdam in uernacula nostra uocatur Apostematica herba. Febribus etiam medetur ex aqua decocta & bibita. Hermolaus uidetur putare Lagopoda esse eam, quæ Caryophyllata nunc dicitur, ab alijs Benedicta, quod mihi non arridet, cum nulla foliorum similitudo sit cum Pede leporino: neque id quod dicit cum maturuerit furfuribus assimilari in Caryophyllata conspicitur, uerum in Dente Leonis, cum flos exaruit, uelut in fauillam uertitur, atque unico uel flatu, uel contactu dispergitur furfurum more. Est etiā huic similis herba quæ Lactuā agrestis dicitur, licet folia habens latiora, tamen in eundem morem interfecta, flores etiam luteos, & cū maturuerunt lanuginosos, albentesque: eam Itali uocant Cassa lepore. i. leporis domū: quod ad nomen aliquantū quadrare uidetur.

Pfaffenfrut.

B

Herba Apostematica.

¶ CALLITRICHON, POLYTRICHON,

CHON, Capillus Veneris.

Dioscorides sub nomine Adianthon, describit herbam, quæ Capillus Veneris dicitur, ab alijs dicta Callitrichon: illius altera species est Polytrichon dicta: ambo in saxis humentibus & puteis crescunt. Polytrichon a quibusdam Saxifraga dicitur, folijs constans latioribus quam Callitrichon, & rotundis, fronde oblonga ad modum Polypodij, siue Scolopendrij, intersectis tamē & non coherentibus ut Polypodij. Magnus ergo error est neohericorū, qui Callitrichon, siue ut ipsi corrupte uocant, Gallitrichon, putant esse herbā quandā hortensem folijs apertis & odoratis, quæ uirus

Steynbred.

C etiam odore ipso prodit. Caupones cum ea uinum inficiunt. Capiti admodum nocet. Vulgus in uernacula nostra eam uocat Scharlacum. Erit igitur uerum Callitrichum, siue (ut barbari corrupte uocant) Gallitrichū, herba Adiantes, a recentioribus dicta Capillus Veneris.

Scharlach.

❧ LACTUCA AGRESTIS, EN

DIVIA SYLVESTRIS.

Lactuca agrestis.
Sew dyssel.

Parus error uideri potest, quod pro Lactuca agresti, Endiuia agrestem uocant medici recentiores. Intubum erraticum, siue agrestē ueteres Cichorium uocauere, herbam natura atq; dispositione longe diuersam a Lactuca agresti. Est autem Lactuca agrestis, quam Itali Domum leporis, Germani uero Carduum porcariū uocant, folio crispanti, adinstar eius quæ uulgo Dens Leonis dicitur: in extremitatibus acumina habet more Cardui, mollia tamen, quæq; non pungant, nisi admodum parum, cum induruerit scilicet. Est illius altera species nigrioribus folijs, magisq; aculeatis constans: hanc plæriq; Apothecarij putant esse Scariolam, magna uidelicet iuscitia obcæcati. Priorem Itali inter hortenses herbas receperunt, faciuntq; ex agresti domesticam. Seruit enim illorum mensæ, oleo, saleq; condita.

❧ NARCISSEUS.

Narcissus.

Narcissus a poetis olim celebrata, nostris temporibus in obliuionē prope uenit. Idq; incuria tam medicorum, quam etiam pharmacopolarū. Serapion tamen in sua descriptione uidetur intellexisse, quæ nam herba sit. Est autem Narcissus herba de genere bulborum, folijs Scyllæ, siue etiam **D** Porri, flore albo, insparso, purpureis maculis, aliquādo etiā toto candido, aliquando toto purpureo, odoris suauissimi. Vnde apud nos quidam appellant florem Caryophyllaton, licet Itali Caryophyllatum alium florem designent, quem nostri, Violettam uulgo uocitant, Appellantur & ab aliis quibus istius herbæ flores lingua nostra Phylliræ, uoce (ut opinor) a græcis mutuata. Habet passim in hortis diuitiū, ad coronas texendas idonea.

Niegeblumen.
Grassblümē.

❧ VICTORIOLA, PARITARIA.

Nulli dubium esse debet, quin Paritaria sit ea quæ a ueteribus aliquando Helxine, aliquando Victoriola, siue Victoriæ herba uocatur. Quam barbari ob id corrupte Vitriolum uocant, cum Victoriolam dicere deberent. Errorē Plinij notauit Leoniceus, confundentis τὴν ἑλξινὴν, καὶ νύκτον, cum & natura & dispositione plurimum inter se uariant. Esse autem Paritariā Helxinem, non modo Dioscoridis descriptio insinuat, uerum & Leoniceus uir acerrimi iudicij, & Hermolaus Barbarus deprehenderunt. Eadē quandoq; Perdicaria, siue Perdicia uocatur: eo quod gratus cibus perdicibus esse creditur: & Vreolaris, quod ad emundanda uasa ea uti solemus.

❧ ELATINA, HEDERA TERRESTRIS

Elatinā sub Helxine ponit Dioscorides, folijs nimirū Helxines, sed rotundiorib; & pilosis, &c. Vnde & ego hanc suspicor esse Hel-

deram terrestrem uulgo uocatam, herbulam odore acri, gustu adstrictio **A**
riam & calidam. Constat autem errare recentiores, qui Hederam terre-
strem putarunt esse Chamæcisson. i. Hederam syluestre: cum illam longi-
oribus folijs quam Hederam Dioscorides describat; ista uero multo bre-
uioribus, rotundioribusq; constet.

ISATIS, SCANDIX, ALUTA.

EGo certe quantū ex Diosc. descriptione cōiectura adsequi possum, Isat-
ris ea est, quam hodie Scandicem, licet falso uocant multi. Est autem, Dio-
scoride teste, Isatis herba qua tinctores utuntur ad uiridem colorem, Plan-
tagini foliorum dispositione similis: nisi quod folia habet magis crassa, & *Weyda*
succosa, colore etiam nigriora: semen in caule duorum cubitorum, flore
luteo, siue ceruleo, nigrū adinstar Gyth, gustu aspero, & cætera omnia,
quæ optime quadrant cum ea quam falso Scandicem uocarunt: Alutam
a Romanis dictam, Apulei liber testatur. Quædam exemplaria Diosco-
ridis Rutam (puto errore scriptorum) habent. Hermolaus quædam so-
mniare uidetur de Luta, siue Lutea, ut utrumq; exemplar erroris conuin-
ceret. Nostro tēpore hæc herba mercatoribus notissima est, qui inde quæ-
stum faciunt haud mediocrem. Contrita olet male. Sine ea uero nihil pos-
sunt proficere infectores lanarum.

HIPPURIS, CAUDA EQVINA.

Recentiorum pleriq; pro Hippuri Hippoquistida. i. Caudam equinā, **B**
alteram herbam quam describit Dioscorides sumpserunt. Verum a Dio-
scoride Hippuris, siue Equisetum tam graphice describitur, ut quilibet fa-
cile intelligere possit, quæ nam herba sit. Serapion false citat Dioscoridē.
Kossagel.
Vnde etiam recentiores aberrasse putauerim. Ait enim in petrosis nasci
eam, folijs rotundis, pilosis, &c. quæ omnia falsa sunt. Nam ut res habet
a Dioscoride describitur, iuxta aquas in locis humectis crescere, folio pro-
pe iunceo, scabro, geniculato. Pictura in Apuleio meo tam dextera est, ut
nihil supra. Ad æmulanda cristallina, ea hodie utuntur Itali.

ERINGION

SECACVL

Licet hodie in apothecis pharmacopolarum a nonnullis de genere Tri-
bulorum ea quæ Eringion uocatur in usu sit, tam en multos etiam reperi,
altero genere Cardui usos, plane spinoso, hirsuto, floribus purpureis, pau-
lo rubicundioribus. Quod genus Cardui licet ad multa incommoda cor-
poris ualeat, tamen longe diuersum ab Eringio esse dinoscitur. In hoc er-
rore Arnoldum de uilla noua fuisse comperio: quando Iringum compa-
rat moro spinoso. i. Rubo qui tamen nullam cum Eringio similitudinem
habet, uerum cum tribulis stipes eius aliquid congruentiæ habet. Eringio-
on apud nos uulgo crescit locis siccis, harenosis, sterilibus, iuxta fluminū
ripas ubi harena est, & in maritimis, aculeis duris, ac maxime pungenti-
bus. Radicem quoq; profundissime iacit, in terram uixq; reperies qui to-
tam radicē unquam effoderit. Hæc ipsa gustu tam suauis est, ut & Pasti *

C nacam non imitetur modo, sed uincat. Quidam lingua uernacula Herbā inquietam uocant: quod exarefacta, lenissimis flatibus aurg huc illuc, uo-
lucris rapiatur. Vnde puellæ suspensam loco coronæ habent sub tectis,
semper aliqua parte mobilem. Alij Tribulum marinum uocant: eo quod
frequentissima in lit toribus maris crescat. Vegetius in sua Mulomedici-
na, quam nuper in lucem prodire curauimus, graphice eam describit. De
reliquis Carduorum generibus mox aliquid dicemus.

CHAMÆLEON, CAR-

DVS, DRACONTION.

Chamæleon.

Apuleius ille in herba Dracontio ualde dissentit a Dioscoride, erratq;
proculdubio a uero. Nam propter uarietatem coloris quæ ex proprietate
uocabuli etiam tribuitur Dracontio, putat id ipsum esse Chamæleon-
tem. Nam Chamæleon animal est, quod omnes colores quibus appro-
pinquat imitatur ac recipit. Habet autem herba Dracontion, siue Aron,
quam Barbari nunc Barbam Aaron uocant, folia maculis subnigris ac
uarijs distincta, quemadmodum serpentes quos Dracontas græci appella-
lant. Vnde Dracontium eam uocauerunt, quidam Serpentariam, alijs Co-
lubrinam. Nota est radice albissima, & quæ manducata linguam guttur-
q; exulceret. est em̄ caustica & mordicatiua. Huic Apuleius tribuit nomē
Crocodillij, & Aphrodisis, siue ut ipse Dioscor. uocat *την ἀφροδίτης λούτρον*. i.
labrum Veneris, quæ omnia ad Dipfacum, siue Chameleonta pertinent.
Breuiter itaq; de Chamæleonte meam sententiam explicabo. Inter Car-
duos est, quæ albis, siue lacteis maculis inspargitur: folia habens sicut La-
ctuce pallentia: hunc Chameleontem album ob uarietatem dictum puto.
Vernacula nostra uocatus Carduus Marię. Semine utuntur Empirici no-
stri ad colicam, & iliacam. Pellit urinas uehementer. Est altera huic folio
non ualde dissimilis, nisi quod nigriora habet, inter uulgares Carduos re-
putata, flore uiolaceo: eam arbitror a nostris Germanis Carduum armen-
tarium, siue pecuarium dici: quod radice illius aliquando animalium sa-
luti succurritur.

Germanice
Marię dyffel.

Germanice
Dyß dyffel.

DIPSA CVS, VIRGA

PASTORIS.

Bard frandr.

De genere Carduorum etiam est Dipfacus, quam Serapion meo iudi-
cio recte intellexit esse eam, qua utuntur qui pannos præparant. Nam id
ipsum uidetur innuere tota Dioscoridis descriptio. Illius species est sylues-
tris, quæ Virga pastoris appellatur: una omnino herba, nisi quod hæc se-
ritur, illa sponte prouenit. Frigidam esse putant, uimque habere reper-
cutiendi.

SCOLYMOS, CAR-

DVS, Cardus benedictus.

Quam Scolymon uocat Dioscorides, hæc Hermolao uidetur esse ea
quam Itali Carzophilum, alijs Artizocam uocant, etiam nunc
in cibum recepta, immo inter delicias Italorum. Illa quæ feritur, & non

nisi culta prouenit, sapore est gravior: quæ uero agrestis habetur, minoribus capitellis, & folio breuiore, eam uocant recentiores Cardum benedictum. Tamen si ego uiderim, qui maluerint hortensi ista uti loco Cardibenedicti, quam agresti. Puto autem uim utriusque esse unam. Similitudine autem capitum, uidetur hoc meo iudicio rectius uocari posse Carduus pinea, quam Chamæleon. Nam ipsa capita Cardii magnam habent cum pomis Pini conformitatem. Sunt oblonga, uarijs interstitijs distincta, testudinibus ueluti conchiliorum extuberantibus, qualia in Pinis uidemus.

L I G V S T R V M, C Y

P R V S, Alchanna.

Recte meo iudicio Hermolaus annotauit, Ligustrum dici Arbutum, quod Arabes, & præsertim Serapion Alchannam, siue Henne uocauerunt, Græci uero Cypron. Apothecarij nescio quam exoticam herbam pro Alchanna exhibere solent. Verum uulgo eam crescere Vergilius testatur in Bucolicis, quando ait, Alba ligustra cadunt, uaccinia nigra leguntur. Itali Oliuellam a foliorum similitudine quam habet cum Oliua, Germani autem propter ligni soliditatem, eam Hartigliam nuncupant: flores albi figura racemorum, redolentes. Ulcera palati, gutturis, linguæ, ueretri mirifice per sanat succus illius, cum aqua rosacea, aut Arnoglosse mixtus, aut decocta folia cum uino.

A

Cardus benedictus.

Oliuella?

Hartiglin.
Beynholzlin.

B

¶ Eiusdem HEREMANNI Comitis a Neuenare, FORMVLA quædam excudendi Herbarij, quo pacto in explicandis Herbarum descriptionibus atque uiribus procedere (suo iudicio) oporteat.

¶ APIVM RISVS, Batrachium, Flammula, Ranunculus

¶ A P V L E I V S.

Nascitur locis humidis & aquosis. &c. usque in finem descriptionis cum nominibus prout in Apuleio habent. Nam in Dioscor. nomina adscripta non sunt. Vel aliter, iuxta uersionem Ruelij.

¶ DIOSCORIDES iuxta uersionem Hermolai.

Batrachion, id est, Ranunculus. Alij Selenon agrion, &c. usque in finem descriptionis.

¶ O R I B A S I V S

Si quid apud Oribasium de hac herba habetur, hoc loco reponatur.

¶ S E R A P I O N

Quamuis de hac herba Serapion in capitulo de Apio non faciat mentionem, atque ob id hoc loco citandus non ueniat, tamen in reliquis herbis suadeo eum post ueteres etiam citari.

C

N E O T H E R I C I .

Bachbun.

Flammula.

Qui scripsit Pandectas, atq; ante illum Symon Ianuensis, herbam Batrachium, siue Ranunculum sub nomine Apij risus, aut Flammule descripserunt. Nescio tamen, an recte descriptionem Dioscoridis intellexerint. Nam uidetur ideo putare hanc esse Ranunculum, q; in fluminibus nascatur, quodq; ranis familiaris sit: cum Dioscorides id ipsum Apium syluestre uocatum testetur. Nascitur autē in fluminibus & fontibus herba, folio prope Nasturtij fluuiialis, caustica & uehemens, in qua libenter Ranæ uersantur. Nescio an hanc Neotherici putauerint esse Batrachium. Flammula autem quam ipsi uocāt, nequaquam in fluminibus nascitur, sed pratis & hortis. Hermolaus Barbarus putauit eam esse Pedem coruinum. Verum meo iudicio deceptus. Nam Pes coruinus herba uulgarissima, neq; arrodit carnem, neq; risum illum comouet mortiferum. Quamquam mira foliorum similitudo huic cum Flammula intercedat. Est autem Flammula folijs strictioribus, paulum subnigricans: puto Ranunculum dici, ob uarietatem macularum, quæ nonnihil ad colorem ranarum accedere uidentur, earum scilicet, quæ maculatæ conspiciuntur, uiridi ac nigro, siue cineracio colore. Herba est satis nota empiricis: solent eam applicare apostematib; prope maturis loco caustici, uel phlobotomi. Nam mox apostema aperit. Putāt ex hac herba natum adagium de risu Sardonio. In Sardinia enim Dioscoride & Plinio autoribus, uenenata nasci traditur, risuq; comesta exanimat. Dicitur ergo non immerito Apium risus a recentioribus. Veteres etiam Apium syluestre & rusticū uocauerunt.

S E Q V A T V R N V N C E X G A

L E N O qualitas, siue complexio ipsius
herbæ: aut si Galenus non ponit, ex
aliquo Neothericorum.

Constantinus Apio tribuit tertium gradum caliditatis. Ego Batrachion, siue Apium risus calidū initio quarti, & siccum in tertio crediderim.

Nunc ad remedia ueniendum, & ponendi ex ordine autores iam citati, una cum alijs ueteribus & recentioribus qui herbarum uires explicent, uidelicet

Apuleius	Oribasius
Dioscorides	Cassius felix
Aetius	Paulus Aegineta
Serapion	Mesue
Auicenna	Constantinus
Platearius.	

Vtendum hac in re nonnunquam opera SYMONIS IANUENSIS, atq; PANDECTARII, ubi non hallucinantur, quod illis tamen familiare est. Nam hii ex ueteribus & probatis autoribus permulta congefferunt, quæ cum iudicio oportet recipere. &c.

De A L O E. Caput .i.



ALOE VENARVM ORIFICIA APER

tionē sanguinem spargente aperit. Et paulo post, Estque maxime nocens hamor-
rhoïdibus, & ano. Quantum in hoc a uero errauerit Mesue, nemo est, nisi talpa cæcior sit, qui
nesciat, quando certum fit ueterum omnium testimonio Aloen habere uim & naturam adstrin-
gendi, & sanguinis eruptiones compescendi. Id quod in primis monstrat Dioscorides, qui lib.
3, cap. 24. in hanc scribit sententiam. Aloe uim habet adstringendi, & cum aqua frigida pota san-
guinis excreationes cohibet. Quinetiam sanguinis eruptiones ex hamorrhoidibus factas sistit.
Et confirmat eadē Galenus lib. 6. de Simplicibus medicamentis cap. 13. ita scribens, Et glutinā
sistulas profundas, & ad cicatricem perducit ulcera quæ difficile sanantur, & maxime ea quæ
sunt in ano & genitalibus. Apertius uero prædictis authoribus Mesue uerba confutat Plinius
libro naturalis historię 27. cap. 4. ita differens. Aloe sanguinis excreationes si modicæ sint, dra-
chmæ pondere ex aqua; si minus, ex aceto pota sedat. Vulnerum quoque sanguinem, & unde-
cunque fluentem sistit per se, uel ex aceto. Hemorrhoidum quoque abundantiam leniter sistit. Item
Auienna lib. 2. cap. 67. in hunc modum scribens: Aloe quando ponitur cum uino dulci super
hamorrhoidas, & fissuras ani, tunc sistit sanguinem currentem ex eis. Præterea Galenus lib. 4.
Therapeutice methodi cap. 4. ubi profluuij sanguinis curationem ex professo tractat, nullum
efficacius remedium ad sistenda sanguinis profluuiā esse docet, quam id quod ex parte Aloes
conficitur. Eius autem hæc sunt uerba, Optimum omnium quæ noui medicamentorum, quo
etiam ad cerebri membranarū hamorrhagias tutissime uremur, est quod nunc subiiciam. Huius
cum oui candido subigitur, quantum mellis reddat crassitudinem: hoc de hinc leporis mollissi-
mo pilo excipitur, deinde tum uasi ipsi, tum ulceri toti liberaliter imponitur. Vtitur etiam eo-
dem medicamine Galenus libro de uenæ sectione in glutinā arteriæ incisione, adeo ut sose
clarius sit, Aloen ex natia proprietate neque aperire uenas, neque sanguinē ciere. Quod uero aliquā
do sedis uenas aperire uidet, hoc ex accidenti fit, quoniam uidelicet excrementa biliosa id sua acritu-
dine agentia ad ea loca mouet. Id quod & ex alijs medicinis fieri Gal. lib. 6. Aph. 47. scribit, ita in-
quies. Huic homini expurgatione ambo hæc optima eueniunt, quod. f. & superfluitates expel-
luntur, & quod ex acritudine eorum quæ excernuntur, paulatim aperitur os uenæ, quam
uocant hamorrhoidem. Proinde male admodum Mesue uiribus Aloes tribuit, quod magis bi-
lios excrementis, id sua acritudine agentibus, erat tribuendum.

Mesue de sim
pl. Medic.
cap. 11.

B

De M A N N A. Caput .ii.

MANNAM Arabum atque recentiorum, qua nunc passim ad molliendam aluum nobilium
utuntur, esse diuersam a Græcorum, ex eo primum liquet: quod eam, teste Aueroe Corduben-
se, post Galeni tempora in usum medicorum uenisse constet. Insuper quod etiam diuersa sit ei-
us a Manna Græcorum operatio. Arabum enim Manna medicina est, aluum molliens, Græco-
rum uero potius adstringens. Arabum uero mannā molliare aluum, diutina iam experientia
comprobatum est, ob id prolixiori demonstratione non opus habet. Mannam autem Græco-
rum adstringendi uim esse præditam, testatur in primis Dioscorides libro primo, cap. 80. de Man-
na ita tradens. Manna thuris probatur, quæ candida & pura, uelut; thus grumosa est, Thuri
autem eandem uim habet. Thus uero habere uim adstringendi, & cruenta uulnera glutinandi,
satis ex capite, 78. lib. primi Dioscoridis liquet. Item Mannam adstringere multo clarius indicat
Galenus lib. 5. Thera. metho. cap. 4. in hunc modum scribens. Est autem Manna medicamen-
tum quod magis quam thus adstringit. Idem quoque docet lib. Thera. metho. 13. cap. 2. dicens,
Manna est purgamentum Thuris, leui adfrictione prædita: atque hoc etiam nomine Thure ipso
ad nonnulla utilior. Thus enim puri tantum mouendi facultatem obtinet, utpote nullam ad-
stringendi uim habens. Manna uero, etiā corticis Thuris paululū est admixtum, unde scilicet
adstringendi uim habet. Ex quibus iam satis constat, Mesuen ribus locis falso Galenum citas-
se. Primo de simplicibus medicamentis capite de Manna, ubi Galenum mannā cum Scam-
monia permiscuisse scribit. Secundo, eodem libro capite de Scammonia, ubi iterum impuden-
ter Galenum Scammoniam cum sexcuplo mannæ miscuisse asseuerat. Tertio, in Antidotario
suo ubi de medicinis solutius agit, confectionem quandam de Manna ex Galeni inuentione de-
scribens. Certum enim admodum est, Mannam hanc de qua scribit Mesue, Galeni temporibus

Manna.

C in usu Medicorum, ut diximus, non fuisse, proinde nec de ea quicquam scribere potuit, incognita enim prorsus erat. Vel si ullus eius apud Gal. antiquosque usus amentio fuit, certe non sub ea uoce fuit, sed potius sub uoce mellis aerei. Quamuis, ut errore decimo quinto clarissime ostendimus, hoc mel aereū alio nomine Saccharū dictum fuit. Præterea ex prædictis facile iudicabunt studiosi, quantum Petrus Crinitus, lib. 27. de honesta disciplina cap. 7. cecuciuerit. Is em̃, & si alias oculatissimus sit, tamen Mannā græcorū eandem esse cum Arabū astruere nihil ueritus est. Idq; talibus argumentis ostendere conatus est, quæ magis, si ad iudiciū exigas, diuersum probabunt. Proinde caueant medicæ professionis studiosi, nominis Mannæ similitudine decepti, eandem apud Græcos & Arabes recentioresque esse existiment, animaduertantque, antiquis in thure semper, in aërio autem mel nunquam usum eius uocis fuisse.

DE RHEU BARBARO. Caput .III.

Per Rheubarbarum nostrum, ne nominum te fallat ignorantia, intellige id quo nunc passim utuntur Medici. Per antiquorū uero quod Dioscor. Galenus, atq; Plinius, & qui istis uetustiores, describunt accipe. Considerandum autem præ cæteris erit, quod uulgus Medicorum Rheubarbarum, & Punici Raueddeni uocant, hoc Galenus interdum Rheon, aliquando Rhiam, interdum etiam Rheam ponticum, Dioscorides Rha, & iuxta quosdam Rheon, secundum alios Rhian, Plinius Rhacoma, Celsus radicem ponticam appellat. Quod ideo admonendum duxi, ne nominum diuersitate quis deciperetur. Verum Rheubarbarū, quo nunc passim officinæ utuntur, & quod Mesue describit esse diuersum ab eo, quod Antiqui depingunt, manifestum sit ex eius notis; quæ ab ijs quæ in eo offenduntur, quod ab antiquis describit, sunt omnino diuersæ. Nam Rheon antiquorū, teste Dioscor. lib. 3. cap. 3. radix est nigra, maiori Centaurio similis, minor tamen, & magis rubens, sine odore, fungosa seu laxa, nec ponderosa. Subscribit & Gal. lib. de simplicibus medicamentis ad Paternianum cap. 218. ita inquit. Rheon quod a quibusdam Rheon ponticū dicitur, radix est magna & nigra, fungosa, leuis, odore carens, gustu calefaciens, & leniter adstringens. Nec dissensit Plinius lib. 27. cap. 12. ita scribens. Rhacoma assertur ex his quæ supra Pontum sunt regionibus. Radix Costo nigro similis, minor & rufior paulo, sine odore, calefaciens gustu, & adstringens. Ea uero quæ iam in usu est medicorū, uehementissimum odorem habet, nullumque cum Costo nigro similitudinem gerit. Et præter id quod odorata est, leuis etiam non est, immo quanto grauior, tanto melior a Ioanne Mesue & ab omnibus putatur. Adde quod istarū quoque diuersus est usus. Antiqui enim sua ad uentris purgationem non utebantur, sed ad pluresque usus alios adhibebant, quos opere precium non est hoc loco referre, quando ex Dioscor. Plinio, Galeno, reliquisque facile disci possunt. Certum tamen est, huic maximam & præcipuam uim adstringendi fuisse. Ita Auicenna quoque lib. 2. sui Canonis cap. 57. purgandi uim Rheubarbaro non adscribit, id quod facit & Fen. 16. Cano. 3. Tract. 1. Cap. 4. sed Rheubarbarū inter medicinas adstringendi uim habentes, ut passim quoque alias enumerat. Nam quantum ipse sciam, nunquam Rheubarbaro usus est Auicenna tanquam medicamento purgante. Nostri uero secuti Ioannem Mesue inter cætera purgantia medicamina tanquam præcellentissimum suum Rheubarbarum collocant: nec enim uim purgatoriam minorem Agarico habet. Quod & uerum esse non solū Mesues, sed etiam Auerrois ac recentiorum omnium auctoritate, ipsaque experientia didicimus. Accedit ijs omnibus quod nostrum non a Ponto, ut ueteres, sed ab extremis meridionalis Indiæ partibus ad nos uehitur. Quæ singula certe satis superque declarant, nostrum Rheubarbarum ab antiquorū esse penitus diuersum. Nam si in eo de quo scribunt uim purgatoriam antiqui inuenissent, proculdubio silentio non præterissent. Hoc non animaduertens Auerrois ille Cordubensis, satis impudenter Galenum notat, eo quod confingere uentrem scripserit Rheon. Vnum adhuc præterire non potui: scribit Ioannes Mainardus, recondite eruditionis uir, libro suarum epistolarum medicinalium sexto, se a Sigismundo regiæ Sarmatium medicis didicisse, in eo bello quod contra Moschos fortissime rex gesserat, repertum esse aliud Rheon, communem quidem satis simile, sed penitus inodorum: quod dubio procul fuit id quod ueteres pingunt. Omnes enim antiquorū notæ in eo deprehenduntur. Afferitur namque ex ijs quæ supra Pontum uel Bosphorum sunt regionibus, prope uidelicet Rha flumen, radix nigra, & costo nigro exterius, magno Centaurio interius similis, minor tamen & rufior, sine odore, calefaciens gustum & adstringens, laxa, subleuis, & dum masticatur pallida, & ad crocum uergens. Quare non est quod post hac hæsitent studiosi, Rheubarbarum nostrum ab antiquorum in uniuersum differre.

Rheon.

D **Io. Mainard.**

DE SIDERITIDE. Cap. .III.

Omnes fere nostra ætate Medici Serapionis atq; Auicennæ errorē sequentes, id genus Sanguinis Draconis, quod nunc passim in usu habetur, succum herbæ cuiusdam arbitrant, quæ a Græcis Sideritis, a ferro, quoniam glutinandis uulneribus apta præcipuū in bello haberet usum

uocata est. Verum eosdem esse falsos, manifestissime ostendit Dioscorides Lib. 4. Cap. 32. Nam is de Sideritide herba, omnibusque eius generibus plenissime scribens, ex nulla eiusdem specie talem exprimi succum edocuit, quo Medici pariter atque Pictores ad suum utriusque opus uterentur, quod tamen si uerum fuisset, nullo pacto silentio præterisset. Quare multo probabilius est ita de Sanguine Draconis statuere, quod sit eius generis metallum, quod a Dioscoride Cinnabaris dicitur. Nam huic omnes Cinnabaris notæ, quas recenset Dioscorides Lib. 5. Cap. 63. conueniunt. Quemadmodum enim Cinnabari precium ingens est, ut post Dioscoridem quoque testatur Plinius Lib. 33. Cap. 7. eoque pictores uariandis in pictura lineis, ac Medici ad ea quæ sanguinem sistunt, utuntur; ita duplicem hunc & in pictura & medicina usum compertum habemus in eo quod purum Sanguinem Draconis appellant. Nam rarus inuentus est atque difficilis, nec minus charus quam legitur fuisse apud antiquos, & hoc quando syncerus atque incorruptus uenundatur. Etenim qui passim in Sepalsiariorum officinis uenalis habetur, adulterinus est, licet cum pro uero in medicinæ usu recipiamus, ut plerumque etiam alia, sicut in sequentibus fusius narremus. Sentit nobiscum exactissimi iudicii uir, Nicolaus Leoniceus in epistola ad Angelum Politianum. Nemo autem existimet Cinnabarim Dioscoridis esse eam, quam nos uulgo Cennabrium uocamus. ea enim factitia est, ex argento namque uiuo conficitur, uenenumque est. Dioscoridis uero minime factitia est, neque uenenis connumeratur. Quod ideo admonendum duxi, ut hoc pacto medicinæ candidatos ab exitiali errore reuocarem, ne scilicet, si Cinnabarim in Receptis, sic enim suas compositiones uocant, scriptum inuenirent, pro ea nominis similitudine decepti, Cennabrium nostro uterentur, quod uenenum esse manifestum est. Cur autem Cinnabarim hanc Dioscoridis Sanguinem Draconis nomen, ea ratio in promptu est. Namque durat adhuc antiquorum quorundam in hoc nomine persuasio ac opinio, qui Cinnabarim illam, quæ ad usum picturæ & medicinæ adhibetur, ex draconum atque elephantorum sanguine permixto fieri putauerunt. Hoc quod Dioscorides ijs uerbis indicat. Profundi coloris est. Eamque ob causam crediderunt quidam Draconis Sanguinem Cinnabarim esse. Opinionem hanc uulgarem secutus est & Plinius libro paulo antecitato. At eam de Sanguine Draconis opinionem esse falsam, liquet ex eo potissimum, quod Dioscorides de Cinnabari non libro secundo inter medicinas ex animalium sanguine sumptas, sed potius quinto inter metalla tractauit. Galenus quoque medicus nobilissimus, suo de Simplicibus medicaminibus libro. 9. Cinnabarim inter metalla recensuit. Auerois pariter in Lib. 5. Colliget Cap. 43. Sanguinem Draconis inter metalla connumerat, adeo ut luce meridiana clarius sit, Sanguinem Draconis non succum, sed potius metallum esse.

DE NAPPELLO, SIVE

ACONITO. Caput .V.

Avicenna Cap. 503. 2. Canonis scribit Napellum esse uenenum pernitiosum, destruens bibentem se. At mox oblitus eorum quæ scripsit, capite eodem hunc potari suadet, dum inquit, Delet albas linitum & bibitum. Quid quæso absurdius aut dici aut scribi potuisset ab homine qui reliquorum se magistrum facit. Annotandum itaque, quod nostræ ætatis Herbarij Napellum nominant, hoc a Græcis latinisque Aconitum uocatur. Et id Plinio Lib. 27. Cap. 2. teste, omnium uenenorum est ocysimum. Quod etiam confirmat Galenus Lib. de Simplicibus Medicamentis Cap. 20. ad Paternianum, dicens Aconitum ualde uenenatum esse. Ita & Dioscor. Lib. 4. Cap. 71. Aconitum inter uenena recenset, dum ait. Enecat pantheras, fures, lupos, bestiasque omnes inspersum carnibus, & illis in cibo appositum. Hinc cauendum ne in potu aut cibo sumatur. Id quod Paulus Aegineta ijs uerbis monuit. Aconitum quidem cognomento Pardalianches exedentem & letalem uisum habet. Eamque ob causam intus cauendum est. Foris tamen in carnibus quas exedi oporteat uti licet. Ita & reliqui omnes Aconitum laudant, si abstergendum aliquid sit ex corpore: nullus autem unquam præter Auicennam, in potu propinandum docuit. Cæterum idem Auicenna. 2. Canonis Libro, Cap. 554. succum radicis Pentaphylli medicinam pernitiosam esse docet. Eius autem hæc sunt uerba. Succus radicis eius est medicina perniciosa. At quam falsa docuerit, ostendunt ea quæ de eo succo Dioscorides Lib. 4. Cap. 39. in hunc modum scribit. Facit & radicis recentis succus ad iecoris pulmonisque uida & letalia uenena. Quod & Apuleius Madaurensis cap. 2. de herbarum uirtutibus indicat, cum ad morsum serpentis herbam Quinqfolium potam ac contritam mire utilem esse scribit. Quæ si uera, ut nemini dubium esse scio, certe ex diametro cum Auicennæ sententia pugnant. Hæc & si manifesta fere omnibus sint, attamen quia multis errandi occasionem dederunt, ideo hoc loco admonere duxi. Nam Saonarala celebris sua ætate Medicus, radicem Pentaphylli non aliam ob causam non ausus est in quartana propinare, nisi quia damneretur a principe. Ita & Iacobus de Dondis, cognomento Aggregator, huius radicis succum inter uenena perniciosa ex Auicennæ autoritate numerat. Tantam habet Auicenna apud nostri sæculi Medicos autoritatem, ut medicinam mortiferam faciat salutare, salu-

A

Cinnabaris.

B

Napellum,
Aconitum.

C tarem uero perniciosam, adeo ut non immerito, rei grauitate commotus, Leoniceus rare ruditionis uir, in hunc modum exclamauerit. Miseret me humanæ uitæ, quam uideo quotidie sub Auicenna, non tanquam principe, sicut iuniores Medici adpellant, sed tanquam sæuo tyranno periclitari. Proinde ex eo intelligenti studiosi, quantum insaniant hi qui malunt cum Auicenna aut aliquo alio, cuius uerba pro oraculis habent, errare, quam cum his qui medicinam a fontibus hauriunt recte sentire. At satis ea de re in præfatione nostra dictum est.

¶ De B V G L O S S A &
B O R A G I N E. Caput .vi.

Missas hic facio diuersas ac pugnantes inter se recentiorum de Buglossa atq; Boragine sententias, ex quibus facile æquus lector æstimabit, eosdem nihil horum intellexisse, atq; adeo nihil mirū, si reliquis etiā errandi occasione præstiterint. Vnum autē hoc ostendā, Buglossum nostræ ætatis non esse antiquorū Buglossum, sed eam quam nos Boraginē uocamus. Nostram uero Buglossum esse eam herbā quam græci Cirfion, & propter magnā quam habet eum Buglossi similitudinē, aliquando Buglossum magnā, appellant. Commutatæ namq; inuicē duarū herbarū appellationes sunt, quæ enim huic & illi notæ uiresq; tribuunt, mutatis hac ratione plantis conueniunt. Quod equidē nō aliunde certius nisi ex ambarū descriptionibus deprehendi potest. Buglossi autem descriptio apud Dioscor. lib. 4. cap. 119. hæc est. Buglossus uerbalco similis, folia in terram deiecia, aspera, nigrioraq; bubulæ linguæ similis, quæ quidem in uinum deiecta, uoluptatē & letitiā animi facere credunt. Paulus præterea Aegineta in sexto de Buglossio indēm scribit, dicens. Buglossum humidū calidūq; temperamento est, eamq; ob causam uino iniectū, lætitiā animi facere dicitur. Galenus quoq; lib. 6. de Simplicibus Medicamentis, cap. 8. nihil a Pauli uerbis dissentit. Quod & Plinius Lib. 27. Cap. 8. facit, dum ait. Iungitur huic Buglossus boū linguæ similis, cui præcipuū quod in uinū deiecta, animi uoluptates auget, & uocatur Euphrosynon. Iam ista si quis sub examen uocauerit, solc clarius uidebit, Buglossum hanc ueterū, esse nostrā Boraginē. Nam iuxta Dioscor. descriptionem folia aspera & nigriora Boragini nostræ magis quam Buglossio competunt, quæ albicant folio penitus est. Quodq; Buglossio nullum non ex antiquis lætitiæ & uoluptatis spem, si in uini pocula demittatur, tribuit, Boragini passim adscribitur. Iactatq; quotidie gens nostra ad cordis hilaritatem multo eius cibo utendū esse. Porro Marcus Caro Cap. 40. sui de Rustica operis, inscriptionem arborū docens, eum instituisse quatenus & quomodo furculos inseruisse & circumligasse oporteat, addidit. Insuper lingua bubula obregito si pluat, ne aqua in librum permeet: eam linguā insuper libro alligato, ne cadat. Ex quibus sane constat, in operiendo trunci & insitæ stirpis rotunda sectione, rotundior potius quam longiore folio uti præcepisse: at Boraginis tale est: eius uero quæ nunc Buglossus habetur, longa folia sunt, ideoq; operiendæ rotundæ stirpi minus apta. Ex ijs quoq; colligitur caput. 438. secundi Canonis de Buglossa seu lingua Bouis. apud Auicennā esse caput de Boragine nostra. Nam herbam esse habentem lata folia, & cordis confortatiuam scribit, quæ singula a nostra Buglossio sunt aliena, at Boragini penitus cognata. Itaq; non immerito Auicenna notat sui seculi Medicos, qd non uera Buglossa uterentur, sed alia quæ non easdem utilitates haberet. Cæterū quod Buglossus nostra sit ea herba quā Græci Cirfion uocant, ex eiusdē quoq; descriptione ostendemus. Diof. autē Lib. 4. Cap. 110. eandē ita depingit. Cirfion folia Buglossi similia habet, leniter hirsuta, longiora tamē, albicantia, & in extremitatibus aculeata. Quod uero in caule summum est, circinnatum, hirsutumq; capitula habet in summo purpurea, quæ postremo in pappos euanescent. Haud aliter describit Plin. Lib. 17. cap. 8. inquiring. Cirfion cauliculus est tener dū cubitorū, triangulo similis, folijs spinosis circumdatus, sping molles sunt, folia Bouis linguæ similis, minora, subcādida, & in cacumine capitula purpurea, quæ soluunt in lanugines. Considera iam, an nō singula hæc Buglossio nostræ conueniant: Si enī folia expendes, eā certe in Buglossio longiora, uel ut Plinius ait, minora, in Boragine autem decurata rotunditatis, & multo maiora sunt. Purpurea item in summo caule capitula, quæ in Cirfio describunt, eius potius sunt quæ Buglossus nunc dicitur quam Boraginis, quæ cæruleos habet flores. Confer itaq; iam cum naturæ exemplaribus utriusq; historiā, carpsaq; ex horto Buglossum & Boraginē diligenter contemplare. Sane prior illa Buglossi historia nostræ ætatis Boragini respondebit, posterior autē Cirfij, Buglossio nostræ undiq; conueniet. Sunt enim Buglossi folia longiora quā Boraginis: albicant illa, hæc contra nigricant: illa surgunt & perse stant in altū nitentia, Boraginis in terra iacent. Quare consulto fecerint Medici, cū Buglossam ex ueterū autoritate ad usum Medicinæ adhibuerint, si Boraginem potius nostram, quam illam quæ passim Buglossa nuncupatur, receperint.

¶ De E V P A T O R I O, &

Buglossi descriptio.

Cirfion.

A G R I M O N I A . Caput VII.

A

Fuerunt, & adhuc sunt magnæ in Medicis dissensiones de Eupatorio & Argemone, quam corrupto uocabulo passim Agrimoniam nominant. Nam ex ueteribus quidam, quos Diosc. etiam notat, putauerunt Eupatorium esse ueram Argemonem, cum ramen ab Eupatorio in uniuersum differret. Qui equidè error ad nostra usque secula durauit. Herba enim quæ uera est Eupatorium, omnes nostræ ætatis Medici Agrimoniam esse credunt. Idque uerum esse ex Eupatorii notis a Diosc. lib. 4. ca. 35. traditis, manifestissime deprehendere licet. Quæ quidè tales sunt. Eupatorii herba est fruticosa, singularis: exit ex ea uirga tenuis, lignosa, recta, nigra, pilosa, cubitalis, & aliqui maior, fortia habet per interualla partibus diuisa quinque fere, aliquando tamè pluribus, Quinquefolij Canabise folijs familia. Nigricant & hæc etiam ferræ modo in extremitatibus incisa. Semen fert medio caulis adnascens, in terra annuens, adeo hirsutum ut uestibus fixatum hæreat. Insuper quia Plinii lib. 25. cap. 11. descriptio omnino cum Diosc. quadrat, proinde commodum duxi eandem huic subiungere, ait enim. Eupatoria regiam autoritatem habet, caulis lignosi, nigricantis, hirsuti, cubitalis, alique & amplioris, folijs per interualla Quinquefolij aut Canabis, per ambitum incisus quinque partito & ipsis plumosis, radice superuacua. Iam si ueritatis diligens indagator, eas notas Agrimonie nostræ accomodauerit, huic certe in uniuersum competere comperiet. Est enim in ea singularis uirga, lignosa postquam aruit durities, plumosa, undique asperitas, color nigricans, & folia per interualla pendètia, ferræ modo incisa, adeo ut hanc esse ueram antiquorum Eupatorium nemo nisi Leberide cæcior sit, non intelligat. Minime autem mirum recentiores Medicos ea in re esse lapsos. cum enim Arabes se quantos autores, eisque in describendis plantis fidem maximam adhibeant, qui & ipsi alius aliter de eadem re tradiderunt, facile illis errandi ansam exhibuerunt. Auicenna namque Eupatorium scribit esse herbam aromaticam, habereque folia Canabis, florè Nenupharis. At quid aliud Agrimoniam nostram esse Eupatorium significet, quis est qui non agnoscat? Constat enim herbam uulgo Agrimoniam nuncupatam neque esse odoratam, neque habere florè sicuti Nenuphar, immo ita exiguum, ut uel Nenuphar, uel eius flori collatus, nullam ipsius habeat similitudinem. Mesue præterea Eupatorium folijs Centauræ minoris, floribus subcitrinis, longitudinis, paucè constare, dicit. Quod certe tam simile uero est, quam Centaurij folia Canabinis, & subluteus color albo similis est. Porro quod omni uim maximam esse, non sine magna temeritate Mesue Eupatorio uim purgatoriam adscribit, nullus enim ueterum nec Auicenna quidem, quicquam tale, ne per somnium etià, de eodem cogitauit. Immo Diosc. contrariam magis uim in eo prædicat dicens. Semen & herba ipsa cum uino pota, dysentericis & morbis a serpentibus opitulant. Hoc etiam Plinius confirmat scribens. Semen Eupatorii dysentericis in uino potum auxilium unice. Ex istis manifestum admodum est, Arabes, Auicennam maxime, qui & alias modicum simplicium medicamentorum habuit noticiam, atque Mesuem, Eupatorium uerum nunquam cognouisse: atque adeo uisum mirum si neque eorum de imitatores. Proinde studiosis indies orandum est, ut bonam fortunam in uerum peritumque incidant autorem, quando Galenus Lib. 3. de Potentibus naturalibus Cap. 14. teste, in quemcumque quispiam primum incidit præceptor, talis efficitur, non expectans aliquid aliud ab eo quod didicit amplius addiscere. Hinc tandem haud aliter quam Medicus ille olim Romanus omnia sua fortè committunt, monentes ægros ut præceant, quo Dei sua cuique remedia secudent. Hoc profecto si iuniores Medici animo uoluerant, ex quo fontibus magis quam riuiulis, bonis quam malis præceptoribus, Medicam artem hauissent, in eum errorem non incidissent, ut Eupatorio pro Agrimoniam uterentur, sed ueram magis Argemonem ad usum medicinæ accommodassent, cuius iam, quoniam prorsus ignota, omnis apud nostræ ætatis Medicos usus perijt.

Eupatorium.

B

DE R V T A S Y L V E S T R I

& C I C V T A . Cap. VIII.

Auicenna Fen. 6. Cano. 4. Tract. 3. Cap. 33. hunc in modum scribit. Ruta sylvestris non est Harmel, ut quidam existimauerunt. Quæ sane uerba non paucis errandi occasione præbuerunt, quod passim Harmel pro Cicuta interpretati sunt. In quæ etiam erroris interpretis Auerrois quinto Colliger lapsus est, dum impudentissime Harmel Cicutam interpretatur: non animaduertens quod eo loco Auerrois Harmel calidam & siccam in tertio ordine scribat, Cicuta autem inter letalia uenena frigidityte sua enecantia numeretur a Diosc. Galeno, Plinio ac alijs. Diosc. namque lib. 4. cap. 7. de Cicuta ita scribit. Cicuta inter letalia frigidityte enecans est. Galenus uero lib. de simplicibus medicaminibus, semen Cicutæ præ omnibus alijs frigidissimum esse testatur. Plinius autem lib. 25. cap. 13. de ea in hunc modum disserit. Seminibus & folijs cicutæ refrigeratoria uis: quæ si enecat, incipiunt algere ab extremitatibus corporis. Quare a tam crasso errore nullo pacto uindicare potest interpres ille, quisquis tandem fuerit. At conuiuentum erat, nisi is error etiam officinas nonnullas occupasset. Nam ipse oculis Antidorarum nescitum admodum uidit, quo ad annos non paucos ad conficienda medicamina usus est Pharmacopola quidam, in quo semper Harmel pro cicutæ femine interpretatum erat: nec animaduertit errorem donec per me tandem admonitus fuit. Quod uero Harmel non sit se-

Cmen Cicutæ, sed ruta syluestris, manifestissime indicant ea quæ scribunt a Diosc. lib. 3. ca. 49. de ruta syluestri in hanc sententiam. Vocant quidam agrestis rutæ Harmala. Idem scribit Gal. Lib. 7. de simplicibus Medica. cap. 119. dicens. Rutam syluestrem quidam appellant Harmala. His accedit quod descriptio Harmel apud Aueroim Cordubensem in totum conuenit rutæ syluestri. Ait enim. Harmel calida & sicca est in tertio ordine, incidit humores crassos, prouocat urinam & menses, ualeat dolori coxendicium, & pituitam purgat. Has proprietates omnes Galenus maxime,

Ruta. Dioscorides & Plinius Rutæ syluestri tribuunt. Galenus enim lib. de simplicibus medica. cap. 224. de Ruta ita scribit. Vrinam & menstrua prouocat Ruta, colicq; dolorem sedat. Dioscorides autem lib. 3. cap. 49. ita inquit: Apposita menses & urinam cit, & cum uino pota, quartanas finit. Sanat agrestis Ruta itidem coxendicis dolores quadraginta diebus pota. Auicenna præterea secundo canone. cap. 340. omnes prædictas commoditates Harmel adscribit dicens. Est incisua & subtiliatiua, est bona dolori iuncturarum, & sciaticæ cum desuper linitur. Prouocat urinam & menstrua, & coasert colicæ uentose. Proinde mirum est istorum deinde in quarto Canone non fuisse memorem. Insuper cum Ruta syluestris, ut ex ueterum testimonijis traditur, habeat uim incendiendi & discutiendi lentos & tenaces humores in articularum doloribus, certum est eam utiliū adhiberi ad catapotiorū de hermodactylis confectionem, quam Cicutam: quando hæc sua frigiditate eosdem potius augere possit, quam tollere; illa uero sua caliditate magis incidere atq; discutere, adeoq; uitium quod ex renacium humorum multitudine prouenit, auferre. Accedit ips, quod et Galenus lib. quinto de Simplicibus medicamentis prober quædam uehementer frigida hebetandi sensus gratia, ubi impatientes crucientia dolores: usum tamen cicutæ in totum damnat, ut quæ non solum frigiditate, sed etiam superflua humiditate sit pernicio-
sa. Nemo deniq; ueterum Cicutam aliter usum est quam quod extrinsecus eam apposuerit, nullus autem eorum in tra corpus adhibere iussit. Id quod omnium maxime offendit Dioscorides de Cicutæ usu in eam scribens sententiam. Multos habet in medicina usus. Collyrijs quæ somno dolorem leuant, commode miscetur succus. Extinguit idem sacros ignes, & quæ serpunt. Quia etiam concisa herba comaq; eius mox testibus emplastri modo imposita, nocturnas libidinum imagines in somno auerit. Languent genitalia emplastri modo imposita. Lac extinguit, & in uirginibus mammarum incrementa compescit, & puerorum testes nutrimento augeri prohibet. Plinius quoq; loco paulo supra citato, præter prædicta Cicutæ nihil tribuit, adeo ut satis iam constet Harmel non esse Cicutam, sed potius rutam syluestrem. Caueant itaq; posthac medicinae candidari, ne pro semine rutæ syluestris Cicutam, cuius succo Plinio lib. 25. cap. 13. teste olim

Cicuta. Athenienses ad mortem in publicis & capitalibus iudicijs utebantur, ad medicinæ usum adhibebant. Non sit, per Apollinem oro, tanti unus accentus, ut quum H A R M E L, apud Arabes scribatur cum aspiratione, ut quidam nugantur, significet Cicutam: cum uero sine aspiratione, Rutam syluestrem: quando interdum ex tantilla notula hominum uita periclitetur. Verum Harmel descriptio potius ad ueterum notas exigatur, ita enim mox apparebit esse rutam syluestrem.

De A L O E, Caput. IX.

Meluelibro suo de simplicibus Medicamentis, cap. de Aloe in hanc scribit sententiam, Aloe mixtum cum melle est minoris solutionis. Et paulo post, Et adhuc etiam est conturbatiuū, faciens colorem uentris, & nocens stomacho. Imitatus est autem hoc loco, ut alias fere ubiq;, Auicennam, qui lib. 2. cap. 67. ita de Aloe scribit. Permixtio ipsius cum melle, minuit uirtutem eius: At nihil istis falsius dici potuisse, nemo arbitror, sanè mentis est, qui non intelligat, quando ex diametro cum ueterum plantis, ratione deniq; & experientia pugnent. Quantum enim ad primum attinet, quis est qui nesciat melli suapte natura inesse uim subducendi uentrem? Et ut morosis ueteris inficitæ propugnatoribus, qui sua mordicus tenent, satisfiat, ecce id ueterum testimonijis comprobabimus. Hippocrates libro de morbis qui extra, de melle ita docet, Mel autem cum cæteris sumptum nutrit, coloremq; bonum facit, solum uero potius emaciat quam rescitat, lotium enim cit, supraq; modum purgat. Itē Galenus lib. 3. de alimentis, cap. 38. inquit, Mel habet quandam acritudinem, qua ad egestionem excitat uentrē. Dioscorides etiam lib. 2. cap. 77. ita scribit. Crudum mel inflat aluum, & tussim prorit. Paulus præterea Aegineta lib. 1. cap. 96. ait. Mel coctum magis alit quam aluum subducit: non coctum, contra. Subscribit Paulo Alexander Aphrodisæus sectione. 2. Proble. 66. inquit. Mel incoctū tergit & purgat, coctum alere tantum potest. Adde quod Paulus utitur etiam melle cap. 6. ad desiciendū aluū puerorū, inquit em. Porro si pueri aluus adstricta fuerit, mel cibo adiectū dabis. Si atq; mel se solo uentrem subducere potest, Aloe cur non idem plus efficeret, additū alteri quod simile uim obtinet? Hinc est quod Psellius lib. 1. de uictus ratione, in capite de ipsis quæ uentrē citant, Damascenis, itemq; alijs ualuum plus subducant mel adijci præcipiat. Ait enim, Damascena humida & arida melle

confecta, madefacta, ut plus teneant mellis, mansaq; solitaria. Si bis mellis compositio absorbeatur, plus subducit quam si dulce uinū potites. Quod uero Aloe iuncta melli plus subducatur alium, testatur in primis Dioscor. ubi supra, ita scribens. Cū resina aquaue, aut cocto melle excepta alium pota soluit. Id quod Plinius etiam lib. 27. cap. 4. confirmat dicens. Deuorant pillulæ cum mellis decocto, aut terebinthina resina, ad purganda interiora. At quid opus in re manifesta plus equo uerbosum esse? Pergemus itaq; ad secundū, monstremusq; Aloen non obesse stomacho, ut Mesue insanit, sed eundē magis roborare. Hoc quod docet Gal. lib. 6. de simplicibus medica. cap. 23. in eum modū scribens. Aloe est præ omnibus alijs medicinis stomacho accommodata atq; utilis. Quod & Dioscor. subsequenter uerbis significauit. Aloe mixta alijs quæ purgando sunt, minus noxia ea stomacho reddit. Prædictis subscribit Oribasius in Compendio medicinae cap. de Aloe inquitens. Aloe acutū quidē non est caharcticū, stomacho autem aptissimū. Plinius quoq; lib. 27. cap. 4. ita scribens. Confirmat stomachū Aloe, adeo ut nulla uis contraria infestet. Ex istis factis liquet, quantum a uero aberrauerit in describenda Aloe Mesue, cuius equidem plura adhuc alia sunt errata, quorum aliqua suo loco attingemus.

¶ De C A S S I A . Caput .X.

Cassia qua nostri passim nunc ad aluū leniendam utuntur, antiquis penitus incognita fuit: uel si cognita fuit, certe eam in medicinæ usu nō probauerunt: quando nullus aliquā de ista mentionē faciat, sed tantū de quadam specie lignæ, quæ *ρίπη*, id est, fistula ab eisdem nominat. Quæ propter diligentius aduertendum, nec in libris Græcorum Cassiam fistulam scriptum inuenimus, alterā putemus intelligi, de qua Arabes atq; recentiores loquunt. In quem sane errorē Leoniceus, uir dignus cui multum deferant bonarum literarum cupidi, in epistola ad Menochiū, plerūq; ex medicis iunioribus incidisse scribit, seq; cognouisse ait, quic cortice Cassiæ fistulæ Arabicæ, ad citanda menstrua utebantur, cum Cassiā lignēā potius ad eundē usum recipere debuissent, ex Dioscor. ac aliorū Græcorum medicorū auctoritate. Et cum nullus ferme si Medicorū qui non sciat lignēā dictam, ab alia Cassia arabica esse diuersam, non necessariū duxi plura de ista re commentari. Si qui tamen forent, qui ista non caperent, illi utriusq; descriptiones conserant, & mox quod diximus deprehendant.

Vnū tū qd maiori reprehensione dignū est hic præterire nō potui, hoc. s. Non aniuerderunt nostri seculi Medici uulgarē nostrā Cassiā lignēā, a uera multū abesse, tetra em̄ est, inodora & penitus aspernenda, immo nihil habet quare Cassia putari debeat: id quod Dioscor. atq; Pliniū legenti, remq; ipsam in manu habenti, facile constabit. Dioscor. etenim lib. 1. cap. 12. de eligenda uera ac optima Cassia ita scribit. Eligito rubescētem, amabili coloris bonitate præditam, corallio lapidi similem, angustā ualde, longam crassāq; & fistulis plenam, erodentem in gustu, & cum seruore aliquo adstringentē, aromatum modo odoratam, uini odorem, referentem. In eandem sententiam & Oribasius lib. 2. de uirtute simplicium scribit. Eligenda Cassia est quæ rubea est, boni coloris, corallio similis, tenuis, nitida, ualde longa, & pinguis in fistulis, & in gustu erodens, stipitica cum igne multo, uelut aromatum similis odore. Vbi, ut obiter moneā, non dipticis legendum, sed *διπτικὴ*, id est, erodens. Nec dissentit a dictis Plinius lib. 12. cap. 19. Adde quod Cassia te

B

Cassie electio.

nitate corticis, odore. & gustu adeo similis est Cinnamomo, ut duplum eius Dioscor. & Gale no lib. de simplicibus medicamentis ad Paternianū cap. 73. testibus, pro Cinnamomo poni possit: quorum certe nihil in Cassia nostrā deprehenditur, adeo ut uix credibile sit nostrā hanc esse uerā Cassi, sed eam magis quam Dioscor. falso Cassiam appellatam esse scribit, miræ cum reliqua similitudinis, quæ gustu nec acri, nec odorata, inhaerentemq; medullæ corticem habentem deprehenditur. At relinquimus ista ueritatē exquisitoribus diligentius pensanda.

¶ De R A D I C E . Caput .XI.

Annotandū est in primis, autores Græcos de ea radice sub nomine Turbit nihil penitus scripsisse, barbara em̄ uox est Turbit, & a posterioribus medicis quæcūq; ea sic sic appellata. Nam quod apud Dioscor. lib. 4. cap. 116. de Pityusa hæc uerba græce inserta sunt, Quam uocant Turbit, id a posterioribus factū est, & Dioscor. adiectū, ea enim in nullis ueteribus græcis aut latinis leguntur codicibus, nec etiā legi debent. Proinde cum græci nihil de ea certi tradant, necesse est, nostræ ætatis Medici eius radicis descriptionem ab Arabis perant. Quod est tentauerint, non est tamen quod certi quicquam de ea radice apud eosdem offendere queant: quando quid per T V R B I T intellexerint, difficile, imo ferme impossibile, fuerit diuinare. Aliud enim de

C ipso scribit Serapio, aliud Mesue. Serapionis equidē hæc de Turbit uerba sunt, Turbit est planta quæ in littore maris nascitur, in locis. scilicet quæ mare cooperit quando crescit; quando uero est tranquillum non tangit ea, non enim nascitur intra aquā, nec procul ab ea. Habet folia similia folijs plantæ quæ dicitur Arafais (quæuis hoc uerbum corruptū sit, ac pro eo legendū, Ilatidis) nisi quia sunt crassiora. Habet stipitē duobus palmis longū, diuisum in summitate. Flos eius mutat colorem suū ter in die; quia mane est albus, & meridie declinans ad purpureū colorem, in uesperis uero fit rubeus. Radix uero eius odorifera est, & alba, quæ quādo masticae calefacit linguā. Quod si uerū hoc est Turbit a Serapione Mauritano descriptum, certe nihil a Tripolio differt, nam omnia quæ Serapio de Turbit scribit, ea Dioscorides ac Plinius Tripolio tribuunt. Diosc. nanq; lib. 4. cap. 126. de Tripolio ita differt. Tripoliū nascitur maritimis locis, quo fluctus peruenit & regreditur, non tamen in arida, neq; in mari. Folia habet Ilatidis similia, crassiora tamē. Caulē mediantem in summo se diuidentem. Fertur flos eius ter quotidie mutare colorem. Matutino enim albet, Meridie purpurefcit, Vespere puniceo colore fit. Radix illi est candida, odorata, gustu feruida. Plinius uero lib. 26. cap. 7. Tripolium in hunc modum depingit, Tripolium in maritimis nascitur locis, ubi alidit unda, neq; in mari, neq; in sicco, folio Ilatidis, crassiore, palmo alto, caule in mucrone diuiso, radice alba, odorata, calida gustu. Hinc Pandectarij deprehenduntur error, qui in suis Pandectis, multa mendaciorum plaustra continentibus, duo facit capita, unum de Tripolio Diosc. alterum uero de Turbit Serapionis: quasi Turbit apud Serapionem sit aliud a Tripolio Dioscoridis. Verum Serapionis Turbit, quod idē est, ut iam ostendimus, cum Tripolio Dioscor. non esse Turbit quo nunc passim officinæ utuntur, ex eo manifestū fit: quia radix Tripolijs secundum Dioscor. & Plinium odorata est: quia uero nos utimur pro radice Turbit, ea omnino odore caret, proinde Serapionis Turbit esse non potest. Quod autē Turbit Mesue non sit Tripolium apud Dioscor. adeoq; diuersum ab eo quod Serapio describit, facile ex eiusdem uerbis animaduerti potest. Inquit enim. Turbit est radix herbæ cuius folia sunt, sicut folia ferulæ, minora tamē, & est ex habentibus lac. Horum nanq; nihil in Serapionis Turbit deprehendere licet. At nec Turbit descriptio, secundum Mesue, ex genere habentiū lac constare potest. Nam si uera esset, consequeretur Turbit a Mesue descriptum uel esse aliquam speciem Thymalorum, uel radicē Pitiusæ, quorum tamen neutrum astrui potest. Sunt etenim septem Thymalorum species, Dioscoride lib. 4. cap. 155. teste: sed nulla earum esse potest Turbit a Mesue pictum. Siquidē nulla ex illis habet folia similia ferulæ, qualia habet Turbit Mesues, ut constat ex Dioscor. singulas Thymalorum species per folia, ac flores, & reliquas notas describente. Neq; Turbit a Mesue designatur Pitiusæ lactariæ herbæ radix dici potest, folio enim picæe constat, non ferulæ: quemadmodum ex lib. 4. cap. 156. Dioscor. liquet, cuius de Pitiusa hæc sunt uerba. Caulē ex se mittit cubito maiorem, multis geniculis intersectum, acuminatisq; foliolis uestitum, picæe similibus. Nec dissentit Plinius lib. 24. cap. 6. dicens, Pitiusum quidam in Thymali genere numerant, frutex est similis picæe. Accedit itq; quod hæc radix Pitiusæ non Turbit a Serapione, sed Scebram, id est, Efula nuncupatur: id quod palam fiet consentiē ea quæ Serapio de Scebram ex Dioscor. autoritate scripsit. Quod si uero quis contendat Turbit a Mesue descriptum esse posse uel Lathyrin uel Peplion, quando & illas inter lactarias herbas connumeret Dioscor. is sciat neutrum fieri posse: cum utriusq; radix a Dioscoride censeatur inutilis. Videant iam ueritatis amatores quot difficultates, & quidem inexplicabiles occurrant Medicis, Arabum placita sectantibus. hi enim non modo a Græcis, sed a seipsis quoq; dissentiant. Proinde si ueritatem rimari animus est, omnino satagendum, ut folium uiride inspicatur, & an sit folio Ilatidis, aut ferulæ simile: uel etiam neutro, diligentius consyderetur. Scribit autē Ioannes Mainardus, exacti iudicii uir, primo suarum Epistolarum libro, se a fide dignis intellexisse, quod ea radix qua pro Turbit utimur, ex planta accipiat, quæ folio Myrti conficit. Quod si uerum est, certe secunda Thymalorum species erit. Hæc enim ut scribit Dioscorides, folia habet Myrti similia. Clarum itaq; ex iam dictis, utroq; & Serapionem & Mesuen, aberrasse. Plura ea de re legito apud Leoniceum in Epistola ad Hieronymum Menochium.

Tripolium.

D De S A N D A R A C H A. Caput .xii.
A Rabes uniuersi Sandaracham esse gummi scribunt, quod alio nomine Vernix appellatur. Id quod in primis Serapio indicat ita scribens, Sandaracha est gummi calidæ & siccæ complexionis, & est simile Karabe, sed non est ita durum, & in eo est parum amaritudinis, & affertur a terris Christianorum. Græci contra & Latini per Sandaracham lapidem metallicū intelligunt. Vtq; quondam Græcis & Latinis scriptoribus duplex Sandaracha. Metallica pluribus locis fossilis. Galeno enim Libro de simplicibus Medicamentis ad Paternianum Capite. 139. teste, affertur a Ponto, Cappadotia, & Cilicia, & est lapis ignei coloris. Plinius quoque Sandaracham libro. 34. capite. 12. inter Metalla connumerat dicens, Inuenitur & in aurarijs & in argentarijs

metallis, melior quo magis ruffa, quo q̄ magis uirus redolens, ac pura friabilisq̄. Dioscorides etiam Lib. 5. Cap. 76. inter metalla de Sandaracha agens, hunc in modū inquit. Eligenda Sandaracha est, quæ ad satietatē flammeo colore ruffescit, fragilis, plana, puraq̄, & cinnabaris colore aliquo, sulphuris etiā uirus olens. Altera deinde fictitia & adulterina Sandaracha est, quæ ex cocta cerussa fit, qua foelicius pictores quā medici usi sunt. De qua Plinius Libro quinquagesimo quinto, Cap. 5. ita scribit. Fit adulterina & ex Cerussa, in fornace cocta. Et Vitruius septimo suæ architecturæ commentario, Cerussa, inquit, cum in fornace coquitur, mutato colore ad ignem incendi Sandaracha fit. Lapos itaq̄ arbitror Arabes, quod Sandarachā esse gummi putauerunt, cū eandē ueteres omnes inter lapides metallicos connumerarint. Id quod ex eo etiā colligi potest, Arabes omnes uires quas Prisci uerē Sandarachæ, quæ metallū est, tribuunt, suæ quoq̄, quæ gummi est, adscribunt, quod fieri non posset si diuersæ essent. Vix enim duas res inuenies quarū uirtutes ex æquo sibi conuenient. Quod autē Arabes easdē, quas Græci suæ Sandarachæ tribuerint, facile ostendimus ex ijs quæ utriq̄ de ea scripserunt. Inter Græcos autē Dioscor. hæc tradit de Sandaracha. Vires cocturamq̄ easdē Auripigmento habet. Resina excepta capillis destituta sanat. Cum pice scabros pellit ungues, pediculosis ex oleo prodest, panos cum adipē discutit. Nariū & oris ulceribus accommodata est, & cū Rosaceo cæteris pusillis & condonatis. Dat & contra purulentas excretaiones cum mulso, & contra ueterē tussim, cū resina incenditur per fistulā uapore eius in os attracto. Vocē purgat cum melle linctā, & suspensiois cū resina deuorat. Eadē uero inter Latinos Plinius, ubi supra, de Sandaracha quoq̄ scribit, inquit. Valer purgare, sistere, excalfacere, perrodere. Suma eius dos stiptica. Explet alopetias ex aceto illita. Additur oculorū medicamētis. Fauces purgat cū melle sumpta. Vocem limpida & canorā facit. Suspensiois tussientibusq̄ iucunde medet cum resina terebinthina in cibo sumpta. Iam istis Arabū de Sandaracha placita confer, & nihil quod a prædictis pugnet offendet. Sed ne plus æquo uerbohor sim, unus Auicenna, qui Lib. 2. Cap. 62. de Sandaracha in hanc sententiā scribit, sufficiat. In ipsa est stipticitas & proprietates retinendi sanguinē. Desiccatur fistulas quādo cum ea suffumigatur. Eius fumus prohibet catarrhos. Fluxum deniq̄ sanguinis & asthma humidum sua exiccatione arceat. Utuntur ea luctatores, ut difficultatē anhelius non incurrant. Quare, ut finē tandem faciam, errasse Arabes uerisimile est, Sandaracham gummi statuantes, cum ex ueterum decreto potius lapis sit metallicus.

A

Sandarachæ
uires.

DESACCHARO. Cap. .xvii.

B

Saccharū antiquorum est id, quod Dioscor. Galenus ac Plinius describit, speciem mellis esse dicentes, & ob eam etiam rem de eo inter mella loquuntur. Dioscoridis autem hæc de Saccharo lib. 2. cap. 75. sunt uerba. Vocatur & quoddam Saccharum, quod mellis genus est in India, feliciq̄ Arabia concreti. Inuenit id in harundinibus concretionē suā salī simile, & sub dentibus instat salis confringitur. Galeni uero lib. 7. de simplicibus medicamentis, cap. 97. de Saccharo hæc est sententia, Saccharū autē uocatur ex India foeliciq̄ asportat Arabia, in harundinibus concretū, estq̄ mellis species. Hæcenus Galeni uerba recitauimus. Plinius etiā lib. 12. cap. 8. de Saccharo scribens, nihil a superioribus uariat, eius hæc sunt uerba: Saccharon & Arabia fert, sed laudatius India. Est autem mel in harundinibus collectum, gummiū modo candidum, dentibus fragile. Amplissimū nucis auellanae magnitudine, ad medicinæ tantū usum. His quoq̄ sub scribit Alexander Aphrodisis lib. 2. problem. 74. ita inquit. Quod Sacchar Indi appellant, mellis coagulum est, sole cogente rores, conuertenteq̄ ad mellis dulcedinem, quod idem monte etiā Libano fieri certum est: fit Sacchar id proximū salis glebulis candidū, fragile, uim id quoq̄ tergendī purgandiq̄ mellī simile habet. Saccharon uero hoc antiquiorū nihil differre a sale In do in primis offendit Archigenes, antiquissimus medicinæ professor, qui id Indicū salē, & harundineū mel uocauit. Paulus itidē Aegineta lib. 2. Saccharū salē Indū nominat, ait enim. Et sal Indicus colore quiddē & concretionē communi salī similis, gustu autē melleus. Hoc idem Auicenna quoq̄. 4. Canon. capite de asperitate linguæ febricitantiū scribit, inquit. Teneat in ore salē qui ab Indis deportatur, colore salis, dulcedine mellis. Cur autē Saccharū salē Indū nominarint, nulla alia causa est, quā quod sua concretionē salī simile sit, candoremq̄ ac friabilitē in eo siccitatem, & cū diluitur humore aliquo, liquefactionem, quæ in sale sunt, una hac similitudine ostendat. Dicitū est & hoc Sacchari genus, qd ex India foeliciq̄ Arabia portabat, Candū, quia nimia solis exandescencia multū obdurerat. Est autē sal Indus, seu Saccharū Candum, aliud a Zuccharo nostro Candī atque Taberzeth. Nam Zuccharam Taberzeth nostro tempore non portatur ex India, sed ex Zuccharo nostro quater uel quinque excocto, ucelli maioris corradendi gratia, seplasiarij Veneti facere didicerunt: harundines quoq̄ immittentes, supra quas uideri possit conglobatum: & gosapio inuoluentes, ut nauē ex Orientalibus regionibus inuectum putetur. Ita etiam nostrum Z V C C H A R Y M Candī res ficticia est, cuius mate-

Archigenes.

Cria est Zuccharum albū. Proinde errant Auicennę expofitores, Gentilis Herculanus, & alij, per
 ſalem Indum Zuccharū Candi intelligentes, nam præter hoc quod non eſt naturale, ſed factitiū,
 etiam colore non eſt album, uerū potius ſubluteum. Candum autem naturale, antiquis Saccha-
 rum nominatum, in ſœlici Arabia, ut diximus, & India tantū in harundinibus, maioribus fru-
 ſtis, maioriq; duricia, ob uehementiores radios ſolis, aptioraq; ad id tolerandum harundinū ſo-
 lis, coagularur. Eſt uero Saccharum hoc antiquorum a Zuccharo noſtro diuerſum. Nam res
 Zuccharum. Zuccharum a noſtris dicta, nihil aliud eſt, quam ſuccus a proprij generis planta bene contrita
 expreſſus, calore ignis plus minusue excoctus, coactus ac deſecans, in Zuccharū tanto candi-
 dius & durius euadens, quanto plus concoctionis deſecationiſq; tolerauerit. Erut Iohannes
 Mainardus, acerrimi iudicij uir, in ſuarum Epistoſolarum medicinalium libro ſecundo, ſe a Luſi-
 tanis & Siculis cognouiſſe ſcribit, planta, a qua Zuccharū exprimitur, humectis locis proprio
 ſemine ſeritur, exteriorē quidem ſpecie arundini magnę ſimilis, interiorē ſubſtantia ualde diſſi-
 milis. Pulpoſa enim eſt, grauis, mollis, & ſucci plena: quum arundo e contrario ſit leuis, dura,
 uacua. Quare ſi iſta cum antiquorum Saccharo contuleris, nihil quod eidem conueniat, depre-
 hendes. Nam cum antiqui omnes Saccharum ſuum, ut paulo ante diximus, mellis materiam
 ac roſę eſſe fateantur, certe ab eo tam diſſert Zucchari materia, quā planta diſſert ab aqua. Forma
 deniq; quam illi adſcribunt, minime huic noſtro congruit. A Dioſcoride enim ſalibus, quo
 ad conſiſtentia concretionemue ſimile, ac dentibus, ſalis inſtar, perfringi dicit, & a Plinio gum-
 mi modo candidum. Noſtrū uero, priuſquam coquatur, colore potius nigricās, & ſubruiſſum,
 quam candidum inuenies: nec dentibus fragile, ſed per ſuctum, non per dentium attritionem de-
 giutiendum. Efficies quoq; noſtri primum eſt forma ipſa plantę: ſecundum artifex calore i-
 gnis coquens & deſecans: & demū in hanc, quā uidemus metę formam in ligneis quibuſdā uas-
 culis deducens. Antiquorum autē Saccharū noctis primo frigus adglutinat, dehinc ſuperueni-
 ens ſolis calor obdurat. Noſtrum etiam plantę pulpa in Sicilia & Canarię inſulis continet, effi-
 gie tantum arundini ſimilis. Illud ſupra arundinis uerę folia in India ſœlicię Arabia, & monte
 D Libano, teſte Galeno, libro tertio de alimentis, cap. 18. & Alexandro Aphrodiſieo, coagularum
 inuenitur. Noſtrum gulę proceribus ſuauiſſimas dapes miniſtrat, illud ad medicinę tantum u-
 ſum, Plinio ſcribente, uenit: & ut docet Dioſcorides, *uſus eſt*, id eſt, uentriculo bonum exiſtit.
 Noſtrum potius peſtori quam uentriculo utile experimur. Illud poſtremum non ſiticoſum,
 teſte Paulo, ſicut mel: noſtrū uero non minorē ſitim quam mel facit. Quis eſt iam, qui Saccha-
 rum antiquorum, & Zuccharum noſtrum eſſe res diuerſas ambigat: quando forma, materia,
 efficiētia, loco, uiribusq; longe euariant.

DE CISTHO, SEU LADANO. Cap. XIII

AVuicenna. 2. Can. cap. 42. de Laudano ſic ſcribit: Laudanum eſt humiditas pendens in pi-
 lis caprarum paſcendum, & barbis earum, cum paſcunt plantam, quę nominatur Cuſus. Qui
 bus ſane uerbis Auicenna innuit, Laudanū eſſe ſpeciem Cuſi, id quod & cap. 172. maniſteſtius in-
 dicat, dum inquit: Et una quidē ſpecierum eius eſt, quę nominatur Laudanum. Cuſum autē
 Auicenna corrupto uocabulo pro Ciſſum poſuit. Miſcuir autem & hoc capite Auicenna He-
 derę uires cum alterius herbę, quę Ladanum fert, uiribus, id quod perſpicuum erit, hoc caput
 de Cuſo conferenti cum capite de Ciſtho apud Dioſcoridem. Serapio quoq; haud aliter quam
 Auicenna de Laudano ſcribit, dicens: Laudanum colligitur ex una ſpecie Ciſſi. Ex quibus etiā
 uerbis maniſteſto deprehendimus, eundem perinde ac Auicennam Hederę naturam, quę Grę-
 cis *uſus* dicitur, non ſatis cognouiſſe: nec enim a Ciſſo, hoc eſt, Hederā, Ciſthon herbam Lada-
 niferam ſecernere potuerunt, ſed non minis uicinirate decepti, quę Ciſtho debentur, una tantum
 mutata litera, ad Ciſſon tranſulerunt. Nam pingue illud, quod a Lada herbā, quę Gręcis etiā
uſus dicitur, Ladanum nuncupatur, barbis hircorum adheſcit, non de Ciſſo ſiue Hederā, ſed
 de Ciſtho, quemadmodum Dioſcorides, Galenus, Paulus, & alij ueteres uno conſenſu tradunt
 colligitur. Dioſcorides enim libro primo, cap. 119. de eo in hunc modum ſcribit. Eſt & alterum
 genus Ciſſi, quod Ladan a quibuſdam dicitur, frutex Ciſtho ſimiliter naſcens, longiora tantū
 nigrioraq; folia habet, quibus per uer pinguitudo quędam, quę adſtringendo ſit, inhæret, o-
 mnibus quibus & Ciſthus accommodata. Fit ex eo Ladanum, folia eius paſcentes hirci capręq;
 pinguitudinem barbis & femoribus, quoniam uiſcoſa ſit, inhærentem reportant, quam depe-
 dentes per colū liquant, ſeruantq; in offas conformatam. Galenus etiā lib. 7. ſimpliciū medica-
 mentorū cap. 27. ita de Ciſtho ſcribit: Ciſthos in calidioribus quidē locis generat. Fit autē ex eo
 Ladanū medicamentū. Accedit Paulus Aegineta, qui non aliter quā prædicti de Ladanō diſſe-
 rit, cuius hæc ſunt uerba. Ladanū ex Ciſtho, quā Ladona uocant ſit. eſt uero in Cypro. Iam con-
 ſyderandū, quo pacto fieri poſſet ut ex Hederā colligeretur, fieretue Ladanū, quando in Cypro

insula, si Theophrasto grauissimo auctori credimus, nec Hedera quidem nascitur. Est igitur Cisthus uel Lada, siue Ledon, non autem Cissos, id est, Hedera, cuius flore de pascito, Ladanum hircorum barbīs adhærescit. In hoc equidē errore, quemadmodū in multis alijs, fuit auctor Pandectarum, qui uolens forte Auicennam tueri, Hederae nomen aliquanto etiam, quam cæteri, fustius accepit, adeo ut omnem herbā, quā capræ libenter uelcerentur, ab edendo Hederam appellari posse, non tam doctē quā fulte arbitraris sit. In eundē errorē incidit & Plinius (utriusque enim historiam confundam) hæc Cisso tribuit, quæ Cistho Dioscoridis ac reliquorum probatissimorum testimonij conueniunt. Plura ea de re offendes apud Nicolaum Leoniceum, nunquam laudatæ eruditionis hominem, in eo libro, quem de Plinij erroribus ædidi.

DES V C V T O. Caput .xv.

A Vicenna secundo libro sui uastit Canon. cap. 615. ait: Semperuiua est Sucutum. Et cap. 642. dicitur, quod Sucutum est Semperuiua, & dicitur, quod est species feminis Mandragoræ, & dicitur aliud. Ex quibus satis constat, igno- rasse Auicennā, quid esset Sucutum. nam uarias de eo sententias afferens, uni præ alijs non inhæret, sed solum refert alios existimasse, quod esset Semperuiua, alios Mandragoræ cuiusdam semen, alios aliam rem, nihil tamē interim certi in re tam dubia pronuncians. Id quod fecit quoque Fen. 10. Canone. 3. Tractat. 4. cap. 6. de spū sanguinis curatione in hac sententiam scribens; Sucutū est Semperuiua; & scripsit uir quidam in suis aggregationibus esse calamenti speciem, nascentem inter lapides. Quid, quæso, certi ex ambigua illa descriptione uenerit medicæ professionis studiosus? Ah respiciant tandem, qui Auicennā sibi tanquam idolum erexerunt, quicquid ab eo dissentire, piaculum ducunt, cognoscantque non solum in hoc auctore omnia dubitationibus esse plena, sed & omnes eius libros, secundum præsertim, in quo de simplicibus medicinis tractat, innumeris scaturire erroribus, quorum magnā partem hoc libro attingimus. Sucutū uero nec est Semperuiua, nec semen Mandragoræ, nec species calamenti, sed est Dioscoridis ac aliorum ueterū Symphytū, id quod dīscidū admodū erit, si quis Auicennæ caput de Sucuto, cū capite Dioscor. de Symphyto comparauerit. Auicenna namque Sucutū in hunc modū describit: Sucuti duæ sunt species, una petraea dicta, alia non petraea. In ipsa est humiditas calida temperata, & tenuitas, habens odore & dulcedine quandā, cuius aqua saluā attrahit, & conglutinat partes carnis in uase. Dioscor. uero lib. 4. ca. 10. hæc de Symphyto uerba. Symphyton cognomento petraū, nascit in petris, ramulos habet Origano similes, graciles, folia, capitula ut thymi, totū est lignosum & odoratū, dulceque gustu, & saluā prouocans. Radicē habet longā, subrustam, digitali crassitudine. Carnes etiā cum coquant, constipant. Haud aliter Plinius lib. 27. cap. 6. Symphyton depingit. Alum, inquit, nos uocamus, Græci Symphyton petraeum, simile cunilæ bubulæ, folijs paruis, ramis tribus aut quatuor a radice, cacuminibus Thymi, furculiformi, odoratū, gustu dulce, saluā ciens, longa radice, rutila; nascitur in petris, ideo petraeum cognominatū. Radix carnes, cum coquantur, conglutinat addita. Ex istis iam luce meridiana clarius est, Sucutū cum Symphyto idem esse: utriusque enim descriptio- nes conueniunt, adeoque errasse Auicennā, certū est, eo quod Sucutū idē quod Semperuiuū esse dixit, quando Sucuti descriptio nihil commune habeat cū Semperuiui descriptione, ut constat cap. 1. lib. 4. Dioscor. de Aizoo, seu Sedo maiore legendi: uerum singula eius descriptionis Symphyto magis, quam Consolidā uulgo uocant, conueniunt, quam uel Semperuiuo, Mandragoræ, aut Calamento, ut ex eorundē descriptionibus, quas consulo præterimus, elucescet.

In Auicennā

Sucutum.

DE MEZEERBONTE, SEV

CHAMAELEA Caput .xvi.

Primū omnium, ut errorē hunc probe conuincamus, Arabum descriptiones more nostro præmittamus, ex quibus liquido monstrabimus, eosdem toto cœlo errasse. Inter Arabes autem Auicenna lib. 1. cap. 467. de Mezeeron in hunc modū scribit: Mezeeron est lactiniū magnum, quod est duorum modorū, unū eorum est, magna habens folia & spissa, & hoc est deterius am- borum; & quod nigrum est, perniciosum existit. Melius Mezeeron est, in quo sunt folia pluri- ma, & similia folijs oliuæ, & subtiliora. Est acutum excoriatiuū, & eius acrimonia est uehemens. Melue uero in suo de simplicibus medicam. libro ita tradit. Mezeeron est planta, uocata apud Persas rapiens uiram, cuius folia sunt similia folijs oliuæ, sed maiora. Est & planta lactiniū maiorum, cuius species sunt plures. Est enim quedā magna habens folia, & subtilia. Est & par- ua habens folia sicut folia oliuæ, & spissa nimis; & est folia habens crispa & aspera; & ex eis aliud est colorem habens uiridem, & aliud habens colorem subnigrum. Serapioni per omnia ferme cum prædictis conuenit, nisi quod ex genere lactariarum herbarum non facit. Ex quibus collige primum plantam, quæ ab Arabibus Mezeeron nominatur, Græcis esse eam, quam Chamæ- leam uocant, ut constat, conferenti caput ipsū de Chamælea apud Dioscoridē descriptum,

B

Cum ijs, quæ de Mezereon ex Arabū sententia iam retulimus, Dioscoridis enim lib. 4. cap. 162. de Chamælea hæc sunt uerba. Chamælea dodrantes habet ramulos, frutex furculosus, folia habet oleæ familia, tenuiora tamen & frequentia, amara, gustum erodentia, & scarificantiæ fauces. Hæc omnia Arabes suo adscribunt Mezereon, adeo ut nullus, nisi talpa cæcior sit, non uideat Mezereon Arabum, esse Græcorum Chamæleam. Quæ ideo hoc nomen apud Græcos sortita est, quia habet folia familia oliui. Secundo ex Arabum descriptionibus collige, Auicennam & Mesuren in duplicem incidisse errorem. Primus est, quod Mezereon inter lactaria connumerant. Secundus, quia Chamæleonem herbam cum Chamælea siue Mezereon confundunt, quarum tamen non modo nomen, sed etiam naturæ ratio diuersa est. Non esse autem Mezereon inter lactarias herbas collocandum, ex Dioscoride in primis manifestū sit, qui suæ Chamæleæ nihil tale tribuit. Præterea si herba esset ex habentibus lac, aliquam esse speciem Tithymalorum consequeretur, aut aliam quandam lactariam herbam, quorum tamen neutrum recte dici potest, ut constat ex Dioscoride, singulas Tithymalorum species, ac herbas reliquas lactarias describente. Quod uero multa Mezereon seu Chamæleæ tribuerint Arabes, quæ magis Chamæleoni conueniant, probari potest ex his, quas ipsi suo Mezereon adscribunt proprietatibus. Nam quod primū plures eiusdem faciunt species, album aliquod esse dicentes, aliquod uero nigrum, hoc nihil ad Mezereon attinet, Nigrum enim & album non sunt Mezereonis, id est, Chamæleæ fructibus differentię, sed Chamæleonis herbe aculeatę, cuius duo quidem genera, alterum albi, alterum nigri discrimine non modo a Dioscoride, sed etiam a Plinio distinguitur: immo ab ipso quoq; Serapione, qui postea in alio loco & capite diuerso de Chamæleone albo & nigro eadem fere scribit, quæ de ambobus Dioscorides: neq; tamen meminit se de eisdem herbis, capite de Mezereon fecisse mentionem, cuius tamen simplex species est secundum Dioscor. Plinium ac Paulum, qui omnes Chamæleonem album & nigrum sui generis herbas fecerunt, a Chamælea, id est, Mezereon differentes. Hunc eundē errorem repetens Auicenna. 2. Canon. cap. 177. Chamæleon, inquit, est species de Mezereon nigra, mortifera. Idem insuper Auicenna capite de Mezereon, proprietates eius enarrans, in hæc scribit sententiam. Omnes species administrantur ad morphæam, & albas, & ad lentigines, linitæ exterius, & quandoq; admiscetur ei sulphur. Colluitur os cum decoctione eius, & proprię decoctionis nigri, & sedatur dolor dentis. Quæ singulę proprietates a Dioscoride libro tertio, capite decimo, non Chamæleæ, sed Chamæleoni nigro tribuuntur. Eius enim de Chamæleone hæc sunt uerba. Potest concisa radix, addito exiguo atramento tutorio, Cedrinusq; oleo, & Axungia, scabies exterere, Abstergit & impetigines, admixtis sulphure & asphalto, in aceto cocta & inuncta. Colluitur decoctio eius utiliter in dolore dentes. Subiungit Auicenna, quod omnes species Mezereon administrantur ad impetiginem & ulcera fordida cum melle, & eradicant cortices. Hoc quoq; dictum, ut præcedens, falsum est, quia ista proprietas purgandi ulcera fordida, & quæ Elscharā habent cum melle, non est Chamæleonis albi nel nigri, quos eodem capite Auicenna falso innuit esse species Mezereon, sed Chamæleæ tantum, ut habetur ex Dioscoride, cuius hæc de Chamælea uerba. Repurgant cum melle concisa folia, fordida, & quæ crustas contraxerunt, ulcera. Quæ deinde sequuntur apud Auicennam, ea Chamæleoni albo conueniunt, sicut est educere lumbricos, contra ferre hydropisim, & reliqua. Testis est Dioscorides, qui hæc omnia Chamæleoni albo adscribit, inquiens. Radix Chamæleonis albi acerbuli pondere pota, latos uentris lumbricos pellit. Datū & contra cutem subeuntes aquas utiliter drachmæ pondere cum uino: extenuat enim ac minuit eas. Hunc errorem continuans Auicenna Fen. 6. Can. 4. Tract. i. Summa. 2. cap. 7. accidentia atq; remedia, quæ Chamæleoni nigro, radici uenenatæ a Paulo Aegineta assignantur, ipse ad Mezereon, id est, Chamæleam transfert. Nec eius erroris expers fuit Mesue: is enim non aliter quam Auicenna, cuius simia existit, Mezereon adscribit, quæ debentur Chamæleoni: scribit enim interficere lumbricos, collutionemq; eius ex aceto conferre dolori dentium, & fieri ex eo unguentum bonum ad scabiem: quæ singula a Dioscor. Chamæleoni albo & nigro tribuuntur. Nihil yero horum conuenire Mezereon, siue Chamæleæ, ex Dioscoride liquet, qui uirtutes eius proprietates breuissime his uerbis complexus est. Purgant per inferna folia eius pituitam & bilem, maxime si deglutienda dantur, uni foliorum parti duabus absinthij mixtis: conformatur autem aqua mullā in pillulas. Non conficiuntur in stomacho, sed qualia sumpta fuerunt, excernuntur. Iam arbitror, ad tædium usq; ostensum est, aberrasse in Mezereon descriptione Arabes, commodum itaq; ut ad alia festinemus.

DE CICUTA, & NAPELLO. Cap. xvii.

EX hoc errore deprehendent, manifesteq; agnoscent ueritatis amatores, quanta in caligine uerterentur hi, qui mordicus tenent Auicennam, uniuersaq; medicinæ principem statuunt: a omnia quæ idem scripsit sine ulla rationis examine, pro uero admittunt: adeo ut non immerito quis forem humanam deplorare posset, quod tot seculis mirum in modum sub Auicennę pla-

Proprietates
Mezereon.

D

placitis periclitata sit. Certum enim est, Auicennam nihil eorum quæ scripsit, explorasse. Rex enim fuit, & curandis infirmis operam non dedit, transcriptorum tantum Aliabatis ac Rasij, aliorumque fuit. Proinde ubi suis uelis nauigare tentauit, mox nauem impexit, ita ut recte admodum Ambrosius Leo Nolanus, non obsecrare uir, de eodem sic pronunciauerit. Auicenna dum res naturales ingenio proprio tractare aggressus est, usque adeo argutule disputauit, ut pro sperata gloria, mali philosophi nomen adeptus sit. Et hæc uera esse, sentient omnes, qui ea quæ de Cicuta & Napello scribit, exacto iudicio trutinauerint. Animaduertendum itaque, Succaram apud Auicennam eandem esse cum Cicuta: eosdem siquidem Succaram tribuit effectus, quos Cicuta Dioscorides. Libro enim secundo, cap. 671. Succaram in hunc modum describit. Crux huius plantæ est, sicut crux ferulæ, & habet florem album, & semen ficut Anisum. Dioscor. uero lib. 4. cap. 73. Cicutam ita depingit. Cicuta geniculatum profert caulem, foeniculi modo, & grandem. Folia ferulæ similia, angustiora tamen, & grauiter odorata, in acuminibus & umbellis habet, florem subalbidum, semen simile Aniso, sed candidius. Quis est iam, qui collatis utrorumque descriptionibus, Succaram esse eandem cum Cicuta non uideat? Verum Auicenna tanquam parum sibi constans, descriptione ista non contentus, Succaram aliquando folijs cucumeris, aliquando mandragoræ, iuxta diuersorum authorum opiniones constare tradit. Eandem etiam nunc Euphorbium, nunc Alpharphas, & nonnunquam Hyoscyamum nigrum uocat. Nam Fen. 6. cap. 4. tract. 1. cap. 2. ubi de uenenis agit, Cicutam non Succaram, sed Alpharphas appellat, existimatque esse Napellum, aut uenenum interficiens hominem, & non interficiens turdos. Quod & 2. Canon. cap. 503. de Napello facit: cornucines tamē pro turdis nominat, dicens: Cornucines ex eo cibantur, & non moriuntur. Quæ equidem Galenus lib. 3. de simplicib. medica. distin. 4. cap. 1. non Napello & turdis, sed Cicutæ & sturnis adscribit, cuius hæc quidē uerba sunt. Cicuta hominem sane interficit, ob meatuum latitudinem, & caloris abundantiam, ac propter magnam quam habent arteriæ in attrahendo uim, pollens adhuc pertingit ad cor: non exanimat uero sturnos ex contrarijs causis. In eandem quoque sententiam scribit Galenus lib. 2. de alimentis, cap. 4. dicens. Cicuta sturno nutrimentum est, homini uenenum. Quamuis ut obiter dicam, antiquus interpres perperam semper pro sturnis, turdis uerterit. Id quod & Alexander Aphrodisæus in proœmio suorum problematum indicat, inquit. Veratro cornucines, Cicuta sturni uescuntur, quæ toxica hominibus esse certum est. Videmus itaque manifestissime, Auicennam Napello tribuisse, quæ ex autoritate omnium ueterum debent Cicutæ, quæ etiam nostri seculi medicis imitantes, de Napello constanter affirmant, quod nulla experientia habent comperit. Quod autem Cicutā Hyoscyamū nigrū nominat, id manifestū sit ex capite Fen. 6. canon. 4. tract. 1. summa. 3. Vbi omnia signa quæ scribuntur ab Auicenna in eo, qui hausit Hyoscyamum nigrū, ac contra idem ueneni remedia non sunt alia, quæ quæ in Cicuta Dioscorides notauit. Auicenna namque ita ait: Accidit ex eo præfocatio & frigus extremitatum, & tensio uehemens præfocans, & tenebrositas uisus, & forsitan non uidet aliquid, & destruit imaginationē, & in frigidat extrema, deinde spasmat & præfocat & interficit. Cura. Administra in primis clysteria & uomitū, & uentris solutionē: deinde da in potu de uino puro aliquid post aliquid: quoniā est magni uiuamenti cum eo quod bibit & absinthium: & detur in potu piper cum uino, similiter castoreo & ruta, & c. Dioscor. uero libro sexto, cap. 11. in hunc modum. Caliginē uertiginēque oculis tantas Cicutę potus affert, ut nec minimum uidere liceat. Singultus itidem, mentis alienationem, & extremarum corporis partium perfrictiones. Postremo conuulsione stragulantur, cessante a motu omni in arterijs spiritu. A principio igitur, quemadmodum in alijs decretum est, uomitionibus eam educemus: mox exinanitione hac facta, delapsam in intestina eius partē purgabimus, tuncque ueluti ad efficacissimum remedium, Meracas uini potiones transibimus, per interuallantes, & in interuallis his asininū bubulumue lac, uel absinthium cum pipere, castoreoque, aut rutam, & c. Ceterum nō cognouisse Auicennam, Napellum, ex multis colligi potest. Primo, quia signa, quæ ab Auicenna ponuntur, in eo qui hausit Napellum, sunt eadem quæ, quæ a Dioscor. scribuntur in ijs, qui toxicum biberunt: id quod dulcide eorumdem uerba monstrabunt. Auicenna enim Fen. 6. lib. 4. capite primo, ita de Napello docet. Napellus est ex deterioribus, & accidit potanti ipsum, ut apostemē labia ipsius, & lingua eius, & frequentes sunt super ipsum uertigo & syncopis, & ex eo raro euadunt, ex eiusque succo tingunt sagittæ. Quæ omnia Diosc. libro. 6. capite. 10. non Aconito, quod idem cum Napello est, ut diximus supra, sed toxico adscribit, inquit. Toxicum creditur ideo appellari, quod barbari sagittas telaque sua eo inficiunt. Sequitur potantes linguæ labrorumque inflammatio, insaniaque, quæ coerceri non possit, uarias immittens imagines: quo fit, ut difficillima curatione sanentur, raro in columes euadant haurientes. Hoc autē ueneni genus Auicenna, oblitus quod antea de eo scripserit, mox infra cap. 39. corrupto uocabulo, pro toxico Tufom uocat, cuius se neque naturā, neque curam nosse fatetur: eosdem tamen in eo ex aliorum sententia tradit effectus, quos Dioscorides in toxico notat, ac quos

A
Auicenna in-
doctus & rha-
pfodus.

Succara.

Cicuta.

B



A paulo antea ipsemet Auicenna in Napello assignarat, adeo nihil penitus eorum, quæ scribit, mimitur ita ut deierare quis posset, hominē omni cerebro ac memoria caruisse, quod tam pugnantia non animaduertit. Secundo, non cognouisse Auicennam Napellū, & ex eo colligi potest, cum Napellus barbaris nihil aliud sit, quod Aconitū Græcis & Latinis; hocq; duplex est, autoribus Gal. lib. 6. de simplicib. medica. & Dioscor. lib. 4. cap. 71. unum *παρδαλιαν*, ab enecandis Pantheris sic dictum. Aliud *λυκοτρονον*, quod lupos interficiat, ita appellatū. Auicenna de ijs duobus generibus Aconiti eosdem secutus, Fen. 6. lib. 4. de uenenis, sub nomine strangulatoris Adip, id est, lupi & strangulatoris leopardi seorsum a Napello, tanquam res diuersa egit: quod nullo pacto fieri potuisset, si Napellum cognitum habuisset. Iam uideant Medici iuniores, quo pacto suum idolum, Auicennā tueantur, quem existimant concinno quodā ordine uasū illum suum Canonē texuisse, & si Dñs placet, uniuersam medicinam per compendii tradidisse posteris. Si em̄ diligenter ea, quæ de Napello ac Cicutā, ac multa alia, quæ de curandi ratione conscripta sunt, quorū partē in secundo Tomo prosequemur, examinassent, non ordinem & lucē, sed Cimmerias tenebras, ac confusum chaos offendissent. Verum, ueritatis studiosi facile ex uno errore æstimabunt, quantum in alijs sit fidendum Auicennæ, quem etiam, nisi iudiciū accedat ac delectus, consilius est perpetuo non attigisse.

¶ De i x o, seu v i s c o. Cap. .xviii.

Auicenna Fen. 6. Canon. 4. summa. 2. cap. 33. de Visco sub nomine Aldibic, ita em̄ Arabice appellatur, tanquā ueneno loquitur: eidem enim eadem fere signa atq; remedia attribuit, quæ Dioscor. in Ixiæ ueneni portione recenset, adeoq; deceptus nominū propinquitate, *ixō*, id est, uiscum pro *ixia* ueneno descripsit. In quæ etiā errorē Plinius incidit, idq; genus ueneni quod Græci *ixia* uocant, non semel, sed iterū atq; iterum Viscū appellauit. Quare inter iuniores quoq; non nulli falsi, putant tam Auicennā, quam Plinium loqui de Visco, quo aues decipiuntur. At fieri non potuit, ut aut Auicenna, aut Plinius Viscum aucupum inter uenena connumerarit. Auicenna siquidē lib. 2. cap. 72. de Visco tanquā salubri medicina, haud aliter quā Dioscor. lib. 3. cap. 95. plurima scribit, nullā dans in eo ueneni mortiferi notam. Non minus Plinius lbi. 16. cap. 44. accuratissime de uarijs Visci generibus scribens, tm̄ abest, ut Viscū uenentū esse dicat, ut in robore arbore natum, certa tamen religione decerpit, secundū Druidū opinionē, contra omnia uenena esse remedio astruat. Quare fateri oportet, utrosq; abusos esse uocabulo, Ixiū pro Ixiā accipientes. Et si hoc nomine possint a calumnia uindicare, non est tamen, quod reliqui Auicennæ errores, quibus in Ixiā multipliciter implicat, queant tollerari. Inter quos is primus est, quod eos esse factūs Thephisiæ tribuit, quos Dioscor. Ixiæ ueneno, quam tamen ab Ixiā sit diuersa. Verba autē Auicennæ Fen. 6. Canon. 4. summa. 2. tracta. 1. cap. 13. de Thephisiæ hæc sunt. Hæc est gummi rutæ montanæ, & quandoq; sentitur in sapore eius sicut sapor Albedarungi, & est calida, & accidit illi qui bibit eam, retentio eorum omnium quæ currunt ex utrisq; uis, & apostematur lingua, & accidunt rugitus & inflatio. Has notas uniuersas Dioscor. lib. 6. cap. 11. Ixiæ ueneno adscribit, in hanc sententiā differens. Ixiās, qui & Vlophonos dicitur, simile quiddam dum bibitur Ocymo in gustu & odore refert. Facit grauē linguæ inflammationē, insaniamq;. Cuncta corporis excrementa compescit, & cum defectu animæ intestinorum strepitus ac inflationes excitat, nec quicquā tamen excernit. Ex prædictis autē Auicennæ uerbis iterū res colligunt errores. Vnus est, quod falso Thephisiā gummi rutæ syluestris interpretatur: id quod nō solum hoc loco fecisse constat, sed etiā. 2. Canon. cap. 710. ubi inquit. Thephisiā est gummi rutæ agrestis. Quæ errorē deinde secuti iuniores omnes, Thephisiā passim ita exposuerunt. Verū si caput hoc secundū Canon. de Thephisiā exactius examinassent, ac cum cap. de Thapsia apud Dioscor. contraxissent, proculdubio intellexissent hoc nomen Thephisiā esse apud Auicennā deprauatum, & pro Thapsia scriptū esse Thephisiā. Vnde ex errore scripturæ falsā etiā expositio habuit originem. Potuissent autem ex eodem Dioscoride discere, Thapsiam alio nomine non rutā syluestre, sed ferulā potius syluestre appellari. Vide iam, quantum linguarū inscitia ad intelligenda autorū scripta obstit, adeo certe, ut non modo delyrenthi, uerūetiam insaniant, qui linguarum cognitionē medico non esse necessariam contendunt. Insuper, & si erroris ex falsa uocabuli tantū scriptura promanauerit, necessariū tamen erat, ut hunc indicaremus; quando non pauci sint usq; adeo morosi, qui ueterē hanc Auicennæ translationē cæteris omnibus præstare putent, citiusq; mori eligant, quam ab ista quicquā dissentire. Alter error qui ex prædictis colligitur, prioribus multo grauior est, quod sibip̄s Auicenna in Thephisiā contradicit. Nam in. 2. Canone. de Thephisiā scribit, quod in radice eius & corticibus ipsius & lachryma eius est solutio, hic uero de ea inter uenena tractans, ait. Et accidit ei qui bibit eam retentio eorū omnium, quæ currunt ex utrisq; uis. Quare cum solutio & retentio superfluitatū seu excrementorū, sint effectus contrarij, liquet manifestissime sibip̄s contradixisse Auicennam, Dioscor. autem lib. 6. cap. 33. Ta-

Ixiā.

Lignarum pericia, medico necessaria.

psiam inter ea enumerat, quæ salutis quidem causæ dantur, non tamen minora alijs uen-
 A pericula asserunt; Strangulationes facientes, aut ultra quam opus est purgantes. Non est
 itaq; ut Auicennâ quis ab errato uindictæ, quin apertissimam in eius uerbis esse contradictionē
 dicat. Tertius error est, quæ ex superioribus colligitur, quoniâ bis se de una eademq; rescriptisse
 sub diuersis nominibus non animaduertit. Nam cum paulo antea de Thephisia tanquā de Ixia
 scripsisset, iterū eodē lib. de eadem Ixia sub Aldibic nomine tractat, eosdemq; effectus quos su-
 pra Thephisia tribuerat, iam Aldibic, id est, uisco adscribit, id quod mox deprehendent, qui si-
 bi utriusq; capituli uerba contulerint. Intelligent & ex isto errore medicæ professionis candidati,
 q̄ passim ambigua scribat Auicennâ, de quo certe nihil mirandū; transcriptor enim tantummo-
 dorum fuit, omniaq; utuntq; sese obrulerunt, citra iudicium atq; delectum in unū corrasit,
 non aliud studens, nisi ut hoc pacto Canonē suū ad iussu uoluminis magnitudinē deduceret, nō
 curans utuntq; confarctati Centones sibi responderent, tanquam sua cæcis esset obrutusurus.

DE I S A T I D E . Caput .xix.

Q UOD præter tenebras nihil offundant Arabes, facile uidebunt, qui ea, quæ de Isatide scri-
 pserunt, diligenti iudicio perpenderit. Isatidē uero herbā, quam nostra æras Guadū
 appellat, esse eā, quā Arabes Nil, siue Nilech nominant, ostendunt ea, quæ de Nilech scripsit Se-
 rapio, nam ea fere omnia de Isatide satia & syluestri a Diosc. tradunt. Serapionis autē de Nilech
 hæc sunt uerba. Est & Nilech domesticus, & syluestris. Domesticus est ille, quo tinctoris utunt, cu-
 ius foliū est simile folio plantaginis, nisi quia est magis uiscosum, & fortioris nigredinis, & ha-
 bet stipitē longitudinis brachij unius. Sed agrestis assimilatur domestico, nisi quia folium eius
 est magis simile folio lactuæ, & habet ramulos longos, plures, graciles, cū multis ramusculis,
 quorū color tendit ad rubedinem, & in summitatibus ramorū sunt uaginulæ multæ similes lin-
 guis. Et est in eis semen, & habet florem parū, subtilem. Hæc omnia Diosc. lib. 2. cap. 74. de Is-
 atide quoq; scribit, inquiring. Isatis domestica, qua lanarum infectores seu tinctoris utuntur, foli-
 um habet plantagini simile, pinguius tamen & nigrius, caulem duobus cubitis altiore. Isatis
 uero syluestris satiaæ similis existit, folia tantū minora habet, ad lactuæ folia accedentia, cau-
 les graciliores, diuisiones multas habentes, rubescentes, in summo ueluti folliculos linguarum
 figura multos pendulosq; habentes, in quibus semen est: florē fert luteū & gracile. Adde quod
 B Isatidē Græcorū esse Nil Arabum, colligitur etiā ex Auicenna. ij. Canon. cap. 75. ubi eidem hos
 tribuit effectus, quos Diosc. suæ Isatidi. Eius inquit, aliud est domesticum, aliud uero syluestre,
 cuius operatio est operatio domesticæ. Est stipiticū, & prohibet fluxū sanguinis, detumescere facit
 apostematā, & conserit exituris malis in membris duris, conuenit Erysipilæ, bonū est ulceribus
 puridis. Dioscorides singulos hos effectus Isatidi adscribit, dicens. Possunt Isatidis folia illita
 omnes tumores, tuberculaq; discutere, cruenta uulnera glutinare, sanguinis eruptiones sistere,
 phagedænica comedentiaq; & serpentina, sacros ignes & exedentia sanare. Cæterū etsi ex Dio-
 scor. sententia Nil seu Nilech Serapio atq; Auicennâ descripserint, tamen id non cognouisse, ex
 eo arguunt, qd̄ ancipites in eadē depingenda fuerunt. Serapio nanq; prædictā notificatione nō
 contentus, asserit etiam aliorū autorū sententias, quorum aliqui Nilech habere florē Coriandri,
 aliqui folio phaseolorū constare dixerunt. Quas equidē opiniones facile improbare potuissent,
 si herbā ipsam non tam ex aliorū scriptis, quam ex seipso cognitā atq; perspectā habuisset. Et ne
 quis meū esse commentū putet, ecce Serapionis uerba subiiciā quorū hæc est sententia. Nilech
 est arbutū puluerulentum, eleuaturq; cum stipite suo longitudine unius brachij, & habet ger-
 minā ramorū. In summitate sua est flos, sicut flos Coriandri. Et iterum. Est planta habens foliū
 longū, plusquam foliū salicis, & assimilatur folijs faseoli coloris auri. Auicenna quoq; etsi ea-
 dem de Nil scripserit, quæ de Isatide Dioscor. ut paulo supra patuit, quoniâ eodem modo diui-
 dit in satiam atq; syluestrem, easdemq; fere uires huic tribuit, quas Diosc. Isatidi, cum tamen
 ipse etiā de ea tribus in locis sub Nil uocabulo scribat, merito suspicionem asserit, se etiam tin-
 baste atq; fuisse ancipitem, quid nam Isatis esset. Nam. 2. Canon. cap. 127. ita scribit. Quasi-
 ment est foliū Nil, in ipso est stipiticus & absterio, tingit capillos. Quæ uniuersa quoq; paulo post in
 capite de Nil de eodē folio scribit, ob id reprehensione carere non potest, quod frustra de eadem
 re in diuersis capitulis tractat. Plurimū præterea a Dioscor. ac ueritate discrepant, quæ idē Au-
 cenna cap. 306. de grano Nil in hunc modū scribit. Granū Nil est Cartamū Indū. Item solutio-
 ne educit humores crassos, multaq; alias proprietates subinfert, quæ nihil ad Isatidem pertinent,
 pro qua Nil cap. 716. retulerat. Quæ iterū suspicionē augent, Auicennâ Isatidē non cognouisse.
 Non præterire ualeo hic crassum Pandectarj errorē, apud quem in eisdem rebus nominibusq;
 mira est colluuiū. Nam falsum admodū est, quod docet Nigel Arabice dictum, a Græcis Nes-
 me, a Latinis autem Indiciū appellari. Nesme enim æque ut Nigel barbarū est uocabulū, Indiciū
 uero tam Græcorū quam Latinorum aliud multo ab Isatide est, ut uidere licet apud Dioscoridē
 & Plinium, Dioscor. enim libro 4. cap. 61. inter lapides connumerans Indicum, ita de eo tradit.

B Indici nominati lapidis duo sunt genera. Alterū quidē sponte sua nascitur in harundinibus Indicis spumę modo erumpens. Alterum, quod insectiuum uocant, ueluti flos purpurę æris cortinis supernatans, quem despumantes infectores, siccant. Plinij autem, Dioscoridem imitantis, lib. 33. cap. 6. de Indico hæc sunt uerba. Ab hoc maxima autoritas Indico. Ex India uenit harundinum spuma adhærescente limo, cum teritur nigrum. At in diluendo mixturam purpurę cœruleicę mirabilem reddit. Alterū genus eius est in purpurarijs officinis innatans cortinis. Ex istis satis apparet, quantū Indici ab Issatide differat. Insuper idem Pandectarius alio in loco, in litera uidelicet β, Olatidē uel potius Issatidem & Borith Gręce, Arabice autē Agisdo, Latine uero Saponariam, uel herbam fullonū, eandem herbam esse docet, at mendacissime. Nam Issatim, quā ipse uiosę Olatum uocat, non esse herbam, quam Græci Struthion, Latini radicūlā suę lanarum herbam, eo quod fullones ea in purgandis lanis utuntur, appellant, satis constat ex Dioscor. qui de eisdē in diuersis capitibus, tanquā natura & uiribus distantibus tractat. At nihil mirū, uirū hunc tam absurda scripsisse, qñ fere ubiq; mendacissimum reperiat. Iam satis superq; monstratū est, Issatidē non satis perfectā fuisse Arabis, ideoq; ne in resatis aperta plus æquo immoremur, hic de Issatide finem faciemus. Plura si legere anhelat animus, uide quæ scribat Nicolaus Leonice, diligentissimę lectionis, & exquisiti iudicij uir, in epistola ad Angelū Politianū, ex quo certe, ut ingenue fateor, non pauca toto hoc uolumine mutuatus sum. Quem ob id etiam impiū duxerim, sua laude frustrari, quod is ferme primus fuerit, qui medicinā a barbarorū fordibus, innumerisq; erroribus uindicauerit, dignus hoc nomine, ut docti eundem certatim multis laudibus euehant.

Nic. Leonice
nirudicio.

DE CALAMENTO. Caput .xx.

A Vicenna. 2. Canon. cap. 179. Calamentū hunc in modum describit: Calamentū aliud est fluiale, & aliud montanum, simile hyssopo in sapore, & similiter folia eius sunt ei similia. Et est alia species eius, quæ nominat Alhauū. Et est quædā species eius, quæ uocatur Calamentū hirci. Et montanū est fortius fluiali. Ex his Auicennę uerbis nemo nō, nisi talpa cæcior sit, cernit eundem errasse, quando sub Calamenti nomine de omnibus Origanis speciebus pertractet, id quod sole clarius monstrabit Diosc. qui lib. 3. cap. 30. Origanū, & non Calaminthen ad Auicennę præscriptum depingit. uerba eius hæc sunt. Origanum Heracleoticū, sunt qui Cunilam uocant, folium Hyssopo simile habet, non tamen umbellā rotę figura, sed multifidam, & ueluti diuisam. Semen illi in summis uirgis non densum durumq; est. Quę uero Onitis dicitur, candidior folijs est & Hyssopo magis similis, habetq; semen confertorū corymborū modo. Tragoriganum autē frutex est exiguus, Origanum, Serpilloue agrestis folijs & ramulis similis. In eum modū quoq; de scribit Origanum Plinius lib. 20. cap. 17. dicens. Origanum, quod in sapore Cunilam emulatur, plura genera in medicina habet, & Onitin uel Prasion appellant, non dissimile Hyssopo. Tragoriganon simile est Serpillo syluestri. Quod autem Auicenna utriusq; hoc est, Calamenti & Origanis, uires miscuerit, facile deprehendent, qui eiusdem de Calamento caput, cum hīs quæ Dioscor. de utrisq; scripsit, contulerint. At ne ueritatis cupidi quid desyderent, ecce nonnulla conferemus, ad quorū exemplar reliqua dijudicabunt. Auicenna inter cætera de Calamenti uiribus sic scribit. Fit balneatio ex decoctione montani ad pruritū & scabiem, & quandoq; separatā iustitia: & confert hydropisi, quando comeditur cum ficibus. Et solutione educit cholera nigrā, & confert ulceribus oris, & extrahit superfluitates ex utrisq; naribus. Hęc singula Dioscor. testi monio nō Calamento, sed Origano debentur. De Origano enim scribens, sic inquit. Calefacit Origanum, prodest ad conuulsa ruptaq;, & cutē subeuntes aquas cum fico comesta. Bibit eadē siccata acerabuli mensura cū mulla aqua nigram bilē per inferna trahens. Pruriges itidē, scabies, & suffusus selle emendat decoctū eius his, qui eo lauantur. Succus etiam uirentis, tonsillas, columellamq; oris ulcera sanat, & cum Irino oleo infusus naribus per eas purgat. Sunt & præter has proprietates alię, quas Auicenna Calamento adscribit, quę tamen Diosc. Tragorigano tribuit, qualia sunt hæc. Sedare nauicam, extenuare lienem, conferre stomachi doloribus & conturbationis: sicut animaduertet is, qui Dioscor. de Tragorigano scribentem legerit. Præterea sunt non pauca etiam, quę uerā Calaminthi, quam Romani Neperā uocant, conueniunt, sicut sunt ista. Quando bibitur, aut ex eo fit emplastrū, confert puncturę uermium uenenosum, eius decoctio prouocare urinā, confert spasmus, & dilatationi anhelitus, dolori pungiuiuo uentris, & cholericę passioni & rigori. Et quando præmittit & bibitur cū uino, expellit uenena mortalia, interficit uermes: & quādo comedit & bibit post ipsum aqua casei diebus continuis, confert elephantię, &c. Has em̄ uires singulas ex ordine Diosc. lib. 3. cap. 39. Calamiuthi adscribit, dicens. Calaminthę succurrit pota aut emplastrū modo imposita serpentium moribus, Vrinam pellit potū eius decoctū, opitulatū ruptis, conuulsis, in spiritibus difficultate & non nisi recta ceruice spirantibus, torminibus, bilis profluuiū, & febrium algori, Contra Ictalia uenena præpota cum uino

facit, restituit suffulos selle, uentris lumbricos cum sale & melle pota necat, elixa crudaq; trita, prodest & elephantis. Proinde non est, quod quouis pacto Auicenna ab errore uindicari queat, neq; enim de solo Calamento hoc capite scripsit, quando multa sint in eodem, quæ Origano conueniant; neq; in nomine tantum peccatum est: puta, quod Calamentum pro Origano scriptum interpretis incuria fuisset, sunt enim non pauca, ut demonstrauimus, quæ ex Dioscor. auctore Calamintini debentur. Sed quid multa: solent fere omnia Auicennæ esse dubitationibus plena.

DE HE L X I N E, A L S I N E,

M Y O S O T I D E, & A N A

G A L L I D E. Caput .XXI.

Differre non solum natura, sed & figura quatuor has herbas, ostendit non solum Dioscor. sed Galenus atq; Plinius, qui singuliseorsum istas depingunt: quod euidẽ non fecissent, si eadem figura aut natura non distare perspectum habuissent. Hoc non animaduertens Auicenna, eadem Can. 2. cap. 18. sub Auriculæ muris nomine confundit. Nec potest ab errore uindicari Auicenna, quod Alfine & Myosotis, quæ proprie auriculæ muris dicitur, ac Anagallis, quia folijs murium auribus similibus constant, merito auriculæ muris nomine nuncupari posuerint. Nam hoc utcumq; de tribus istis dici possit, de Helxine certe, quæ Conuoluolus, ob id quod omnibus, in quas incidit, plantis circumuoluat, latine appellari potest: cuius folia, auctore Diosco. lib. 4. cap. x. & d. hederæ folijs sunt similia, dici nequaquam potest. Quod aut Anagallis sit diuersa ab auriculæ muris, fatetur metipse Auicenna, seorsum deinde sub proprio nomine de ea tractans, oblitus qd antea eius proprietates in auriculæ muris assignauerat. At ne uidear per calumniam falso reprehendere Auicennam, eiusdem uerba ex. 2. de Simplicib. Medica. libro in medium afferemus. Auriculæ, inquit, muris est herba, cuius uirtus secundum Galenum est propinqua uirtuti herbæ, qua uirtus abstergit. His uerbis proculdubio Alfinem innuit, quam Galenus & Dioscor. testantur similes habere uires. Galenus enim lib. 6. de Simplicib. medica. cap. 25. de Alfine in hunc modum scribit. Hæc est herba parua, & eius uirtus est similis uirtuti herbæ, qua uirtus abstergitur, hoc est, Helxini, quam nostri Parietariam nominant. Diosco. uero lib. 4. cap. x. & d. de Alfine ita tradit. Et in uniuersum eadem Helxine potest. Ita Plinius quoq; lib. 27. cap. 4. de eadem scribit, Alfine quæ quidam Myosoton appellant, nascitur in lucis, unde & Alfine dicta est. Vfus eius ad collectiones inflammationesq;. Quin emendar omnia quæ Helxine, sed infirmius. Subiungit Auicenna. Et hoc nomen concessum est duabus herbis, quarum una est, quæ nominat Galenus. Hæc quidem Auicennæ uerba uera sunt, non enim solum huic herbæ, quæ proprie Myosotis dicitur, auriculæ muris nomen conceditur, sed etiam Alfini, ut ex Plinio iam paruit & indicat Dioscor. ita scribens. Alfinem muris auriculæ aliqui dixerunt, quod murium auribus similia folia habet. Quod autem addit Auicenna, quod altera quam nominauit Dioscor. sit similis Volubili, nisi quia habet minora folia, hoc per omnia falsum est. Nam neq; de ea quæ proprie Auriculæ Muris uocatur, neq; de altera, quæ Alfine nuncupatur, dici potest: quando nulla earum sit Volubilis similis, nec in folijs, nec flore. Scribit tamen hoc de Helxine, quæ & Cissampelos dicitur, quod habeat folia Hederæ similia, minora tamen. Est enim duplex Helxine. Vna Mercurialis herbæ folijs & hirsutis, quæ a nostris dicta est Parietaria. Altera hederæ, in uinetis nascens, ideoq; Cissampelos uocata, & est Conuoluolus. Esse autem duas Helxines, dissimiles naturæ inter se non ostendunt, & post naturam antiquiores Græci, præsertim Diosco. Paulusq; Aegineta: qui priuatum seorsum quæ his uerbis utraq; in sexto egit. Helxine sunt, qui Perdicium, qui Parthenium, qui Siderium, qui Heracleam uocant. Vis eius est abstergens, & cum frigida humiditate aliqua sensim leniter quæ adstringens. Post hæc idem Paulus ait. Helxine, quæ Cissampelos dicitur, discutiendi uim habet. Primam describit Diosco. lib. 4. cap. 36. Et Plinius lib. 22. cap. 17. Secundum uero idem Dioscor. libro eodem, cap. x. & d. depingit. Post uerba paulo ante dicta, Auicenna ita ait. Et est herba expansa super faciem terræ, paruus habens stipites, & azulinos flores. Quæ utiq; Auicennæ uerba non conueniunt auriculæ muris, sed alteri Anagallidis generi: id quod testatur Dioscorides libro. 2. cap. 167. de Anagallide in hunc modum scribens. Duplex diuerso floris colore Anagallidis genus est. Habet enim altera cæruleos, quæ femina est, altera quæ mascula, puniceos flores. Breues sunt fructus in terra iacentes, folijs in quadrangulo caule paruus, & modice rotundus, Helxines figura, semen habet circinatum. Nec dissenti Galenus libro de simplicib. medica. ad Paterianum, cap. 24. dicens. Anagallidis duæ species. Vna cæruleo flore, altera quasi puniceo, uerum ambæ in alijs sibi similes. Sicut autem fructus humiles, folijs mollibus & pusillis, & subrotundis. Plinius quoq; lib. 25. cap. 15. nihil a superioribus quod diuersum sit, scribit, inueniens. Duo genera eius. Mas flore phoeniceo, femina cæruleo, non altiores palmo, fructe tenero, folijs pusillis, rotundis, in terra iacentibus: nascuntur in hortis & aquosis. Porro effectus, qui deinde ab Auicenna adnotant, hi Anagallidis proprii sunt, quemadmodum dum ait. Illa, quæ nominauit Dioscorides,

A

B

Helxine duplex.

B extrahit spinas & furculos, & facit adherere plagas. Hi enim a Dioscor. quoque tribuuntur Anagallidi, dum in eam sententiam scribit. Leniendi uis utriusque est, inflammationes arcent, furculos extrahunt. Eadem etiam proprietates Auicenna ipse, cum seorsum de utroque Anagallidis genere, cap. 33. sub proprio tractat nomine, Anagallidi adscribit. Adijcit tamen Auicenna superioribus aliam quandam proprietatem ex sententia Musaiach cuiusdam, quod scilicet eius iuuamentum est iuuamentum aphynthij: quæ certe non est Anagallidis, sed refertur a Paulo Aegineta de ea herba, quæ proprie Myosotis, id est, Auricula Muris dicitur a græcis, qui eam ad occidendos uermes adhibet. Ideoque clarum admodum esse arbitror, Auicennam in uno eodemque capite quatuor herbas naturæ & figura differentes, miscuisse, primum referens ea quæ Alsinii, secundo quæ Helxini, tertio quæ Anagallidi, & postremum quæ Auriculæ Muris conueniunt.

N De PEDE CORVINO. Caput. XXII.

Nemo miretur me Auicennam erroneæ medicinæ magistrum principemque statuisse. cur enim eo nomine non dignus sit, qui reliquis tur errandi occasiones in re medica præstiterit, non uideo. Vinam uero non tantæ aliquando forent, ut istis uita humana periclitaretur. ita enim conuenienti nonnunquam subesset ansa. Proinde cum illa errandi occasio, quæ Medicis iunioribus in herba Pedis coruini præbuit, tanta sit, ut sine uita humanæ ultimo discrimine tolerari non queat, merito & hic inter reliqua eius errata locum habebit. Nihil autem mirum, alijs errandi occasione deditse Auicennam, cum ipse, quid esset Pes coruinus, ignorarit: id quod non modo ambigua, ueritatem contraria, quæ de hac ipsa herba scribit, indicant. Canone enim, 2. cap. 367. de Pede coruino in hunc modum differt. Pes coruinus, Radix huius herbe cum decoquitur, confert solutioni uentris antiquæ. Et dixerunt, Paulus, & alij, quod confert colicæ, & efficit operationem hermodactylorum absque noimento. Quid per Apollinem obtestor, istis uerbis obscurius? quid denique magis pugnant? Si enim radix Pedis coruini solutioni antiquæ prodest, certe hermodactylorum operatione, qui sunt sauis in soluendo potentes, facere non potest. Idem insuper Auicenna Fen. 22. Can. 1. tracta. 2. cap. 8. Pedem coruinum non colicæ, sed podagræ potius, ex eiusdem Pauli sententia prodesse docet, ita scribens. Et dixerunt quidam, quod Pede coruino inest operatio hermodactylorum, & non est eius, nocere stomacho, Vtrobique tamē male Paulus super hac medicina. quæ facit operatione hermodactylorum, ab Auicenna citatur. Neque enim usquæ Paulus Coruinum Pedem hermodactylis comparat in iuuando podagricos, sed compositionem, quæ nominatur apud Græcos per Pede Coruinum, alteri præfert, quæ apud eosdem Græcos *δι' ἡμεδαυτῶν*, id est, per hermodactylos nominat, sicut uidere licet apud Paulum in septimo. Itaque ex ambigua ista atque falsa Auicennæ descriptione nihil certi uenari potest. Hinc est, quod tam uaria eiusdem interpretes de eadem herba pronunciauerint. Quod si uero prædicti expostores, ac tota etiam iuniorum Medicorum schola, cognouissent aliam esse herbam, a prisca ætatis Medicis Pede coruinum appellatam, aliamque a nostris, nunquam tam uaria, tamque dubia de ea scripissent. Ridiculum enim ferme est, putare herbam, quæ nostri temporis herbarij Pedem coruinum nominant, esse illam, quam ueteres Medici, Dioscor. Galenus, Plinius & Paulus sub eodem nomine celebrarunt, quasi sit necessarium, ut quæ nunc sunt nomina herbarum, etiam priori seculo fuerint. Et ut rem clarius demonstremus, annotandū, quod antiquorum Pes coruinus, Coronopus est dicta: hancque describit Dioscor. libro secundo cap. 117. in hunc modum. Coronopus oblonga herbula est per terram strata, & folia incisuris diuisa habet. Estur olerum modo decocta. Radicem habet gracilem in cibo adstringentem, ideoque coeliacis utilem. Nec aliter describunt Galenus libro septimo, de simplicibus medicamentis, cap. 42. Et Plinius lib. 22. capite decimonono inquit. Coronopus oblonga herba est cum filulis. Seritur interim: quoniam radix præclare facit coeliacis in cinere tosta. Est autem dubio procul herba illa, quam uulgo Capriolam, aut Sanguinariam, quod nabis apposita sanguinem eliciat: aut Pedem Galli nominant. Quam etiam sub galli cruris nomine describit Apuleius Madaurensis in libro de herbarum uirtutibus, cap. 44. in eum modum. Nasci amat herba Galli crus locis solidis, & circa uias, eius cacumen instar pedis galli. Non esse uero herbam hanc diuersam a Coronopode ueterum, testatur Dioscor. qui consimiliter admodum Coronopodē describit. Nascitur locis incultis, aggeribus & uijis. Iuniorum autem Medicorum Pes coruinus longe alia a priori existit herba: ea enim exulcerandi uim habet, & non adstringendi, quemadmodum antiquorum, atque adeo extrinsecus apposita, rodit, ampullasque excitat: eaque Dioscoridi & reliquis Græcis *βαρβύχιον*, Latinis uero Ranunculus uocatur: quoniam ranis herbæque in eodem elemento natales sint, aut quod inter eius fructus frequentes inueniantur ranæ. Medici uero iuniores non solum Pedem coruinum, sed etiam apium raninum & syluestre nominant. Sunt etiam, qui Ritus apium adhuc appellant, genus & noxam eius indicantes. Nam ea in Sardinia plurima nascitur: quæ si in cibo potuue sumit, mentis alienationem, & cum laborum contradictione eas conuulsiones facit, ut risus specie uidensibus præbeat. Ab eoque effectu tristi & amaro.

**Pes Coruini.
Coronopus.**

nimis, dictio Sardonius risus inter homines quondam iactabatur. Huius herbar, quam ueteres βαρύνειον, a rana, cuius effigiem representat, nominarunt, omnes quatuor faciunt species: eorumq; folia & caulē, si apponantur humano corpori, uim exulcerandi habere, & escharā facere docent. Id quod facit Diosc. lib. 2. cap. 106. de ea in hanc sententiā scribens. Batrachion, sunt qui Apīū agreste nomināt. Huius plura sunt genera. Vna tñ omniū uis acris, & in exulcerando effi-
caciissima. Habēt omniū folia & caules teneri impositi exulcerādi, urendiq; ignis modo, uim cū dolore. Subscribit Gal. lib. 6. de Simpli. Medic. ca. 76. ita differēs. Genera huius plantę quatuor. Virtus omniū est acris, fortis in tantū, ut si extrinsecus apponant, exulcerationē faciant cū dolore. Necq; dissentit Plinius lib. 16. cap. 13. ita scribens. Ranunculū uocamus, quem Græci Batrachion; genera eius quatuor: omnibus uis caustica, si cruda folia imponant, pustulasq; ut ignis faciunt. Cogitent itaq; ueritatis studiosi, quid detrimenti ex diuersitate ista duarū herbarū eiusdem appellationis non animaduersa acciderit. Arbitrati sunt enim quidam, cum Pedem corui-
num apud Auicennam ad podagricos dolores prodesse legissent, hanc nostram, quæ Ranunculus dicitur, intellexisse, adeoq; ignorantes esse uenenum, in cataportijs deuorandū exhibuerunt. Quemadmodū Leoniceus, uir nunquā sine honoris titulo nominandus, scribit se nouisse Medicum, qui ex radice Pedis corui, quibusdam alijs adiunctis, pillulas conficiebat, easq; podagra laborantibus propinabat, non sine magno quorundam, qui eas accepere, periculo: donec tandem per eum sui erroris admonitus, a tam periculoso medicamento abstinuit. Quod si Medicus ille cognouisset, Coronopoda Græcorum esse diuersam a nostra, nunquam in animum induxisset, hāc aut in cataportijs, aut alio quouis modo intus sine periculo adhibere posse. Quare tu quisquis es, qui solidam medicinam ex animo sitis, disce aliorum periculo, delectumq; legendis autoribus adhibe.

De C A R A B E. Caput .xxiii.

AVicenna secundo Canonis, cap. 374. Carabe historiā ex professo tractans, scribit esse gummi arboris cuiusdā, quæ Nux Romana uocatur, quam cap. 351. alio nomine Haurum appellat. Nam gummi, inquit, quæ ex hac arbore Romana est, Carabe est. Manifestum uero, Arabes per Haurum Romi seu Romanū intelligi Populū nigram: id quod præter cætera indicant Auicennę uerba, quæ in capite Hauri Romani scribit in hunc modum. Nominatur Achirofa, quæ sane cetero corrupta est, quando Aegiros pro ea scribendum erat, Græcis autem ἄχιρος, Populū nigrum significat. Quantū autē deceptor sit Auicenna, atq; plures alijs cum eo, ostendunt ea quæ scribit Plinius libro naturalis historię. 37. cap. 2. Is enim fabulosum hunc errorē explodens, ita ait. Phœntis fulmine isti forores fletu mutatas in arbores Populos, lachrymis electrum omnibus an-
nis fundere iuxta Eridanum amnem, quem Padū uocamus. Et Electrum appellatum, quoniam sol uocitatus sit elector, plurimi Poęte dixere, primiq; ut arbitor, Aeschylus, Philoxenus, Nicander, Euripides, Satyrus. Quod esse falsum, Italię testimonio pater. Ita fabulosa etiā secutus pro argumento operis Ouidius, lib. 2. Metamorphoseos, inquit, Inde fluunt lachrymę, stillata-
q; sole rigescunt. De ramis electra nouis. Capite uero tertio eiusdem libri Plinius, post uarias de Succino opiniones, eius ortum certius describens, ita ait. Certum est igni in insulis Septentrio-
nalis Oceani, & a Germanis appellari Glessum: itaq; & a nostris unam insularū ob id Glesariā appellatam, Germanico Cæsare ibi classibus rem gerente, Austraiam a Barbaris dictā. Nascit autē defluente medulla Pinci generis arboribus, ut gummi in cerasis, resina pineis. Erumpit hu-
moris abundantia. Densatur rigore uel tepore autumnali. Cum intumescens estus rapuit ex In-
sulis, certe in litora expellit: ita uolubile, ut pendere uideat, atq; considerare in uado: quod arbo-
ris succum prisca nostri credere, ob id Succinū appellantes. Nec probatur etiam a Dioscor. ea fama ac opinio, quæ ex Populi arboris resina Succinū durari adstruit: id qd indicat lib. primo. cap. 104. dum ait. Fertur utriusq; populi lachryma circa Eridanū fluuiū in desiliando densari, sic-
ri, quod Electrū uocant. Eo enim quod ait, fertur, insinuat se id commentū non probare. Accedit
omnibus, quod re ipsa iam hic error etiā explosus sit. Verū ad hunc errorē conuiuentū fuisse, quando & inter autores non pauci adhuc hodie cū Auicennā sentiant, nisi quoq; pugnantia
sibi in Carabe scriberet Auicenna. Capite nanq; 374. asserit Carabe esse calidum parumper: id quod & facit in libello de uiribus cordis, calidā in primo, & siccam in secundo dicens: mox ta-
men subdit. Opinio tamen est, quod sit frigida. Capite autē 344. hoc gummi calidissimum esse
scribit: quod & cap. 350. confirmat, inquiens. Eius gummi est ultimum in calefaciendo. Hic ite-
rum cogitent ueritatis studiosi, quanto in periculo uerlent, qui Auic. sibi in uniuersum imitan-
dū proposuerunt. Quod equidē magna Medicorū pars facit, & hi maxime, qui uulgo celebri-
ores doctoresq; habentur: qui etiā per compita & fora non uerentē prædicare, se mallecū Auic.
Arabiq; alijs, quorū uerba oraculis instar habēt, errare q; cū ijs, q̄ medicinā a Græcis hauriunt.

Electrum,

C recte sentire. O cæcitatem. Hæc ideo iterū atq; iterum inculco, ut si nullo alio pacto ab instituto peruerso auocari possent morosi isti ignauæ propugnatores, manifestissimi saltem Arabū aurorum errores eos deterrerent, melioremq; mentem reducerent.

¶ De POPULO ARBORE. Cap. .XXIII.

A Vicenna. 2. Canonis, Populum arborem sub diuersis nominibus describens, tam uarius est, tamq; nusquam sibi constans, ut merito hunc Proteum, aut Vertumnū dicere posses. Nam ter de una eademq; re diuersis capitibus agit: cui uitio et si non semel obnoxius sit, nunquā tamen magis quā in Populo arbore. Hanc enim primū capite. 344. sub Hauri Romani nomine describit. Dein cap. 357. sub nomine Hauri, ubi quoq; confundit ea, quæ de alba & nigra Populo a Dioscor. & Galeno diuersis capitibus scribuntur. Tertio autem eandem Populū cap. 310. sub nomine Nucis Romanæ depingit, adeo ut a concinno ordine, quem præter ceteros eundem nostri seruasse clamitant, ea in re fuerit alienissimus. Proinde hoc loci iterum manifestū sit, Auicennam suam non ordine aliquo scripsisse, sed uniuersa magis ueluti in chaos quoddā confusum cōgessisse. Cæterū præter hunc confusum docendi ordinē, a uero quoq; aberrat Auicenna, quod cap. 344. & cap. 310. Populū arborem in tertio ordine calidam astruit: quamuis mox capite. 357. æqualem esse in caliditate & ad paucā declinare caliditatem scribat, id quod & in Carabe, ut præcedenti errore uisum est, fecit adeo sibi semper similis est Auicenna, hoc nusquam fere non pugnantia docet. Non esse uero Populū in tertio ordine calidam, testatur in primis Paulus Aegineta, qui eam in primo tantum ordine calefacere refert, Ipsa insuper natura arboris ad tantum caliditatis gradū hanc non posse extolli monstrat. Nam quis sapor, quis odor, quæ demū qualitas tam præcellentem eam monstrat caloris? Neq; em multū odorata, neq; eximio aliquo sapore prædita, sed dum gustatur, primū quidem modice adstringit, postea amaritudinem quandā sub obscuram inuehit, olfacienti quid non insuaue, uerū exiguū id omnino representat, quæ singula non excedere primū ordinem calefaciendo indicant. Si quis etiam uia regia, quam Galenus in suis de simplicibus Medicamentis præscripsit, incedens experiri eam in corporibus temperatis egrisque uoluerit, calefacientē nō ualde inueniet. Nec est quod aliquē moueat uetus ac uulgata illa Galeni traductio, calidam in tertio ordine statuens. Nam cum illa ex Græca ad Arabicā, ex Arabicā in linguam Latinam sic uersa, id quod barbara Arabicāq; passim capitibus præfixa singulis uocabula monstrant, exigua illi fides erit adhibenda: maxime quando constet Arabicā illam traductiōnē nō semel tantū, sed fere singulis quoq; capitibus multifariā deprauatā esse, sicut patet eandē cum Græca conferenti. Cum itaq; Græcæ lectiōnis ueritas, Paulusq; Aegineta, Galeni similia, ipsaq; rei experientia, quæ reliquis omnibus præstat, confirmet, Populū arbore in primo tm ordine calefacere, nihil prohibet, quin Auic. errasse cum suis strenue pronunciemus.

¶ De OXYMYRSINE. Caput .XXV.

Cubebe.

S Erapionis de Cubebe hæc sunt uerba. Cubebe est planta habens folia Myrtæ domesticæ, nisi quia sunt latiora eis, & summitates eorū sunt acutæ, sicut summitates Lanceæ. Et habet fructū rotundū, aliquantulū depressum & latū. Inter folia eius reperit, quod quando maturatur, uergit ad rubedinē inter ipsum & granum triangulum. Et habet ramulos similes ramis plantæ dictæ Lauros, egredientes ab una radice sicut agrestis, difficile frangibiles, longos circiter brachiū unum, plenos folijs, & fructus eius ponticus declinans ad rubedinem. Quæ profecto descriptio in uniuersum conuenit cū descriptione syluestris Myrti, quā *ξυμυρσιν*, id est, acuminatā Myrtū Græci nominant, quemadmodum deprehendit, qui eandem cum Dioscor. descriptione lib. 4. cap. 137. quæ talis est, contulerit. Myrtus syluestris Myrto simile foliū habet, larius tamen, lanceæ figura in summo acuminatum: fructum fert in medio folio hærentem, rotundū, cum maturuit, rubentem, ossæ intus duricie. Ramulos uirgillum modo lentos, numerosos, ab ipsa radice non facile frangibiles, cubitali longitudine, folijs plenos. Radicē graminī similem, sapore acerbō & subamaro. Quis itaq; tam stupidus, qui non uideat hic cecidisse Serapionem, ac Cubebas cum Oxymyr sine non sine magna ignauia confudisse: quum tamen arbor Oxymyr sine sit longe diuersa ab ea, quæ Cubebas profert. Et qui Cubebas & baccas rubentes, quas Oxymyr sine producit, nouerunt, facile quantū deceptus sit sua coniectura Serapion, iudicabunt. Est autē Oxymyr sine arbor, quæ Plinio teste lib. 22. cap. 9. Ruscus latine, uulgo uero a medicis corrupto uocabulo Bruscus appellatur, ex quo Plinij temporibus, sicut hodie quoq;, ruri scopæ fiebant. At Oxymyr sinen a Romanis uocari Ruscū, præter Pliniū testat etiam Diosc. ijs uerbis. Romani Ruscum nomināt. Nunc in nullo honore Ruscus est, nisi qd in aliquib. locis, ut diximus, scopæ ad purganda pauimenta ex eo fiunt. Pueri quoq; rubētes baccas ex folijs eius decerpentes, ceu Corallijs per ludū se illis ornāt. Rustica q; gēs in carnario suspēdit, tūc eo a muriū iniurijs pernas, & cæci sui fiscellas. Neq; em acuminata in cuspidē foliorum eius cacumina penetrare animalia

Oxymyr sine.

dent, quam ob causam & *μυδιανθα*, id est, murinam spinam quidam dixerunt. Vides hoc loco A
Serapioni æque ut Auicennæ in herbarum descriptionibus parum esse fidendum.

¶ De M E M I T H I . Cap. .XXVI.

Rrare magnam Medicorū partem in Memithe, notius fere est, quā ut demonstratione e-
geat. Sunt enim quidam, qui hanc Chelidonium esse adserunt, in quorum albo est Gerardus il-
le Cremonensis: & hi quidē ceteris magis cæcutiunt. Nam cum in confesso sit apud omnes, Me-
mithen esse frigidi temperamenti, id quod Auicenna. 2. Can. cap. 38. quoq; confirmat, inquis, Ga-
leno. lib. 6. de Simplicib. Medica. cap. 172. teste, in tertio ordine calefacientium collocat. Seducti au-
tem proculdubio boni illi uiri, nominū Memithe & Memire uicinitate, quorū hoc Arabis Che-
lidoniū, illud uero Glaucium significat. Aut quia descriptio Memithe apud Auicennam in mul-
tis cum descriptione Chelidoniū maioris conueniat, quemadmodum est succus coloris crocei,
cum amaritudine aliqua & odoris grauitate: hæc enim omnia in Chelidoniū quoq; succo reperi-
unt. Sunt alij, qui Memithen esse herbā eam dicunt, quam Græci *μικρὴν κερταίδα*, id est, Papauer
cornutum uocant. Et eo modo interpretatus est quidā magni nominis Medicus, ut iſſe audiui
auribus, quotiescūq; nonum Rasij prælegerat. Istos uero nō minus quam primos errare, con-
iungunt uerba Dioscor. quæ scribit lib. 4. cap. 60. de Papauere cornuto in hanc sententiam. De-
cepti sunt aliqui foliorū similitudine, falso crediderunt ex hac fieri glauciū. Adeoq; uidet hunc
errore non nuper esse natū, sed Dioscoridis seculo inualuisse. Id Plinius quoq; lib. 20. cap. 19. in-
dicat, dum post Ceratidis, id est, Cornuti Papaueris descriptionē ita scribit, Quidam hoc genus
Glauciū uocant. Esse autem Glaucium id, quod Arabes Memithen appellant, testatur utriusq;
descriptio: nam per omnia conueniunt Glaucio, quæ Arabes Memithe tribuunt. Serapio enim
Memithe hunc in modū describit, Memithe est succus herbæ eiusdē nominis, folia habens Papa-
ueri similia: hæc calido cinere cooperiunt, & sic succū emittunt. Alij herbam in ollam mittunt,
& circūliniunt creta, & in furnū seruētē mittunt, & sic folijs maceratis succū exprimunt. Eius
est optimum, quod est crocei coloris intus, & gustu amarū, & odore graui: miscetur ocularibus
medicinis. Quæ sane descriptio ferme eadē est cum descriptione Glauci, quam tradit Dioscor.
lib. 3. cap. 92. dicens, Glauciū succus est herbæ nascentis ad Hierapolim Syriæ. Folia eius Cornu-
to Papaueri similia sunt, pinguiora tamen, humiliatq; odore tetro, & in gustu amara. Succo ea-
dem abundat, qui croceo colore est. Eius folia incolæ in fisticulis conſicientes, in furnis non adeo
calentibus, usq; dum in calore inarescant, calefaciunt, mox tundentes exprimunt succū. Eius u-
sus in oculorum medicina a principio: refrigerandi enim uires habet. Itaq; ex collatione duarū
descriptionsū, nihil differre Glauciū a Memithe, manifestū sit. Id quod Auicenna quoq; 2. Can-
notificatio confirmat, quæ talis est, Memithe est simile glandibus, citrini coloris, ad nigredinem
declinans. In ipso est amaritudo, & substantia aquea & terrea, & est herba manifesti odoris, &
amari saporis, & crocei succi. Est frigida & sicca in primo. Sanat Erysipilam non fortē. Conſert
in medicinis Ophthalmiæ in principio. Hæc sane descriptio, etsi non multū a Dioscor. uariet,
magis tamen congruit cum ea quæ habet apud Galenum lib. 6. de Simplicib. Medica. cap. 96. in
hunc modū. Glauciū est herba habens adstringendi uim cum delectatione, frigescentq; & curat
Erysipilata, quando non est fortis. Er eius temperamentū constat ex substantia aquea & terrea,
& ambæ sunt frigidae, sed frigiditas earum non est fortis, sicut est frigiditas aquæ fontanæ. Plini-
us etiā lib. 27. cap. 10. docet Glauciū id esse, quod Arabes Memithe appellant: in nullo em̃ a Dio-
scor. uariet, nisi quod hic succum crocei coloris esse ait, ille uero granū. Et ut finem faciam, per-
suadet hoc quoque Paulus in sexto: quando hic Glaucium non aliter, quam Auicenna suum
Memithe refrigerare, Sacros ignes non a dmodum ualidos curare aſſerat.

¶ De P H A S E L O , & P H A S I O L O . Caput .XXVII.

Diuersa esse inter se legumina, Phaselum & Phaseolū seu Phasoliū, primū omnium manife-
stum sit legenti Galenum lib. 1. de Alimentis, qui de ijs tanquā diuersis leguminibus, naturaque
& figura plurimū differentibus, in diuersis etiam capitibus agit. Capite enim. 11. eiusdem libri,
Galenus Phaselū scribit medicocritatem quandā seruare inter ea, quæ boni & mali succi sunt, at-
q; quæ facile, & quæ difficile concoquantur: quæ tarde, & quæ cito excernuntur, inter ea quæ
inflant & non inflant, quæ parum, & quæ multum nutriunt. Præterea nullam qualitatē efficacē
habere ait, sicut alia habentia succos aut acerbos, aut adstringentes, aut falsos, aut dulces, aut a-
maros. Addit aliquos Phaselū maceratū donec proueniant radices, ablutūq; in Garo subducen-
di uentrē gratia ante alios cibos sumere, atq; magis, postquā distributum fuerit, quam Fœnum
Græcū alere. Idq; probat ex historia cuiusdā adoleſcentis Alexandrini, qui medicæ artē op̃erā na-

Cuans, quotidie pulte ex Phaselis utebatur, sanus tamen permanfit, nec deteriore corporis habitū, quā antea habuit, nactus est. Subfcribit Galeno Paulus Aegineta libro primo, cap. 79, inquiens. Phaseli si maceretur donec radices proueniant, atq; ex Garo ante cibū sumant, ventrem subducunt, atq; magis quā Foenū græcum alunt. Multo autē propius ad Galeni de Phaselis sententiā accedit Pfellus, qui libro secundo de ratione uitæ in hunc modū scribit. Phaselos aqua aspergunt, quoad radicē germenq; ediderint, & ante reliquū cibū manducant ad citandā aluū. Garo immersa nutritur, succūq; hæc generant, cum bene coquantur. Meliora Fœno græco, mediāq; sunt inter bonum & malum succū, siue concoquantur, siue minus, & inter tarda & celeria mearu, multum nutritia & parum. Phaeolum uero, siue Phasiolum mox idem Gal. cap. 24. tanquam legumen a Phaelo diuersum, sub Dolichi nomine depingit, docetq; Phaeolos, per quatuor pronuntiando syllabas, alias dici Dolichos, ad differentiā eorum, qui per tres syllabas Phaseli appellantur, de quibus antea egerat. Phaeolum autem esse eundem cum Dolicho, Paulus etiam Aegineta primo uolumine, cap. 79, his uerbis confirmat. Phasioli, qui & Dolichi nominantur. Vbi in Latina Copi translatione Phaseli falso legitur (uisio, quantum arbitror, impressoris) Paulus enī met ipse diuersitatem inter Phaselos & Phasiolos facit, Phaselos primo instar Galeni describens, deinde uero seorsum etiam Phaeolos dicens. Si integri cum siliquis uis ridefq; ingerant, plures superfluitates cumulant. Ita & Galenus, ubi supra uirides cum siliquis comedi testatur, quo nomine & Lobos appellatos esse scribit. Describit & Dioscor. Phasiolum lib. 2. cap. 118. hoc pacto. Phasiolus inflat, inflationeq; excitat, ægræq; concoquitur. Si coctus uis ridis in cibo fumitur, aluū mollit, uomitionibus accommodatum est. Errat autem & hoc loci interpres Florentinus, uir aliqui rara eruditione ac multijuga rerum cognitione insignis, acerrimū iudicio præditus, Phaselum cum Phasiolo confundens. Ex ijs itaq; satis constat, inter se differre Phaselum a Phasiolo, quod nō animaduertentes etiam magni nominis uiri, lapsi sunt: & inter Arabes etiam Serapio, qui sub Lubizæ nomine, quod certe a Lobo Græca uoce desluxum est, Phaselos cum Phasiolis confundit.

De IUIUBIS, & SEBESTI. Cap. .XXVIII.

Iuiabas, quas Sericas Græci nominant, ad usum medicinæ non conducere, præter cæteros, docet Galenus libro secundo de alimentis, cap. 31. de Sericis, ubi ingenue fateatur se non habere aliquid de ipsis testificari ad sanitatis conseruationē, aut ægritudinū curationē. Sunt enī, inquit, cibus mulierū & puerorum effrenatorum, pauciq; nutrimenti & indigestibiles, simul cum hoc q; neq; eusto machū est, alimentū palam quod & ipsum dant paucū corpori. Adeoq; ijs uerbis in ueruerum damnata in usu medico Gal. Iuiabas. Quod non animaduertisse Auicennam mirum admodū est, qui lib. 2. cap. 37. hæc eadem Gal. uerba citat, inquiens. Et quidem sermo in eis bonus est ille, quem dixit Galenus. Non reperi Iuiabas in conseruanda sanitate, & remouenda ægritudine aliquid operantes, sed reperi eas difficilis digestionis, & pauci nutrimenti: & nihilominus paulo post, easdem conferre pectori atq; pulmōi, item dolori renū & uesicæ adfruit. At solet ubiq; fere immemor esse eorū quæ scripsit Auicenna, tantus eiusdem mentem occupauit lethargus. Præterea nullius esse commodi in usu medico Iuiabas, testatur etiam Plinius lib. 4. de Re Medica, cap. 46. de Ziziphis, dicens. Zizipha modicū cibum corpori præstant, licet illis saporis nonnulla gratia lenocinetur. Habent tamen plurima incōmoda: ægre concoquunt, sitim accendunt, prægrauant stomachū, difficillimum reddunt officium uentris. Ex quibus Plinij uerbis collige tria. Primū eadē esse Zizipha cum Iuiabis: nam hæc Plinij descriptio fere nihil a Galeniana distat. Accedit etiam quod Plinius alibi, hoc est, lib. 15. cap. 14. Zizipha, haud aliter quā Iuiabas esse peregrina, & ex Syria asportari scribit. Secundum, errare Medicos iuniores, qui ad purificandum sanguinem, seu ut illi loquuntur, ad mundificationē sanguinis Iuiabas adhibent. Qui enim fieri possit, ut sanguinē purificarent, cum uentriculo inuitiles sint, & ad concoquendū difficiles. Et ut penitus obmutescere faciamus aduersarios, ecce cum illorū principe Auicennā eosdē conuincamus, qui in capite de Iuiabis sic agit. Et illorū existimatio, qui putant, quod ipsæ clarificent sanguinē & lauent eum, est existimatio corrupta: ad quā ego non declino, quia magis ingrossant sanguinem & uiscosum faciunt ipsum. Quid, quæso, ijs uerbis apertius? Tertiū, quod ex prædictis colligit, est, quod falso admodū fructui tribuunt, quæ folijs, radici & corticis arboris ferentis Iuiabas debentur: sicut est mitigare tussim, ad uesicæ dolores conferre. Testis eius rei est Plinius, qui libro eodē de Re Medica hæc omnia folijs, radici & cortici adscribit ijs uerbis. Folia tamē ipsa contrita & imposita, Spleneticos & Hydropicos adiuuare certissimū est. Radicis & corticis eadē uirtus habetur, quorum succus ex melle coctus tussim mitigat, cum mero mixtus, iecori medetur, uesicæ leuat urina largiori. Istis satis superq; ostensum est, Iuiabas perperam a iunioribus Medicis ad multa esse accommodatas. Reliquum igitur est, ut & tridē in Sebesten coniungisse demonstremus, Fructum autem illum, quem Arabes Sebesten nominant,

Paulus ac Plinius Myxā uocant. Pauli uero hæc de Myxa uerba. Myxa est fructus quidē pruno B
 similis sed minor eo. Ita Plinius libro .13. cap. 5. de Prunis in Damasco monte natis, & Myxis u-
 nā loquit, dicens. Itē Pruna in Damasco monte nata, & Myxa, utranq; iam familiarem Italij. Ex
 quibus omnibus facile constat, Myxam a Sebesten nihil differre. Id quod etiā ostendunt uerba
 Auicennæ, de Sebesten ita scribentis. Sebesten & nominatur Mufeita. Quæ sane dictio corru-
 pta est, ac pro ea legendū Myxa. Proprietates autem Sebesten Auicenna ijs uerbis enagrat. Sunt
 quasi temperate. Sunt lenitiuæ. leniunt enim pectus & guttur. Sedant sitim, leniunt uentrem.
 Quæ equidē proprietates omnes, una, aut altera dempta, sunt falsissimæ. Nec em̄ Sebesten sunt
 temperatæ, ut putat Auicenna, sed frigidæ & siccæ; neq; etiā uentrē leniunt, sed magis eundem ad-
 stringunt. Id quod testat Plinius, uel quisquis tandem eius libri autor est (nec enim eius autoritas
 respicienda, quando nō uno loco sua Hippocraticis ac Galenianis placitis fulcitur) lib. 4. de Me-
 dica, cap. 57. de Myxa hunc in modū scribens. Hoc nanq; genus manifeste stypticæ uirtutis appa-
 ret & frigidæ, quamuis plurima illi de rigore siccitas decoquat. Verum & ardores febrecantium
 exinguit: ore compressum, & sitim mitigat, & in cibo sumptū, stomachū erigit, solutioni uentr-
 is obstitit. Proinde uideant Medici iuniores, qui Eclegma, siue ut ipsi loquunt, Electuariū de
 Sebesten ad subducendam aluum con faciunt: quum ex Plinij sententia solutioni uentris potius
 obstant. At quid multa? Nihil mirum, Arabes ementita scripsisse, qui utrunq; sua ex aliorum
 scriptis consarcinare studuerunt.

H De L I C H E N E. Cap. .XXIX.

Herbam a recentioribus uocatam Hepaticam, esse eam, quam Dioscor. Galenus, ac Græd
 alij Lichenē nominant, facile ex utriusq; descriptionibus deprehenditur. Nam quæcumq; a Sera-
 pione ac alijs Hepaticæ tribuuntur, hæc omnia Dioscorides Licheni adscribit. Serapionis autē
 hæc de Hepatica uerba. Hepatica nascitur in lapidibus humectis, & cadit super eam ros uel gut-
 ta aque. Virtus eius est, quæ in frigiditate pauca, & desiccant, & abstergit. Et emplastrum
 cum ea factū, abscindit hæmorrhogiam; & posita & cataplasmata etiā sedat apostemata calida,
 & curat impetiginē, & conserit icterici. Hæc descriptio in uniuersum quadrat cum Dioscor. quā
 tradit lib. 4. cap. 50. ita scribens. Lichen petris adhærens. Sunt qui Muscū uocant. Muscus est ro-
 scidis petris adhærens. Hic emplastri modo impostus, sanguinis eruptiones sistit, inflammatio-
 nes compescit, & impetigines sanat. Inungit idē uiliter ex melle suffusus felle, & in os linguamq;
 destillationes cohibet. Itaq; iam satis constat Lichenē Græcorū nihil ab Hepatica differre recen-
 tiorū. Falsum uero est, quod ex iunioribus quidā scribunt, hanc ideo Hepaticā dictā, qd hepati
C
 maxime proffit. In quorū numero Platearius est, qui in eam sententiā scribit. Hepatica est herba
 crescens in aquis & lapidosiss: habet folia minuta, terreflapidibusq; adherentia; & dicitur Hepa-
 tica, quia præcipue hepatis esse iuuatiua. Pandeſtarius quoq; ex Gal. & Serapionis, ut uidet, au-
 thoritate docet hanc herbā ualere contra lienis hepaticq; obstructions, & contra om nē hepatis
 morbu: cum tamē hi effectus Licheni neq; a Galeno, neq; a Serap. usquā tribuant, id qd ex Sera-
 pionis uerbis paulo supra adductis patuit. Quod aut Gal. nihil tale docuerit, indicat eius uerba
 de Lichene lib. simp. medic. 7. cap. 70. ubi ita differit: Lichen, qui in petris, quidā Muscū uocant.
 Nominat aut ita, quia impetigines sanat. Est uero huic uis quædā abstergēdi ac refrigerandi, atq;
 siccandi. Abstergēdi uero & siccandi uirtutē habet a petra, refrigerandi autē ab aquositate: in hu-
 midis em̄ petris nascit. Plin. præterea lib. 25. cap. 4. Lichenē describens, nihil, qd cū recentiorū con-
 ueniat sententia, de ea refert. Sunt uero hæc eiusdē uerba. Est aliud genus Lichenis, petris tm̄ ad-
 hærens, ut muscus, qui & ipse illiniſ. Hic & sanguinē sistit uulneribus instillatus & collectiones
 illitus. Morbu quoq; regiū cum melle sanat ore illito & lingua. Ex his itaq; locis manifestū sit,
 Lichenem perperā a iunioribus dictā esse Hepaticā, quando ueterū testimonio Hepati nihil con-
 ferat. Quod si uero quis Lichenē herbam prodesse hepati ea ratione contendat, quoniam de ipsa
 scribant ueteres, quod ictericis conferat; morbus autē, qui icterus nominatur, plurimū hepa-
 tis uitio oritur. Is etiam Diosc. ac Plinio docentibus, discat non intra sumptam ad uitū ipsum
 tollendum, sed extra adhibitam, potius ad colorē natiū ictericis recuperandum Lichenem her-
 bam a Medicis prioribus commendari. Non est uero a ratione alienū, hanc ipsam herbam, quæ,
 ut ait Galenus, abstergendum plurimū ualeat, sicut impetigines, ita alteram, cutis in ictericis foedi-
 tatem delere. Propterea si qua herba est, quæ ob excellentem iuuandū hepatis proprietatem nomi-
 ne Hepatica debeat insigniri, illa profecto est Eupatorium: quæ etiam inde apud Græcos uidet
 nominata, quod sit bona hepati. Cuius rei testis est Dioscorides, qui libro quarto, cap. 38. ita de
 Eupatorio scribit. Bibitur uero semen herbaque ipsa cum uino utiliter iocinorosis. Hoc e-
 tiam confirmat Galenus lib. 6. de Simplicib. Medic. cap. 39. inquires. Eupatorium hepatis ob-
 structiones expurgat, atq; insuper hepar corroborat. Non latet tamen Plinij scribere Eupa-
 toriū sic dictū ab Eupatore rege, a quo inuenta est. Vt utrumq; sit, certum est, Lichenē

C ueterum testimonio Hepaticam appellari non posse.

¶ De V O L U B I L I. Cap. .xxx.

A Vicenna capite. 235. secundi Canonis de Volubili in hanc scribit sententiam. Lac Volubilis magnæ abradit pilos, & interficit pediculos. Folia funis pauperum recentia conuenientia sunt ulceribus magnis, & consolidant ea decocta in uino, & ex eis emplastrum factum superimpositum adustioni ignis, & proprie cum cerato. Distillatur succus eius in aurè dolorosam, & confert ulceribus antiquis. Hæc porro Auicennæ descriptio in uniuersum quadrat cum descriptione Hederæ, quæ tradita Dioscor. & Galeno. Dioscor. quippe lib. 2. cap. 168. de Hedera ita scribit. Depilat Hederæ lachryma, pediculosq; inuncta necat. (Atq; hic aduerte, Auicennam inepit simel lac pro lachryma reddidisse) Omnium generum ulceribus folia in uino decocta imposita, & ambustis, dolosisq; ulceribus medentur. Succus uero foliorum corymborumq; doloribus aurium & purulentis auribus medetur. Consimiliter Galenus lib. 5. de Simplicib. Medica. cap. 28. hæc singula instar Dioscor. Hederæ tribuit in eum modum scribens. Lachryma Hederæ pediculos interficit, capillosq; destruit. Folia eius trita cum ceroto ambustis igne profunt. Sanant ulcera antiqua iuxta & nares. Plinius quoq; lib. 24. cap. 10. hæc eadem Hederæ adscribit, dicens. Succus Hederæ tædia narium graueolentiamq; emendat. Infunditur etiam purulentis auribus aut dolentibus cum oleo. Illinitur decocta in uino omnium ulcerum generi, etiam si cacœthæ sint. Lachryma Hederæ Psilothrum est, Phthiriasimq; tollit. Et ambustis illinitur utiliter cum cera. Quis est, qui ex istis ueterū testimonijs nō aperte uideat, Auic. Hederæ proprietates, cū Volubilis proprietatibus miscuisset? Sed quid mirū hic lapsus Auic. qñ & antea in capite de Cusso Hederæ etiam uirtutes cum alterius herbæ, quæ Ladanum fert, uiribus miscuerit, ut in erro decimo sexto indicauimus. Cæterum annotandum & hoc est, Volubilem maiorem dictam, eā esse herbam, quæ a Græcis *κισσάμπος*, id est, Hedera uitealis & Helxine nuncupatur. Hæc autem herba læte plurimo manat, & aluum cit, haud aliter quam Scammonia. Describit autem hanc Dioscorides lib. 4. capite *xxxv* in hunc modum. Helxine Hederæ similia folia habet, ramusculos tamen minores, amplectentes quicquid contigerint. Nasitur in sepris & uineis atq; frumento. Auicenna uero nesciens ueram Hederam distinguere a Cissampelo siue Helxine, mixtis ambarum herbarum natura distantium potestatibus, magnam peperit confusionem: & sicuti Hederam pro Volubili, ita quoq; lac pro lachryma posuit, cum tamen ueræ Hederæ lachryma, & nō lac uitealis Hederæ sit, cui tam a Dioscor. quam Galeno ac Plinio is datur effectus, quod depilet, & pediculos enecet, ut diximus. Præterea cum is error, quemadmodum alijs non pauci, ex linguarum inscitia ortus appareat, cogitent optimi quicq; qd necessaria sit Medico linguarum peritia: qua certe nisi instructus medicinam acceperit, non est quod non multis errorum labyrinthis inuoluatur. At non est quod morosis istis barbaris persuadeamus, ut iam senes Catonē imitent.

Volubilis.

D um herbarum natura distantium potestatibus, magnam peperit confusionem: & sicuti Hederam pro Volubili, ita quoq; lac pro lachryma posuit, cum tamen ueræ Hederæ lachryma, & nō lac uitealis Hederæ sit, cui tam a Dioscor. quam Galeno ac Plinio is datur effectus, quod depilet, & pediculos enecet, ut diximus. Præterea cum is error, quemadmodum alijs non pauci, ex linguarum inscitia ortus appareat, cogitent optimi quicq; qd necessaria sit Medico linguarum peritia: qua certe nisi instructus medicinam acceperit, non est quod non multis errorum labyrinthis inuoluatur. At non est quod morosis istis barbaris persuadeamus, ut iam senes Catonē imitent.

¶ De C E N T A V R I O. Caput .xxxI.

M esuen utrunq; Centaurium confundere, certius est, q̃ ut demonstratione egeat. Sed ut ijs satisfiat, qui autorem hunc mordicus tenent, quicq; eundem ab omni errore immunem arbitrantur, age hominem suis uerbis conuincemus, quæ lib. suo de Simplicibus medicamentis scribit in hunc modum. Centaurea alia maior, alia minor, inter quas distinguuntur proprietates notæ. Minor melior est in omni re, & melior pars plantæ sunt flores & semina ipsius. Calidæ complexionis & siccæ in secundo est. Et est composita ex partibus terreis adustis, in parte dantibus æamaritudinem, & ex partibus non adustis cum permixtione aquositas, a quibus inest ei stipticitas. Et est in ea de dulcedine aliquid a partibus æreis Et in ipsa est ex acredine aliquid a partibus igneis. Et amaritudo in ea plus est stipticitate ipsius, & stipticitas plus dulcedine & acredine, & acredo in ipsa est remissa siue mordicatione. Quare est ex maxime curantibus uulnera. Immo ipsa est abstersiua, exiccatoria, consumptiua superfluitatum, & solutiua uentris. Hactenus Mesue qui in uniuersum Auicennam secundo Canone de Centauria scribentem imitatus est. Ex quibus sane uerbis manifestum sit, Mesuen utranq; Centaurium confundere, nam de utraq; tanquā de una loquitur. Et si enim primo eandem in maiorem & minorem diuidat, tamen mox eandem mixtis proprietatibus, tanquam de una loqueretur, earum historiam confusissime tractat. Quod autem non de una tantum agat, sed confusim de utraq; id ueterum testimonijs ostendimus. Nam primum omnium quod Centaurio inesse amaritudinem & stipticitatem scribit, hoc certe de minori intelligendum erit. Id enim propter amaritudinem aliqui Fel terre nominarunt. Quod indicat Plinius lib. 25. cap. 6. ita scribens. Hoc Centaurion nostri Fel terre uocant, propter amaritudinem summam. Galenus etiam lib. 7. de Simplicib. Medica. cap. 17. ista Centaurio minori conuenire docet, in eam sententiam differens. Dominatur in eo amara qualitas modica stipticitate participans, & propter hoc temperamentum exiccans foriter, est medicamentum sine mordicatione. Quod uero deinceps Mesue Centaurio inesse dulcedinem cum acredine ait,

hoc equidem maiori accomodari debet. Nam ut minor ob amaritudinem Fel terræ uocatur, ita maior ob dulcedinem Mel tetra appellari potest. Id quod testatur lib. 3. cap. 7. ita de maiori Centaurio scribens. Radix illi densa, dura, ponderosa, longitudo ad bina cubita, succo plena; sapore acri cum adstrictione, dulcedineque aliqua. Et confirmat Galenus lib. 7. Simplicium Medicamentorum, cap. 18. ita docens. Secundū gustum enim acris simul & stipitica appareret cum quadam dulcedine. Plinius quoque ubi supra inquit. Radix uasta, rubescens, tenera, fragilisque, ad bina cubita; madida succo, amara cum quadā dulcedine. Verba autē Melue quæ sequunt, quod scilicet sit in ea acrodo remissa sine mordicatione, iterum de minori, ut diximus, intelliguntur. Quod uero post ait, quare est ex maxime curantibus uulnera, id maiori aptari debet. De eo enim sic scribit Diosc. Radix eius utilis est uulnerib. Constat enim & glutinaria, carnesque elixas cogit, si quis ipsam contundens simul decoxerit. Quod & Plinius confirmat dicens. Vis in uulneribus tanta, ut cohærescere etiam carnes tradant, si coquantur simul. Præterea quod subiicit Mesue, Immo ipsa est absterfua, exiccatiua, consumptiua superfluitatū, & solutiua uentris, hoc minori Centaurio tribuunt ueteres. Id quod facit Dioscorides, in hunc modum scribens. Potum decoctum eius per inferna biliosa trahit & crassa. Galenus etiam inquit. Decoctionem huius herbe inijciunt quidam Ischiaticis, ceu educentem biliosa & crassa. Quid porro iam notius, quam Mesue utriusque Centaurii uires miscuisse: adeo ut nemo etiam, licet oculatissimus sit, citra ueterum scripta istas discernere, ac cuilibet suas adaptare possit. Hinc factum est, ut Centaurii maius nostro quo fere omnibus incognitum sit, quando passim in officinis solius minoris usus sit, non sine magno errore. At solent hoc pacto per autorum incitiam non pauca iniercidere, quæ certe si ueteres ac probatissimos autores; sicut barbaros & indoctos istos spermologos legere curassemus, minime iam nos lacerent. Postremum quod Mesue Centauriū minus præfert maiori, iterum exemplo Auicennæ facit, quem ferme in omnibus sequitur. Is enim. 2. Can. de Centaurio ita scribit. Sed minor est magis iuuatiua ad omnia illa. Verum hoc quoque præter antiquorum exemplum factū est, qui cuique suas uires seorsum tribuerunt, nec unum alteri prætulerunt, quemadmodum uidere licet apud Dioscoridem atque Galenum; qui certe præter alia radice quoque Centaurii minoris inutilē, ac nullius in re medica usus esse scribunt. Dioscorides enim hæc uerba. Radix parua, nullius usus. Galeni uero illa. Centaurii minoris radix quidem omnifaria inutilis est. Id quod & Plinius docet, inquit. Centaurium minus radice tenui & superuacua. Videant hic medici iuniores, quantum cæcitant, quantumque a uero aberrant. hi enim non solum ignoant Centaurium maius, uerum etiam radice minoris utuntur in usu medico, quæ tamēn omnium ueterum testimonio penitus inutilis ac superuacua est. Ita barbarorum incitiā uniuerſus medicinæ decor perijt, quem faxint Superi, doctorū omnium studijs recuperemus.

De ARMENI & LAZULI

LAPIDIBVS. Caput. XXXII.

AVicennam sub uo eodemque capite Armenum lapidem cum Lazuli confundere, ex eiusdem uerbis manifestum sit. Is enim libro secundo, cap. 6. de lapide Lazuli ita scribit. Virtus eius est sicut uirtus eius quo adhæret aurum, debilior parum est. Hæc autē non de lapide Lazuli a ueteribus scribuntur, sed de Armeno dicto lapide. Id quod in primis testatur Dioscorides, qui lib. 5. ca. 19. de Armeno lapide ita tradit. Præstat eadē quæ Chrysolcolla, uirib. tñ infirmior. Hoc etiā confirmat Piin. li. 35. cap. 6. inquit. Armenia mittit, qd eius noie appellat. Lapis hic quoque Chryfocolle uiribus similis. Subijcit post hæc Auic. de lapide Lazuli. Inest ei uirtus eradicatiua, purifacatiua, & absterfio eius cū acuitate & supicitate pauca. Quæ certe a Galeno lib. 9. de Simplicib. Medica. tractat. 3. cap. 1. lapidi Armeno tribuuntur, dum ait. Habet uires abstergentes cū acredine, & pauca quadam adstringendi facultate. Quod autem addit Auicenna. Bonos efficit pilos palpebrarum, & prolongat eos, & est ultimum sicut dicitur in illo, propter proprietatem quæ est in ipso, & dicitur propterea, quia ipsum euacuat humores malos, prohibentes oriri pilos; hoc itidem lapidi Armeno, & non Lazuli adaptari debet. Ita enim de Diosc. scribit. Facit ad alendos in palpebris pilos. Galenus quoque haud aliter quam Diosc. ista lapidi Armeno conuenire docet, ita scribens. Quum igitur tali natura præditus sit, miscetur medicamentis oculorum, ipsum quoque seorsum terentes, & in puluerem quodammodo redigentes, utuntur sicco ad augendos pilos palpebrarū, quando ob humorum acredinem quidam ex ipsis decidunt, quidam non augentur neque nutriuntur. Nam ubi huiusmodi humorum acrimonia fuerit consumpta, ad naturalem habitum palpebra restituitur. Ex his itaque elarum est, quod quæcunque de lapide Lazuli refert Auicenna, eadē omnia a Græcis autoribus Armeno lapidi tribui. In eundem uero errore lapsus est & Serapio. hic enim lapidē Lazuli notificans, eiusque potestates exponens, non alia refert quā quæ de lapide Armeno Græci tradunt. Ait enim. Virtus eius est similis glutini auri, nisi quia est debilior eo, & facit nasci pilos in palpebris. Hanc autē de-

C scripſionem non conuenire lapidi Lazuli, ſed Armeno, in ſuperioribus oſtenſum eſt. Quod uero Auicenna de lapide Lazuli ſcribit huic in eſſe uirtutem eradicationem & putrefactionem, id uerum equidem eſt. Nam ea proprietas peculiaris eſt huic lapidi, qui ab Arabib. Lazuli, a Græcis uero Cyanus dicitur. Teſtis Dioſcorides, qui libro quinto, cap. 60. de eo ita ſcribit. Cyanus, ſeu Ceruleus uim habet reprimendi, leniter putrefaciendi, exulcerandi, ac cruſtas ignis modo inducendi. Proinde ſatis conſtat Auicennā, ut in plerique alijs, ita & in hoc lapide rerum differentias, miſcuiffe. Et niſi hoc fateantur aduerſarij, numen eorū Auicennā in grandius erratum incidiffe conuincemus, nimirum quod ſibi pugnantia in uno eodemq; capite ſcripſerit. Si enim de uno tantum lapide tractat, quomodo conuenient, eundem habere uirtutem eradicationem, & nutrimentum pilos: nam uirtute eradicationis, quæ eſt innata ipſi, nullo pacto nutrire & producere capillos poteſt, ſed eoſdem magis extirpat atq; radicitus perdit. Inſuper ne hoc præteream, ſi hic lapis putrefaciendi uim habet, ſicut Auicenna atq; Dioſc. fatentur, omniaq; ea uim habentia a Medicis, Gal. præfertim, inter uenena computent, quo pacto ab exitiali errore ſeu iudicabunt non ſtri temporis Medici, hunc lapidem, qui non minus uenenum eſt, q̃ quod uulgo Cenabriu uocatur, in catapotijs deuorandū quotidie præbētes: Nulliū em̃ ueteris autoritate ſe ſe tueri poſſunt: q̃ nemo ex Græcis autorib. Cyanū lapidē in pillulis purgandē atq; bilis gratia deuorari docuerit. Nec Arabū ea in re ſatis eſt autoritas: q̃ luce clarius ſit, illos eorundē lapidū proprietates miſcuiffe, atq; adeo q̃d docet lapidi Lazuli in eſſe uirtutē atq; bilis purgandē, hoc falſum admodum eſt. ea em̃ proprietates, doctiſſimi Alexandri Græci teſtimonio Armeno debet lapidi. Hinc cū Arabes unius uires ac proprietates in altero noſcent, conſequi illis parum, aut omnino nihil eſſe ſiſtendum. Itaq; caueant poſt hac omnes uere ac candide docti a lapidis Lazuli uſu, q̃ ſi putrefaciendi ac exulcerandi uim habeat, atq; hoc nomine merito inter uenena connumerandus.

N **DE CANTHARIDIBVS.** Caput .XXXIII.
On arbitror eſſe aliquem, qui ignoret noſtræ ætatis Medicos in Cantharidibus propinadis omnes ex æquo proſpicendas eſſe alas docere, idq; quantum coniectura aſſequi poſſum. Arabū, aut eoſdē male interpretantiū præſcripto factū eſt: quando paſſim in iſtis, dum Cantharides exhibent, ſcribatur abſicere oportere alas & caput. Id quod maxime liquer legenti Razā lib. 9. ad Almanſorē, capite de mingendi diſſicultate, & Auicennam Fen. 19. lib. 4. tractat. 1. cap. 8. & paſſim alibi. Quantū autem ea in re errauerint boni illi uiri, aut certe eorundem interpretes, ſatis patet huic, qui Cantharidū uires atq; naturam iuxta ueterū deſcriptionem expendit. Illi enim ex profeſſo docent, alas maleſicio Cantharidū eſſe remedio, atq; hoc nomine minus abſicendas. Teſtis eſt in primis Dioſcor. libro. 2. cap. 13. dicens. Reſterunt pleriq; alas & pedes Cantharidum contra earundē maleſicia remedio eſſe. Quamuis uero Dioſcor. id ex aliorum potius ſententia quam propria ſcribat, ita tamen eſſe poſtea Plinius lib. 19. cap. 4. maniſeſtiſſime indicat ſic ſcribens. Ipſarum Cantharidum uenenum in qua parte ſit, non conſtat inter autores. Alij in pedibus & capite exiſtimate eſſe, ali j negant. Conuenit tamē, pennas earum auxiliari, in qua cunq; parte ſit uenenum. Hinc eſt quod Hippocrates lib. 4. de uictu morborum acutorū, Aph. 114. in curatione aquæ inter cutem, non alas, ut noſtri ſeculi Medici, ſed pedes & caput proſpicere doceat. Eius enim hæc ſunt uerba. Cantharides tres, abſicis pedibus & capite, reruntur in aque cyathis tribus. &c. Vbi antiquus interpres nō ſine errore reddidit in ſua traductione. Auferens caput & pedes & alas. Proinde ut cunq; de pedibus adhuc diſſentiant autores, conuenit tamen inter omnes, ut ex Plinij autoritate diximus, alas eorundē maleſicio medicari, atq; ob id minime proſpicendas. Vides iam, quantum in maniſeſtiſſimis etiam æcurant Medici iuniores. Hinc factū, quod non raro eiſdem Cantharidum uſus male eſſit, ita ut Cantharides ſua ui erodendi ſæpius ſanguinem promanare fecerint. Quod ſi uero alas, quæ huic maleſicio remedio ſunt, nō abſicteas uoluiffent, forte nihil horum conſecutū uidiffent. Quamuis ſi me audierint, in uniuerſum ab exhibitione Cantharidū abſtinebunt Medici. Verum ut cunq; moneas, fruſtra uereor moneas: quando errore penitus obſtinati obſurderint.

A **DE ALIBIO.** Caput .XXXIII.
Vtor Pandectariū in litera A, Alibium falſiſſime pro Eryngio interpretatur, quando ſic ea uerius herba, quæ Inguinaria Latinis dicit. Id quod in hunc modum oſtendimus. Cum Arabib. Aliben uel Alhaliben ſit inguē, aut abſceſſus qui ſit in inguinibus, hoc quod etiā Pandectarius fatetur, conſequi neceſſario, ut Alibiū ſit Inguinaria herba: quæ id nominis ſortita eſt, q̃ proſit inguinibus. Ac quid opus multis in re omnī apertiſſima? Annontandū tamen, eandem herbam alio nomine a noſtris appellari Stellariā, a poſitura & forma, quibus ſtellæ modo radiat. Græci uero non ſolū a foliorū ſitu & figura ἀστὴρ, ſed etiā, quonīa inguinibus, quæ Bubones illi appellant, tam præſenti remedio medetur, ut adalligata tantum medicinam in eo malo homini faciat, Bubonium uocant. Id quod teſtatur in primis Paulus Aegineta hijs uerbis. Articus autem Aſter herba, quā Buboniū, id eſt, Inguinalē ob hoc ipſum uocant, nō tantū emplaſtri modo im-

posita, uerum adalligata etiā prodesse creditur. Describit uero & Diosco. hanc herbam libro. 4. **A**
 cap. iii. in hunc modū. Aster Atticus lignosus caulis, in summo habens florem purpureū & lu-
 reum, ueluti Chamænali capitulum, undiq; per orbem incisuris diuisum, Folia autē habet stel-
 læ similia, quæ uero circa caulem folia oblonga & densa. Haud dissimiliter eandem depingit Pli-
 nius lib. 27. capite quinto, iniquens. Aster ab aliquibus Bubonion appellatur, quoniam ingui-
 nium præsentaneum remedium est. Cauliculus folijs oblongis duobus aut tribus, in cacumine
 capitula stellæ modo radiata. Præterea non prætereundū, quod apud Auicennā secundo Can-
 cap. 27. falso scribatur Attratisus, pro Aster atticus, ita fere omnia herbarum nomina apud eun-
 dem corrupta sunt. Verum hic finem de hoc Pandectarj errore faciamus, cuius equidem homi-
 nis errata uniuersa si quis prosequi uellet, nunquā finem fortiretur, adeo omnes fere pa-
 ginæ erroribus scatent. Nos tamen cogitamus aliquando conscribere Pande-
 ctas omnium earum rerum, quæ ad Græcam Latinamq; medicinam
 spectant, ut tandem consulat ijs, qui mendacissimi hominis
 Pandectarj interpretationibus seducuntur. At-
 q; hic primi Tomi continentis ea quæ
 ad plantarum ac Medicæ rei no-
 titiā attinent errata,
 finis esto.

C Clarissimi uiri Doctoris IOACHIMI
 SCHILLERI, medici Basili-
 ensis, de flore qui uulgo uocat
 Grassigblum, Grassnegelin.
 Ad Othonem Brunfelsium ludicium.

DE HERBIS super quibus tu maxime dubitas, iam nihil cer- **B**
 tum teneo, sed tamen ni fallor, unū herbæ genus est, quod Gra-
 minis florem uocant, uulgariter Grassnegelin/oder Colmerdsflin/oder flyeger etglin
 Sueuice. Huic herbæ falso inditū nomen mihi uidetur, quādo in contesto
 est, nullum aliud Graminis genus (quorum tamen genera multa sunt) flo-
 res effundere, præter unum Parnasium, cuius certe floris speciem ac for-
 mam nostrū minime ostendit. Siquidē cum Parnasi flores maxime can-
 didi, & odorati sint, nostri præter rubrū colorem, uel ex nigro commixtū,
 ut iam ad purpureum accedat, alium nullū ostendit. Sed neq; admodum
 odorati sunt. Quapropter, ex alia progenie falso hodie nominatum esse
 hunc Graminis florem apparet. Ego certe inter Tunice herbæ florem con-
 numerandum censerem, uel potius in Violarum altitium genus collocan-
 dum putarem. Tantum de Graminis flore mihi constat.

C Eiusdem sententiā de ASTRANTIA,
 & ANGELICA.

Angelicam & Magistrantiā ueteribus incognitas herbas fuisse non du-
 bito. Inuenio tamen Meū dictam herbam ab aliquibus uocari uulgariter
 Meysterwurz.

C

¶ HIERONYMVS TRAGVS, Orthoni
Brunfelsio, amico & domino cum primis
optato, S. D.

¶ I D I B V S Februar. literas tuas Otho chariss. reperi, quas diligenter & unice, quod
ab amico & doctiss. fuerant profectæ, amo & lego. Etiam petitionibus admodum iustis quam
sim gerendo morè paratus, id tam suppeditare & aperire nostra sufficeret tenuitas, ex animo
optamus: quin amico tibi nostram communicare operam, & si id nobis impar, non audemus
quale, aut quantulūcūq; illud est denegare, satiq; duco me illud quod pētis fideliter uoluisse,
scioq; te, candidatoq; omnes hoc contentos esse. Ob id rursum tibi de herbis nostrā opellā & in
tellectū mittimus: quæ si quicquam (quod cupio) prōdesse putaris, fac nobis non parcas, imo
sepius utaris. Proinde in hīs quod dubium, aut a uero dissonare uidetur, obliterandum illud,
cæteraq; omnia in melius interpretandū, candori tuo in totum offerimus atq; dedicamus. Chri
stus te seruet diu incolumem. Pandectæ tuæ si lucē iam uident, quanti & hæ comparari possint,
litteris significato. Proinde mi Brunfelsi oro te, si quando poteris, hæc semina adplantandum a
pud hōtiores uestros comparare, mihi præsentibus nummis mitti cupio. Disces quoq; ab eis,
quomodo quodq; feratur, quaq; terra gaudeat, facies mihi rem gratam. Vale bene ex Bipontio
pridie Non. Mart. Anno .M. .D. XXXI.

HIERONYMI TRAGI Me
dici, Herbarum aliquot dissertatio
nes & censuræ.

D



¶ E SOLDANA QUID LOQVAR
uix sciam. Vt autem tibi meam aperiam mentem,
existimo esse Diosc. *βρίον βαρδάριον*, & est germē quod
chartis inclusum miseras, planta sine caule, & capil

lata, Dioscoridi forte ignota, ideoq; paucis historiam de ea absoluit. Ego
huius herbæ potentiam magni duco. Est nimis diuretica: ob id calculo in
uesica laborantibus utilis, atq; herbarum historijs meo iudicio digna.

Niegelblumen, sunt *Viola* nostræ. Vide species, Keiri Serapionis, & Dio
scoridis *Leucoion* lib. 3. cap. 129. et *Mainardum* in *Epist. Medicin.*

Erenbreiß, herba *Tunica* dicī a nonnullis: sed sine ueterū autoritate. Hie
ronymus appellat *Veronicā*. Genus est herbæ *Serpentarię*. Hæc ad radi
ces arborū, maxime quercuū serpit. *Vulneraria* herba est, atq; diuretica.

Pes leporinus

Gassenpsölin, de quo scribis, non uidi ne chartis quidem inclusum: itine
re, negligentia forte nunci perijt.

Mōrrenth. genus est *Rhaphani*, aut illud de quo autores nō scripserunt,
aut *Plinij* certe *Armoracia*: idq; consilio uel ob paruitatem & exilitatē se
minis: uel quod illa radix quocūq; terrarum transferas crescat. Est autē
certū, *Rhaphani* reliquū genus alio tralatum nō crescere. Quod si *Armo
racia* non est *Mōrrenth.*, uelim nobis esse præsentem grācū illum *Morrhio
nem*, qui de *Rhaphano* librum composuit. fieri non potest, hunc Autore
tam nobilem radicem in suo libro non indicasse. Nostri ubiq; medici uo
cant *Radicē simpliciter Mōrrenth.*, idq; magis sua autoritate quā ueterum.

Radix.

Bdibellrut, uocant *Cerifoliū*, *Aprij* genus ut *Petroselinon*. nam & *Petro
selino* perquam simile est. Est *Cerifolio* umbella ut *Fœniculo*: flos candi
dus, ut *cimino*: semen longum, & tenue, & acre. *Dioscoridis* puto *Oreo*

felinon esse. Nisi me uerba sua in hoc suspectum redderent, cum ait. Ra- **A**
muli in summo Oreofelini capitula Miconij habent: quod in Cerifo-
lio nunquam cernitur. Alias herba hæc satis nota. Plin. lib. 2. de re medica
cap. 37. de ea mentionem facit. Item Apuleius cap. 105. Pederota, & Arctio
phyllon uocat.

Storckenschnabel, & hoc quoddam Apium est, non multū a Diosc. Smir-
nio distans. Nouitij herbam Rubeam uocant. Et est duorum generum.
Altera rubescens, lanuginosa, & foetida, prope muros & parietes nasci.
Lumen maius super quodam unguento uocat herbam Griatiā dei. Hie-
ronymus Herbam Roperi, Gotts gnadt; nos herbam hanc Herysipilatis
apponimus. Altera quæ item rubens, nec foetet, campestris est, rostris, cau-
le, & floribus priori similis: uocant rustici nostri Storckenschnabel.

In Cardo Benedicto non paruus est error. Nam sunt, qui Grassulā me-
diam, qui Senetionem, qui Dioscoridis Sedum interpretantur. Mea opi-
nionem detipiuntur isti omnes. Lumen maius in syrupo Eupatorij uocat
herbam Turcham, quā auctoritate nescio. Quod si Cardo benedictus nō
est Plinij Carduus de quo lib. 21. cap. 15. & 16. scribit, nescius sum, quibus
tandem nominibus, capitibusq; hæc plantā apud auctores inuenienda sit.

Inguinalem Dioscoridis (quod ego sciam) nusquam uidi: licet floscu-
los, & plantas, quorum capitula & folia per orbem incisuris diuisa simili-
bus Stellæ uiderim. Qualis autem Dioscoridis, Plinij, aut Apulei Aster **B**
sit, non uideo. Nam Stellariæ permultæ sunt. Caprifolium, siue Marris **Herba stella-**
sylua Hieronymi stellis ornatur, uestitur, & Aparine stellulis: atq; ambæ **ria.**
tinctorum Rubiæ syluestrem quandam stelleam herbam, specie & flore
Caprifolio non dissimilem, nec tamen ut Caprifoliū tenax, aut hamara,
sed pinguis & lenis herba, quasi calamus filigineus, undiq; stellulis cir-
cumamicta. Est & alia herba lignosa, & omnino ferulacea, quæ pari mo-
do stellis uestitur, oblongis tamen, & gracilioribus foliolis, floribus flam-
meis atq; candidis, sed muscosis & densis: quam nostræ mulierculæ uo-
cant suo idiomate, *Vnser lyeben frauen wagtst.* Putaui Dioscor. esse Gallion.

Lactuca & Endiuiā congeneres plantæ sunt, ut ab altera alteram in pri-
mo germine uix secernas. Verum Seris, Intybum, Cichoreum, Endiuiā
mea opinione idem pollent, & ob lactis liquorem, uel Lactucæ congene-
res. Iam autem quot gentes, tot herbarū sine controuersia appellationes.
In Germania nullibi domesticum uidi ego Intybū: in Italia frequens in-
ter oxypora celebratur, quo & hybernis mensibus arena sepultam, sale &
aceto uescuntur caulosi uoluptarij, iniquo suo hoc holere indulgentes
Genio. Hanc suo idiomate uocant Endiuiam, Lactucæ capitatæ fere simi-
lis. Nostras uero quæ in Germania est Endiuiā, Seris est, aut *elipse* certe spe-
cies: nec tamen ut apud Italos Cicur, sed semper erratica, petrosi, are-
nosi, & macerie nascens. Herba sane trium specierum. Alia enim fo-
lijs prope planis & latioribus. Aliæ longioribus per interualla circumcur-
rentibus. Vtræq; gustu amara. Hisce ambabus indiscriminatim utuntur

Endiuiā.

C ad refrigerandum. Tertia, quæ etsi cultore careat, cultis agris crescit inui-
to etiam holitore, hortis nostris commune & frequens malum. Cuius itē
duum generum, planum scilicet, & incisus caulibus angulosum, quæ duo
Dioscoridis Hieratia iam pridem credidi, nostri uocant, *Genpdistel* / alij *Sew*
distel / quidam hanc uolunt esse Scariolam.

Sonchus. Cicerbita, & Sonchus nostra Lactuca est crispa & hortulana: in Veris
initio usq; ad æstatem cum reliquis Lactucellis apud nostrates ex sale &
aceto estur. Nam *roxyer* re uera ut Hieration Lactucę species est, quare Hie-
ratiam a Dioscoride Sonchitem, tanquam Sonchi congenerem dictam
uideo. Proinde rura nostra omnia isthęc holera uno idiomate & commu-
ni uocabulo Lactucas uocant. Nos itaq; illa appellatione contenti, de il-
larum nomenclaturis non admodum disceptantes, doctioribus & ocula-
tis herbarijs prouinciā hanc & ocio uacantibus inueniēda relinquimus.

Cichorea. Solsequium species est aut lutybi campestris, aut arboreſcentis Lactucę:
hanc plantam conuerso ordine Itali, Galli, & nostrę ætatis medici Ci-
choream uocant. Mihi autem uidetur, quod hæc Cichorea Dioscoridis
Heliotropium, & Apulei Intybum erraticum sit. Nam & historia utro-
rumque non admodum dissentire uidetur. Notissima ubiq; herba, cu-
ius flos solem semper comitatur: ideoq; Solaris a Celso dicta est. Germa-
ni uocāt *Sonnenwübel* / et *Wegwart*. Alij Sponsam solis. Cuius flos proiectus
D in gregē formicarū cito rubescit tanq; cruentus: ad cuius spectaculū non
raro admirabar. Eius plantę uidi genera tria. Primum & uiaticum, o-
mnibus notum, flore est cæruleo. Alterum candidissimo, rarū apud nos
spectaculum. Tertium luteo, & fere croceo flore. Id genus olim Mogun-
tinus ager nobis præmonstrauit. Planta est fruticosa et pene arboreſcens.
Descriptionibus Plinij per omnia respondet nostrum Solsequium: licet
Plinius sibi nonnihil contrarius sit, nam in decimonono, capite sexto ait
purpureū habere florē, & uicesimosecundo capite uigesimo primo cæru-
leum. Nisi forte cæruleus, & purpureus idem apud eum pollerent.

Dens Leoninus, qui maior et minor, potentia & uirtute Endiuia res-
ferunt, nam refrigerando utilissimę plantę, cuius flos luteus, cito canes-
cens, qui & medio ueris euanescit cum caule. Ob id Dioscoridis & Plinij
Senectonem, aut eius herbę congenerem plantam iudicaui. Hierony-
mus uocat Rostrum porcinum, Alij *Pfaffenblatten* / alij *Mergenblumen*. Atque
de herba hac certius non habeo.

Daucon omnes interpretantur Staphylinon agrion, *wilde Pestinagenn* /
oder Mozell / oder *wilde Geleruben*. In caussa sunt antiqui scriptores Galenus, &
Aegineta eius interpretes, qui Staphylinon uterque Daucon uocant. Plin-
ius quatuor Pastinacę genera numerat libro decimonono capite quin-
to, inter quæ & Hybiscum numerari uult. Cum Hybiscus nihil aliud sit
quam Althęa: sic error ex errore non in Dauco tantum, uerum in infini-
tis deprehenditur plantis. Nos autem Daucum non Pastinacę interpre-
tamur, sed *Berwurz*. Etsi Staphylini speciem, quis hanc dixerit? Tamen

Dioscorides de Dauco proprium caput habet, de eo sic scribens, libro **A** tertio, capite septuagesimo sexto, Daucus & petrosus, & apricus cernitur locis, Foeniculi folijs, minoribus tamen & exilioribus, caule semipedali, umbella Coriandri, flosculis candidis, semine peracri, &c. Omnia hæc nō Staphylinio, sed radici quam *Berwurz* uocant recte congruunt. Quod autem *Pastinaca erratica* (quæ uera species est, *der gelen Rüben*) a scriptoribus quoque Daucus dicatur, suspicor id nomen ob similitudinem huic radici impositum. Nam *Berwurz*, quæ Daucus, et *die gelen wilden Rüben*, quæ *Pastinaca erratica*, fere floribus, semine & caule similes sunt. Porro *Berwurz* nostra rura non habent, sed Hercinia sylua, quæ sacra, & fere *Pæonia* terra est. Daucum apricis, & pratis copiose olim, per omnia descriptionibus Dioscoridis respondentem, uidimus. Verum *die wilden gelen Rüben*, quam diximus *Pastinacam erraticam*, edendo est, ubique crescens, & secundū sepes æstiuis mensibus quotidie perspicitur, flore, & umbella Dauco similis: nisi quod in centro Staphylini flore quiddam purpuræ est, quod in Dauco nusquam cernitur. De Dauco & *Pastinaca* res sic se habet.

Asphodelum nostra tellus non gignit, ideoque radices tantū ad nos ali quando sine herba adferuntur. Cum essem apud Heluetios, memini me apud eos qui ex albis effossas circumferebant uidere: nec has tantum, quin et omnigenas: ut solent ex radicibus cibum quærere herbiferi. Erant autem radices quas tunc temporis uidi, adhuc succulentæ, colore spiceo, fermeque aureo, cōaceruatæ quasi multis bulbis compactæ, herbæ **B** quam Iouis barbam dicunt non abimiles. Et Dioscorides libro secundo capite centesimo quinquagesimo nono, *Asphodelum* glandibus affimilari dicit: non uideo qui cum nostris omnino hæc quadrat. Hoc autem uerum est, *Asphodeli* radices compactas esse multis membris. Et ut folijs densis Rosæ crescunt, ita & *Asphodeli* tanquam commissuris ex uno capitello radices spectantur: quarum singulæ partes (soluto corpore radicis) *Balanis* non admodum dispares, nusquam aut teretes ut *balani* sunt, sed Iouis barba (ut diximus) speciem præ se ferebant. Rogitauī ex herbiferis nomen. Ipsi *Goldwurz* responderunt. Certius hoc tu quam ego ex eis cottidie cognoscere potes: solēt em̄ hī non raro uestra ciuitate, in quā multi populi confluunt, suas radices uenditioni proponere. Cur autem *Auiceña Canon. 2. cap. 77. Affodillum* uocet, ignoro: forte rei sibi ignotæ, ignotum uocabulum quoque imposuit.

Spinachiam apud unum *Auiceñam* secundo Canone, capite sexcentesimo tertio nostri *Bynertsch* uocant: *Heydelbergenses* dicunt, *Spinetschant*. De Dioscoridis *Lapsana* dubitamus: ea si nota ubi est, mittito: ut & nos discamus quale holus sit. Tu autem *Serapionem* lege, & uide num *Aspenach*, *Spinachia* sit.

Eringium carduus est multis, atque stellatis capitibus, omnib. *Carduis* aspectu speciosior, Dioscorides lib. 3. capite uigesimosecundo, ait *Centa* tūcapita illi nomen fuisse: quod huic *Carduo* una radice tot capita promi

C nent. Pulchrum certe ac congruum nomē. Petrus de crescentijs, & Circa Instans suum Affodillum Centumcapita uocant: forte ob bulborum multitudinem. Eringion ego idiomate nostro appello *Mañstrew*, ob longitudinem radice, quam longiorem Moly uolunt esse. nam Eringij radicem nusquam uidi integram, semper aliqua parte in solo permanente. Herba est quouis Protheo mutabilior, nunc album, nunc cæruleū, nunc pallidum mentitur colorem. Apud nos rarum spectaculum. Vestra terra nihil uilius Eringio. Nam omnes fere agrorum margines hoc genus Carduorum, quin & uiæ passim habent. Turba medicorum hanc herbam Eringium uocant. Proinde caput Plinij de Eringio non male nostro idiomati respondet, ait enim, Lesbium Phaonem dilectū fuisse a Papho. &c. Plinius libro. 22. cap. octauo.

Milium solis, hac herba inquit Plinius, nihil mirabilius. gerit enim iuxta folia singulas barbulas, & in cacuminibus earum lapillos candore & rotunditate margaritarum. &c. Vide Plinium libro uigesimosextimo capite undecimo. Dioscorides herculeam herbam ob seminis duriciem uocat: quem uide libro Tertio capite centesimo quadragesimonono. Marcelli Vergilij commentarij hoc loco satis mihi faciunt. Colligunt hoc semen cis renem, quemadmodū & alia multa, ut Asparagum, Tamariscū. &c. uulgo dicitur *Wissyrz*.

D Winterg. ūn. Hieronymus Braunschueig lib. de Simplicibus Pyrolā uocat: ego apud Dioscor. prudens legi nusquam, neq; Plinium: opinor tamen esse Betam syluestrem. nam folia & pyro & betæ respondent. Vide Lumen maius: quamquā Gilibertus uult Arnoglossam Centūneruiam esse, aut Betam syluestrem: quam Auicenna secundo Canone capite quadragesimo trigessimonono linguā arietis nominat. At Phrysius Centūneruiā interpretatus est *Wegerich*. Omnia hæc ad ideitatem herbe Wintergrün satis mihi faciunt.

Lunariā nusquā inuenio, siue M. ficinus, ut scribis, siue alius eius mentionem fecerit: sane locus ille Ficini incognitus est mihi. At Lanariā passim lego, tum apud Plinium libro uigesimo quarto, capite octauo, tum apud Dioscoridem libro secundo capite centesimo quinquagesimo secundo, herba fullonibus ad purgandam lanam apta.

Linaria herba tibi nota est credo: de qua uulgo medicorū sic scribit. Esula lactescit, sine lacte Linaria crescit.

Satureia, Cunila, & Tymbra idem sunt. Satureiam, quam & Plinius lib. 19. cap. 8. Tymbram, & Diosc. lib. 3. cap. 20. Satureiam adpellat, nos lingua nostra *Garten Zsop* et *Zwybel Zsop* uocamus. Est species Thymi, Columella autore, cum ait. Et Satureia Thymi referēs, Tymbræq; saporem. Is qui Luminare maius scripsit, uult Satureiam esse minorem Pulicariam.

Weißwurz. Hieronymus Braunschueig Sigillum Salomonis uocat, qua autoritate nescio, renibus conducens, nec non apostematibus internis, impetiginesq; lentiginesq; faciei illita delet.

Herbura, Latino nomine nusquā legi, licet aliquando uiderim. Herba A
est magnis ut Lappago folijs.

Chamæpytis apud Diosc. lib. 3. cap. 66. qualis herba sit inuenies: quid
aut nostro sonet idiomate prorsus ignoro, nec quenq̃ de ea habui magis-
trum, aut doctorem. Ego autē Cipressen existimaui: quod illa nostra Cu-
pressus Pinum, siue Resinam uerius quam amomum oleat.

Chamædrys est infima quercus, siue Trixago, nostra lingua, *Vergiß mein*
nit, uel *Gamenderlin*, nam & Lombardi Calamandrinā uocant, herba cū pri- Calamandri-
mis graue tussientibus accomoda. Dioscor. lib. 3. cap. 103. & Auicenna. 2. na.
Canon. cap. 136. de ea scribunt. Alij Serratā nominant: quod Serra ab il-
la sit inuenta. Plinius lib. 22. cap. 15.

In Pulicaria non est cur strenue laboremus. Et si eius herbæ sint binæ
species, binæq̃ in Dioscor. capita. Priorē tamen Pulicariam esse uerā, quā
aliqui Perficariam uocant, a similitudine foliorum, & ut Dioscorides scri-
bit, folijs Oleæ simillimis hanc herbam esse, idem est, ni fallor. Sunt e-
nim Oleæ folia Perficis maxime ut ouū ouo similia. Cuius itē duarū spe-
cierum altera maculis plena, altera uero nullis, uirtute tamen pares: gustu
acerrimæ ut Piper sunt: ideoq̃ pulices humo sparsa e cubiculo pellit, & ne
cat. Dioscoridis opinor esse Conyzā, de qua lib. 3. cap. 127. nostri uocant Conyza.
Rassel, alijs *Sißfrant*. Muscæ, culices, pulicesq̃ hanc herbam, aut succū eius nō B
atingunt, ob id sordidis ulceribus ualde conducibilis.

Altera Pulicaria a seminis similitudine sic dicta est. Vides enim semen
eius pulicib. affimiliari. de ea itē Diosc. lib. 2. cap. 63. Auic. Can. 2. ca. 522.

Centaurion maius, de quo Diosc. lib. 3. cap. 62. Plin. lib. 25. cap. 6. scri-
būt, nullibi in Germania nasci credo, aut certe mihi in uniuersum ignota
herba. Centaurion maius quo nunc utunt̃ medici, Matricaria est, aut Fe-
brifuga, quam ego Diosc. Parthenion esse iudico. Vide eius librū. 3. cap.
126. Error nō paruus in Centaurio: cum alterū fel, alterū mel terre dicat̃.

Cynorrhodi, Rosæ sunt caning, aut campestres, ut quidā uolūt: nascun-
tur frutetis ac subhumidis locis, coloris purpurei, odoratu iucundē, nostris
Rosis & aspectu & odore fere similes: odorē autē campestriū simul ac uir-
turē præ domesticis probō. de quibus uide Plin. lib. 25. cap. 2. Nascitur &
fungus in radice Cynorrhodi, quē Auic. 2. Can. cap. 112. Tarach, & Dio-
scor. lib. 1. cap. 112. Hippocistida uocat. Nos Rosam illā interpretamur *Haber*
rosen. Francofordienſis *Hanrosen* dicunt. Spirenses & Heydelbergenſes his-
ce Rosis maxime pharmacis utuntur.

Ayrsie, Gramen apud Diosco. lib. 2. cap. 31. dicitur, cuius ego radice ad
frangendū uesciæ lapidē usus fui, nouiq̃ Gramen magnæ operationis &
efficaciæ. De eo Plinius libro. 29. cap. 19. Aliud Gramē est Polygonon, de
quo mox dicemus.

Grasblumen, nusquā quomodo Latini uocent legi, nisi quod Narcissi spe-
ciem quidā adpellant: quibus non adhibenda fides. Nam Narcissus flos
alius est qui aut Februario germinat, uulgo *Bonnungsblumen*, aut certe flos

Matricaria.
Febrifuga.

Gramen.

B. est autumnalis Hermodactyli radice, *Heyloßen, oder vñt blümen*. Vide Theophr. Flores sunt nudi, sine caule, atq; coloris purpurei. Verg. æcloga. quinta. Pro molli uiola, pro purpureo narcisso.

Regelblümen, alij Grassblümen, nostri Violas credunt albas. Apud Dioscor. genera plura: quem lege lib. 3. cap. 129. Meminit item Violæ Ioan. Main. libro Episto. medicin. lib. 3. Epist. quarta.

Sertula campana.

Trifolij genera septem.

Meliloton Dioscor. interpres lib. 3. cap. 23. atq; Plin. lib. 21. cap. 9 Sertulam campanam adpellant. Certumq; est, Meliloton genus esse Trifolij acuti: an illud sit quod uocāt *Steintlee*, penitus nescio. Certe uulgu medico- rum, ita interpretaē. Noui ego plus septē genera Trifolorum: quod autē omniū uerum sit Trifoliū, conijcere non possum. Omnia enim istiusmodi sunt, ut uel intuendo, uel palpando hanc uocē Trifolium merito sibi uēdicant. Noui Trifoliorum pratensia duo, maius, & minus. Campestria duo, singula singulis flosculis ornata. Noui insuper genera duo ceteris & caule & flore humiliora. Quorum alterum etiam pueris nota herbula, ad blandiente luteo flore, idiomate nostro *Saßenspörlin*, alij Leporinū hoc genus uocant. Estq; aliud Trifolium syluestre, candido flosculo, ego suspicabar id esse Oxytriphylon. Nostri *Sawtlee, Gauchlee, Büchampffer*, uocant. Consule Serapionem de Andecothe. Dioscorides. noster Samfuchum adpellat Trifolium lib. 3. cap. 22. Licet de Trifolio scripserit caput proprium lib. 3. cap. 116. Certe Trifolium arbitror esse uocabulum commune, siue pratensiū, siue campestriū.

C. Quoties ego lecturus simpliciter Trifoliū, de Pratensi semper & communi Trifolio intelligam: quicq; interim sui iudicij ut sit, minime prohibemus, & cū tali nihil contendendū censemus.

Inulam nostram arbitror esse Chironium Panacen, de quo Diosc. lib. 3. cap. 92. scribit. Nam Piinij & Auicennæ Inula, cum nostra non uideo qui congruat: tamen illud uerum est, quod ex radicis nostræ Inulæ oculis, aliæ Inulæ feri aut propagari possunt, ut idem Plinius testatur, lib. 19. cap. 5. Mihi profecto Vergilij commentarij super Inula non displicent, cum ait. Helenium ex se mittit caulem crassum, hirsutum, cubitalem, alioquando maiorem, angulosumq; flores luteos. &c. Hæc omnia Inulæ nostræ adesse uidemus, Dioscorides libro. 1. cap. 27. Utinam de cælo mittatur Mercurius nouus, qui hanc, atq; alias nobis commonstret radices & herbas, quo instauretur & renouetur pristina ac ueræ Peoniæ disciplina.

Sanguinariam uocem, plantarum potius epitheton, quam herbæ nomenclaturam esse quis dubitat: sunt enim herbæ non paucae, suntq; radices, sunt lapides & gemmæ, quæ singula sanguinaria dici possunt. Est herba quædam rubens, cuius succus ut purpura tingit, quam uulgo Sanguinariam *Blüstraut* uocant. Alij hanc Soldonellam. Nascitur stercorarijs.

Blüstraut

Est præterea radix cui nomen fecerunt Sanguinaria, quam nos uerum Pentaphylon esse nihil dubitamus, qua dysentericis, coeliacisq; dolorem leuauimus. Est illi mira in hoc adstringendi facultas, omnisq; ueneni magister. Herbarij nostri tam uocant Tormentillam, alij Ferulam, Germa-

nice Kottwurz, Toimentill, oder Burchwurz.

Sanguinaria qua nos usi sumus, & plæríqu omnes, est Bursa pastoris minor. *Oeschelkraut, aut Seckelkraut.* Est & huic mira adstringendi potestas. Hac multos sanguinis fontes sistimus, phibemusq, p̄cipue mulierculis.

Polygonon est Proserpinaca, referēte Apuleio cap. 18. qui & facile mihi fidem facit. Sanguinem excreantibus, priusquā autor hic nobis uisus fuit, administrauimus, uidimusq, ea herba rem certissimam. Quare sanguinariam ab Italis & illam suspicor esse dictam. ut Arnoglossa adstringendi & refrigerandi uim habet, quam Arnoglossam similiter Sanguinariam audiui nuncupatam. Ego Polygonon interpretor *Weggras* / oder *Wegdrut*. quod *Weggras*, descrip. Plinij atq, Dioscor. pulchre quadret. Legatur ergo Dioscorides libro. 2. cap. 22. Plinius libro. 27. capite. 12. Medici nostrigra men hoc Centumnodiā uocant: nec hoc mihi nomen displicuit uisquam. Sunt qui *Wegdrut* Gramen uerum adpellāt: sed falso. nam de uero Gramine supra monuimus. Quis non uidet, rebus manentibus, nomina mutari, penesq, in omnibus esse confusa? Hinc est, quod medicina tam sæpe Plinio teste mutata & alterata fuit. Porro autorum Sanguinariam Polygonon, uel *Weggras* credo esse. Quod Celsus lib. 2. capite. 32. Sanguinalem interpretatur, Apuleius & Plinius Sanguinariam exponunt. Nescio quantum a Virga Pastoris Auicennæ, de qua. 2. Canon. capite. 736. Polygonon distet. Tu uide Serapionem cap. de lapid. an sit Dimirision.

Rhaphani genus Dioscorides libro. 1. cap. 102. describens, duosq, ibidem genera, satiuum, & syluestre ponit. Plinius libro. 19. cap. 5. tria genera, aliud crispum, aliud leue, & aliud campestre. Quod autem horum significet *Mömentich*, coniectura uerius quam indagatione doctorum nostrorum nunc deprehendere licet, tam periti scilicet, ut radicem a Rapa uix deprehendant. Ego opinor hanc Radicem Plinianam, & Dioscoridis Armoraciam. est enim hoc genus parui seminis, & ut Plinius scribit, fronde copiosius quam corpore. Tertium Plinij Rhaphanum, quem Dioscorides. lib. 2. cap. 170. Apion uocat, nescio. Nostri medici in suis compositionibus Rhaphanum uocant Radiculam, *Mömentich* simpliciter Radicem: idque faciunt autoritate Isidori. Tu Palladium consule, qui ait, Armoraciam transferemus siccioribus locis ad culta. &c. Certum est, ceteros & communes Rhaphanos semel translatos, non crescere. Moerettich quocunque locaueris transferendo, crescit.

Angelicam & Astrantiam, ut ignotæ uoces, nullibi reperio: est tamen utrisq, calefaciendi facultas. Differt Astrantia ab Angelica, quantum Piper a Gingibere. Nam Astrantia & gustu, & sapore calidior est Angelica. Nomenclaturam autorum ueterum de utroque non habeo. Caries, atque nostra negligentia nobis permulta abstulerunt. Non dubito ueteribus utraque fuisse notissima, alijs tamen nominibus. Ita fit, ut durantibus rebus, nomenclaturæ rerū sæpe mutantur. Quod aperte in Brassica factū uidemus. Sit utcunq, radices illæ humanis corporibus auxiliū præstant

A
Bursa pasto-
ris.

Weggras.

B

C atq; Tyriaca. Est ergo cum primis Angelica radix cordialis, ueneniq; propellendi efficacissima. Quidam adpellant eam *Bergwurzel*. *Braunschweig* de Simplicibus nominat radicem Spiritus sancti.

Lolium, Vergilij Vitium est commune, siue sterilitas omnium frugū: quamuis de Triticō solo Vergiliū hoc loco dixisse auguror. Est in Triticō semen quod Bromos dicitur. Agricolaē nostri illud, *Dynkel* appellant: quidam *Sancipeters Foin*, ego *Loliū*. Sunt apud nos qui genus hoc frumenti ad saginandos porcos feminant. Quid pluribus? fruges omnes, omniacq; satia, suo Lolio non carent. Rabus, aut Siligo suum habet Lolium, quod Siligini per omnia simile: excepto semine, qd tenuius atq; gracilius est. Ego *saubacher* illud uerius, quam semem dicerem. Nostri hanc luē uocant, *Dortt*. Milium suo Lolio non caret, quod Miliariam Plinius adpellat libro uigesimosecundo, capite uigesimoquinto. Proinde Lolium & Zizania an idem sunt, uide. Certe Auicenna .2. Canone. cap. 756. de Zizania tantum scribit. Hoc loco prætereundum non est. Vidimus non semel, & Triticum, & Halicam sterilescere hoc pacto: e culmis surgebant spiculæ nigrae & combustæ absque ullo semine. Causam tamen morbi nescientes: nisi quod intus calor quidam oclusus & suffocatus, tandē e uirtute anni cgebantur exire de culmis. Atram atq; inutilem hanc spicam audiui Lolium dicere, sed nostri hanc sterilitatem uocant *Brandt*.

D Alba ligustra, & Vacinia nigra, Maronis hoc carmen quomodo legant, aut quid in utroq; somniant, uel pueris notum est. Ligustrum *Glockenblumen*, & Vacinium nigrum *Seydelbeer* exponunt. Sic & archiater magis nuper mihi carmen hoc interpretatus est. Sed quid illa huc adfero somnia? Miserendum uenit super horum impudentiam, ne dicam ignorantiam, qui suas nugas pro uero magno aestimant atq; uendunt.

Ligustrum arbor est, siue frutex de quo Dioscorides libro primo, cap. 109. Germani habent illā, omnesq; fere Chirurgici uocant bono idiomate *Seynhölzlin* / alij *Barnügel*, sed male. Sepes hunc florem in Maio, acinosq; nigros ut Sambucus tempore autumnī præbent. Folia huius fruticis Peruiñce similia, flore candido. &c. Quidam Medicorum fruticem hunc *Frañionellam* nominant. Lege caput Dioscor. & iudica, num uera sint quæ scribimus.

Vacinia flores sunt, & non Myrtili. nam & Vergil. hoc loco de floribus agit, non autem de fructibus. Dioscorides noster florem hunc adpellat græce *Hiacynthon*. Quidam ex Metamor. Ouidij hunc florem dicunt *Kintersporen*: an uerum sit nescio. *Hiacynthum* si noueris, mitte. De hac herba *Kintersporen* non nihil dubitamus.

Brassicæ species ex Plinio didici, quem & tu de Brassica legas moneo: ergo non est ut uel ego quicquam de notissimo omnium holere scribam. Vidimus Brassicæ genera tria, quæ ab hortulanis singula facile discas, idē tamen omnibus Brassicis nomen. Vnum suo idiomate imponunt, uocantque omnem Brassicam, *Bölskraut*. Memini me semen ueteris Brassicæ

feminare ante annos quatuor: quo surgente, Rapæ prominebant. Recor A
 datus sum postea uerborum Plinij, qui ait, Ex semine ueteris Brassicæ, Ra
 pæ fiunt, lib. 19. cap. 10. Porro unum hoc ex te discere uolo, ueteres illi cur
 Cramben, Rhaphanū dici maluerunt: cum Brassica, quæ sit holus, a Rha
 phano, qui radix *αὐτὰ τοῦ ῥαφάνου* disereper. Quis ergo prudens, Radicem ullā
 caulibus potuit adæquare?

Blitum quale holus sit, dubito. Iamdudum ego credidi holus nostrum
 hortense capitatum uocari Blitum, uulgo *Bappesfraut*: eius tamen nominis
 adhuc testimonio ueterum autorum careo: tu uide & iudica ex Dioscor.
 lib. 2. cap. 108. & Plinio lib. 20. cap. 22.

Betam esse duplicem, candidam, & nigram Dioscor. lib. 2. cap. 112. &
 Plinius libro uigesimo, cap. 8. scribunt: hoc holus nostrates adpellant,
ῥόμισχ φραυ, alij *Μανγολ φραυ*, alij *ῥόμισχ βόλ*. Eius holeris nos tria nouim⁹ gñra
 hortensia, & satiuā. Dioscor. candidam non uidi, sed nigram, uiridem, at
 q̃ lenem semiuiridem. Inter utramq̃ media est: an illa Dioscoridis candi
 da sit, nescio: certe mea opinione cæteris uirtute præstantior. Tu uide.

Μανγολ omnes Betam esse uolunt. Vide Dioscoridē *τιῦτλαν* lib. 2. cap. 112.
 Bonum caputpurgium, nam succus holeris huius naribus instillatus, mi
 rifice caput a phlegmate mundat: quod non ex Dioscoride tantum, sed
 experientia didicimus.

Locustam, siue pedem Locustę herbam interpretantur eius nominis, B
 sed quæ tamen perspecta mihi non est, quod equidē memini. Sed & Re
 punculum, & Napunculū uocant uulgo, folio angusto, desinente in mu
 cronē, cauliculis uertice torulos habentibus, ut in Asparago, & salictario
 Lupo cernitur. Ex quibus minores alij alterno semper inguine profili
 unt, Radicula uel diuitum, lautorumq̃ mensis petita, Rapisti qui
 dem sapore, non tamen ad ructus illiberali, ac fatuus omnino
 gustus est: nisi q̃d cum aceto & sale non iniucundus est.

Semen ei tam exiguū, ut discerni fere aliter non pos
 sit quam grana Sabuli. Alij pro Blito, aut ualde
 simili herba capiunt in Arabicis scriptori
 bus. Talem fere pingit in Corollario
 Barbar. Pandectarius holus la
 menum interpretat̃, siue
 Coxilides. i. sachili
 emene. sic em̃

duobus locis meminit: quibus tamen quid sibi uelit, ut
 expers arabicæ linguæ plane non assequor. Quā
 quam tamen & Iameni alio loco interpre
 tatur pro herba Prouenca, si nō men
 dosus est codex, uel herba Tre
 mula. Sed & hæc quoq̃
 me fugiunt.

C



Sonnen wüt
bet.

Cichoreæ, &
dents Leonis
differentia.

¶ Ex Marco Gatinaria.

¶ De TARAXACO quid sit.

NICOLAUS AVTOR EST, & EST mens D. Gentilis, quod Taraxacon est planta Leonis, quæ facit florem citrinum. Est etiam una alia species, quæ Cicerbita appellatur. & ut quidam uocant, Aborsus porcinus.

Etrursum. Cichoream, & Taraxacon multi pro eodem accipiunt. Nicolaus tamen in aliquibus receptis ambo ponit. Ideo uidetur differentia: & credunt illam esse ueram Cichoreâ, quæ habet florem coelestinum: illam uero Taraxacon, quæ habet florem croceum, & a uulgo dens Leonis uocatur.

¶ De I V A.

I V A est quædam herba, quæ secundum Simonem Ianuensem est Chamepytheos species, multumq; ualet in passionibus neruorum & sciatrica. Mesue appellat eam Ziuiam, & a Nicolao exponitur quod est Iua, etiam ab Anthonio Guanerio. Et ego expertus sum in quodam iuvene reuerendi domini prothonotarij de Scipione. ualet enim multum secundum omnem modum administrationis eius.

¶ De E S V L A.

D Stebran, & Steftebran, & Alstebran communiter exponitur in Diosc. a Simone Ianuense, quod est Esula: sed tamen non est uerum. Imo est Ocimum garyophyllatum, ut patet per Gentilem prima terciij, capitulo illo, cum materiâ euacuare uolumus. &c. in fine: etiâ in prima. 2. cap. de cura ethice: licet dicat, quod non confidat. Et in Synonymis Auicennæ inueniunt. Stebran est species Ocimi. Etiam Mesue in quadam confectione cordiali, quam dicit esse filij Zachariæ, dicit esse Ocimum garyophyllatum. Etiam mihi uidetur, quod sit Basilicon. Esula enim est uenenosa. Licet ad hoc possit dici, sicut scis, quod multis modis aliquid dicitur cordiale: ut habes apud Auicennam alibi de uiribus cordis. Sed errat hic plane Ianuensis in illa collectione, & male improbat illos auctores. Nam autoritas eorum maxima. Veritas est ergo, quod Esula est Stebran, quæ est species Lacticiij, sicut dicit Ianuensis. Sed illud quod est species Ocimi est Steftebran, ut patet in Synonymis Auicennæ. Et in hoc aduerte, quod aliquando inuenies Stebran, ubi debet esse Steftebrâ, & e contra: & hoc est uitio scriptoris.

IOANNIS IACOBI DE MANLIIS

A

Alexandrinī, difficiliorū Herbarum explanatio,
de quibus hodie est controuersia: idq; se-
cundum ritum & sententiam
Officinarum.

De A S S A R O.

S S A R V S. i. Affara barbara, quā multi Gariophyllatā
agrestem uocant. De Asaro per simplex. S. scripto, uide Dioscor.
Est enim alia herba, quę a multis uulgari sermone Prouincula nun-
cupatur.

De S E C A C V L E.

Secacul, est Sigillum sanctę Marię, & non Iringus, ut quidam

Sigillum
S. Marię

herbolarij uolunt. Quare Serapion aliud capitulum facit de Secacul, aliud de Iringo. Pręterea
uide Serapionem, in septimo cap. de conditis: qui inquit, Secacul, est radix sicut Zinziber, & as-
portatur ex India, & fit ex ea in Gibo dum est recens: Et sic est secundum ueritatem, quod Seca-
cul secundum modernos, habet similitudinem Zinziberis, & hæc est quę a nostro idiomate uul-
gariter Zonogello uocatur, in partibus nostris, & in multa quantitate reperitur.

De R H A P H A N O.

Rhaphanus. s. Radix domestici. Circa instans ait, est herba cuius radix simili nomine appel-
latur, & per annum seruatur: radix competit uel uel medicinę. Quidam de nouo scribens, iniri-
latus, Lumen apothecariorū, exponit, quod per radices Rhaphani instiguntur syluestris. Sed
non est uera expositio. Quia regula est apud nobiles apothecarios, quod quando legitur Rha-
phanus, semper de usuali intelligendum est.

De D R A C O N T I O.

Luff planum. i. Dragontea. Mesue in capitulo de Luff dicit, quod est Serpentaria: & est plan-
ta, quę dicitur Collum draconis: & ex ea est alia plana habens folia: alia cuspa. Et melior toti-
us plantę pars est radix. Circa instans ait, Serpētaria, Colubrina, Dragōtea, Cocodrylla, est una
herba. Ideo sic dicta, quia maculas habet distinctas sicut serpens: uel quia uenenum fugat serpen-
tis, Est et alia eius species quę uocatur Iarus.

De E R V C A.

Eruca secundum Matthæum syluaticum, sunt duę species, domestica, & syluestris: & am-
bæ sunt omnibus notę. Domestica minoris est efficacię quam syluestris. Vt uel medicinę conue-
niunt semina sicut folia. Secundum uero Circa instans est contrariū. Quia Eruca domestica me-
lioris est efficacię.

De L I N G V A A V I S.

Lingua auis est semen Fraxini. Christophorus de Honestis exponit, quod est Delia gressitis.
Quod ignoro quid sit. Antonius Guaneri, & omnes alij moderni exponunt, quod est se-
men Fraxini. Sed Circa instans dicit, quod est herba satis communis, quę folia habet parua, a-
cuta, & similia linguę auis, uiridis multę efficacię: & per id credo, quod ignorauit eam.

De S C A R I O L A.

Scariola secundum Serapionem ex autoritate Diosco. de Endiuiā, habet duas species. Vna
est ex ea domestica, & est Scariola. Secundum uero Simonem Ianuensem est uel uel iacuca a-
grestis. Secundū Circa instans, Endiuiā est Scariola. Moderni uero distinguunt species Scario-
lę, Endiuię, & Cichoreę per alia nomina: tamen unā pro alia sæpe poni. In bladis autem Scario-
la reperitur.

De G A R Y O P H Y L L I S.

Sunt quidam flores in aliquibus partibus Italię, qui Garyophylli uocantur: eo quod odo-
rem garyophyllorum quę in officinis habentur, spirent. Quorum alij sunt coloris albi. Alij ue-
ro rubei: & isti apud Lombardos reperiuntur, in magna quantitate, & maxime apud nobiles
uiros. De uimine suo apud autores non reperi. Sed uidi depictum in libro qui dicitur, Manfre-
dus de monte imperiali, & ipse uocat Tunic. Reperitur etiam herba, quę dicitur Flus ante pa-
trem, sine Oculis Christi, uel oculus Consulis, ut uolunt herbarij. Forma uero ipsius reperitur
apud Matthæum syluaticum. Et hæc herba apud nos nascitur in pratis.

Graßblümē/
oder Negel-
blümē.

Vide Coroll.
Barb. d. 779.

C

Verba PANDECTARII nunc citati.

Filius ante patrem latine, Arabice Tariff, græce Garyophyllon. Plinius. Est herba faciens florem sicut buphtalmos; sed ramus post natus excedit longitudine ante natū, & ob hoc Filius ante patrem uocat. Et uocatur similiter oculus Christi. Auicenna in secundo dicit, quod est plāta quæ nascitur in uere; & flos eius similis est Croco hortulano.

De CALAMENTO FLUVIALI.

Quidam Herbarius dicebat, quod Calamentum fluuiiale, est Menta aquatica. Quod non est. Vide Nicolaum, qui exponit, quod Calamentum fluuiiale est Mentastrum, Et similiter ait Petrus de Crescentijs.

De CALAMENTO MONTANO.

Calamentum montanum est Nepeta, siue Gattaria. Quidam dicunt, quod est Origanum. Alij Pulegium. Quod non est. Sed secundum ueritatem, uerum Calamentū montanum est Gattaria, uel Nepeta: sic dicta Gattaria, quia Gattē libenter eam comedunt.

De SILERE MONTANO.

Sifselios, uel Siler, uel Platocyminum; & est Siler montanum.

De ACETOSA.

Acetosa secundum Auicennā alia est domestica, alia syluestris. Dioscor. uero eam uocat Lapatum; & illius ponit quatuor genera. Vnum quod manducatur. Et illud est quo nos utimur. Er est alterum quod nos dicimus Oxylapatium. i. acutum Lapatum. Et hoc est satis notum.

De LEPIDIO, & SEITARAGI.

Seitaragi, est genus Eruce. Auicenna in secundo canonis ait. Seitaragi ille qui est Indus, habet ligna parua, subtilia, & cortices sicut Gariophylli. Neque per id agnouit quid sit. Galenus autem in septimo simpliciu uocat Lepidium; & ille dicit, quod est genus Eruce. Et sic est. Quid autem sit communiter, ignoratur. Etiam Dioscor. uocat Lepidium. Et qui mihi non credit, qd Lepidium sit Seitaragi, legat cap. de Lepidio apud Diosc. cum capitulo de Seitarago apud Serapionem; & uidebit, quod idem est. Simon uero Ianuensis in capitulo de Hiberida cum h, a principio describit de forma hac. Hiberidos, quod est uerum Seitaragi. In fine capituli ipse inquit. Hæc uidetur quam Nasturtium agreste uocamus. In capitulo uero Iberidis p. i. a principio inquit. Seitaragi ex autoritate Pauli, in capitulo de Sciarica inquit. Iberidos, quā Lepidiū, alij Agricardamon appellant, quidam uocant ipsum Tapsiam Indam. Tu uero uide certitudinem huius plantæ, quod uerum Seitaragi secundum Paulum, est Nasturtium agreste. Et Nasturtium agreste, est Nasturtium aquaticum; secundum Circa instans, est Senation; & Senation secundum Diosco. est illa herba, quam Lombardi uulgo Crison uocant. Et sic sine dubio Seitaragi est species Nasturtij. Quia Serapion in suo capitulo dicit, ex autoritate Galeni, uirtus eius, & sapor, & odor, sunt similia uirtuti, saporis, & odori Nasturtij. Et sic flor Seitaragi, potest poni semen Nasturtij, quod est species eius.

De ORIGANO PERSICO.

Origanum persicum non reperit ab autoribus, quare ita appelletur. Moderni uero per Origanum, accipiunt quandam herbam, quam Lombardi uulgo Cornabobin uocant. Circa instans ait. Origanum. i. Golena. Serapion describit multas eius species, & secundum illum ponitur Diptamus inter species Origani.

De AMEIS.

Ameos est semen notū omnibus. Sed nota, quod meo tempore uidi multos herbarios uendere Ameos apothecarijs indoctis pro Apio, & generaliter ultra Padum, apud ciuitatem Papiensem. Vtuntur in conuiujs folijs Ameos pro folijs Apij.

De TUDERI.

Tuderi secundum Auicennam ex autoritate Dioscor. est herba habens folia similia Prassio, & radicem quadratam; & eius radix mensurā habet mediij cubiti, & habet capita in quibus sunt semina longa, nigra, & est hæc usitata. Tuderi uero syluestris, semen est rotundum. Auicenna in secundo Canonis declarat formam Tuderi, ex autoritate Dioscor. sed non reperitur sub illo nomine. Quia a Dioscor. uocatur Orminum. Et latine, Emola, uel Aurigalis, uel Reicalis. Et reperiuntur ex eis duplices. Vnus cum flore rubeo Et alter, cum flore albo, Ambæ apud nos nascuntur in tectis, ac parietibus, et iuxta hortos abundanter inueniuntur.

De DAUICO.

Daucus est semen Bauciae syluestris,

De M E V.

A

Dicitur quod est frustum diuersæ figuræ, in colore Agarici. Sed Dioscorides uocat Anethum syluestre.

De R V B E A T I N C T O R V M.

Rubea dicta sic est, quod radix eius est rubea. Sed Christophorus de honestis putauit, sed non recte, quod Diacurcuma efficiatur in colore Curcumæ, propter Rubeam tinctorum.

D E E V P A T O R I O.

Eupatorium secundum Serapionem est Gasit. Non est ergo Pulicaria, ut dicunt quidam Arabes. In ista planta Auicenna & Mesue sunt differentes. Nam Mesue dicit, quod illius flos est sicut subcitrini; Auicenna ait, flos eius est sicut Nenufar: igitur non concordant.

De S C O R D E O.

Scordeum, Auicenna & Serapion dicunt esse Allium agreste.

De A C O R O.

Acorus est quæ uocatur Gladiolus.

De F V.

Fu, id est, Valeriana, uel Potentilla, uel Amantilla, secundum Diosc. Multi appellant Nardum agrestem, Circa instans dicit. Fu intelligitur radix, & sic est. Et multi uulgares uocant eam herbam Benedictam.

D E H e r b a A D H I L.

Ioannes Anglicus dicit, quod est herba lupi, interficiens eum, & est Satyrion. Secundum aliquos est herba Eufragiæ. Verum meo iudicio Adhil magis debet dici Eufragia.

D E A R O.

Aron ipsa est quæ uocatur Pes Vituli, species Dragontæ, uel Dragontea minor, uel Serpentaria minor. B

D E M E Z E R E O N.

Mezereon. i. semen Allij, quod appellatur Coccum gaidium. Dioscor. in capitulo de Chamælea. i. Mezereon dicit. Chamælea, aut Coccognidion, non est semen Laureolæ, ut dicit Circa instans, in capitulo de Laureola. Serapion in capitulo de Laureola, loquitur in capitulo de Lauro. Alexander in cap. de hydropisi inquit. Chamælea, unde Coccognidion colligitur: & est Lacticinium, folia Oliuæ habens. & sic est: & propter hoc apud multos herbarios uocatur herba Oliuella, propter similitudinem foliorum ipsius.

D E S C A M M O N E A.

Est solutiuū magnū, & est species Volubilis, generis lacticiniorum. Laudatur tamen Antiochena, & Armena.

D E C H A M A E D R Y.

Quercus terræ, Quercula minor, Calamandrina.

D E L V P V L O.

Lupulus est species Volubilis.

D E C a p i l l o V E N E R I S.

Capillus Veneris, est id quod uocatur alias, Coriandrum putei, Capillus Algal, Capillus Porcinus, Capillus fontium, Capillus hominis nemoralis.

D E S O L A T R O.

Solatrium uocant Vuam uulpis, uel Vuam caninam. Et sunt eius quatuor species. Prima hortulana: & hæc apud nos uocatur herba Morela. Alia est species Alkafengi, dicta Cacabum uel Fiascho a uulgo. Tertia est Caballaris, a latinis Lunaria: & ista est Faba inuerfa. Quarta est Manicon, aut Pericon. Solatri species quatuor.

D E C V S C V T A.

Cuscuta, est podagra lini, eo quod linum necat. Serapion dicit, quod est herba inuoluens se sicut fila: sed in summitatibus habet fructum subulem: & ipsa crescit in arboribus, & in uinetis. Vocatur etiam Gringus.

D E P S I L L I O.

Psillium dictum est, eo quod semen eius pulicibus assimilatur, unde etiam latini Pulicarem

C uocauerunt. A nostris rusticis uocatur Linoxella: & in bladis reperitur.

DE POLYPODIO.

Polypodium quercinum, ipsum est quod alij uocant Liquiritiam syluestrem.

DE AFFODILLO.

Affodillus secundum Dioscor. est herba omnibus nota, folia habens sicut Porrum, uirgam leuem: quam multi Abluuium, id est, Aleta dicunt. Secundum Circa instans, Affodillus est quædam herba, quæ uocatur Centumcapita. Sed hoc est falsum. Melius uocatur herba Porraria.

DE SAXIFRAGIA.

Saxifragia tres habet species. Quarum una habet folia similia Pimpinellæ, sed maiora: & hæc est nota. Minor uero dicitur, quod est Oculus Christi. & sic est, Oculus Christi, uel Oculus confulis, secundum Matthæum, est Filius ante patrem. Medici dicunt, quod est Tetrahit, id est, herba Iudaica.

DE IRINGIO.

Iringus, aut Iringion, aut nux agrestis, ut dicit Diosc. ab alijs Cardopanis dicitur: & est species Centumcapiti, ut apparet apud Serapionem. Etiam ipse Serapion ait, Ascaracon, id est, Centumcapita, est coelestis coloris, inferius dicitur Iringi. Sed Centumcapita alba, est species spinæ. Et sic est. Et non est Secacul, sicut quidam falso opinantur. Iringus autem est planta spinosa, quæ in uis ac pratis nascitur.

DE PEUCEDANO.

Peucedanum secundum Matthæum syluaticum est Cauda porcina. Sed Cauda porcina secundum Simonem uocatur Milium solis.

DE VINCETOXICO.

Vincetoxicum, est quædam planta quæ multum iuxta Helleborum inuenitur, quare putatur sibi contraria: appellatur autem Vincetoxicum, eo quod contra toxicum est: cuius radix usui medicinæ conuenit. Nicolaus lib. 7. capitulo de Antrace dicit, quod est Consolida minor: & a nobis uocatur herba Morella, uel herba uenti, uel herba S. Laurentij. Neque per id Nicholus cognouit ipsum.

DE HERBA SYRIACA.

D Herba Syriaca ipsa est Malua. Sed ros Syriacus, est Sumach.

DE BALSAMITA.

Balsamita secundum Compositorem, est Menta aquatica, quæ alio nomine Sissymbrium appellatur. Sed Balsamita est Menta, quæ odorem balsami habet: & est herba, quæ apud nos circa aquas inuenitur.

DE SAMSVCHO.

Samsuchus, a Siculis Amaracus nominatur. Item apud eundem Centaurea minor. Quod falsum est. Nam Amaracus, si est Samsuchus, non est Centaurea. Præterea secundum modernorum opinionem, generaliter tenetur, quod Amaracus sit Alacoen alba. Ergo Amaracus est Matricaria quæ apud Auicennam. n. canonis uocatur Vehuen: & est herba quæ apud Lombardos, Crispa uocatur, uel Crispula. Sed Samsuchus est uera Maiorana.

DE SANGVINARIA.

Sanguinaria apud modernos est Bursa pastoris, quæ mirabiliter ualet contra fluxum sanguinis. Inuenit & alia Sanguinaria, quæ uocatur Corrigiola, seu Virga pastoris. Sed Ioannes Anglicus, per Sanguinariam intelligit Bursam pastoris. Apud Lombardos uocat herba Gugarolla.

DE MATRICARIA.

Matricaria, in secundo Auicennæ uocatur Vehuen, & est species Artemisiæ: & est illa, quæ a Lombardis Crispula uocatur.

DE ANAGALLIDE.

Anagallidis sunt duæ species. Nam una habet florem coelestem. Alia, cuius flos dactyli colorem habet, uel secundum Serapionem rubeum. Nascitur in pratis. Ambæ habent semen rotundum, simile semini Coriandri. Quidam dixerunt, quod sit Cichorea. Quod non est. Alij, quod sit Maiorana: quod etiam non est. Alij, quod Auricula muris: quod non est. Vocatur Anagallis alio nomine Mergelliam, uel Morfus gallinæ.

DE CONSOLIDIS.

Consolida maior uocat Symphytum apud Dioscor. Nasciturque circa aquas. Minor est her-

ba similis Artericæ, nasciturq; in pratis ac uis, purpureis floribus. Consolida media paucis est **A** cognita.

DE GALLETTRICH O.

Gallitrichum, uel Centrum galli, est herba quam multi rustici uocant Bezomo. Vnum nascitur in hortis, & comeditur inter olera. Alterū uocatur vulgariter Scarleazaz; & nascitur in pratis.

DE SANAMVND A.

Sanamunda, non est Pes leporinus, ut quidam putauerunt, sed Garyophyllata, similis Agri moniæ, cuius radix odorem habet Garyophylli.

DE SOLSEQUI O.

Solsequium secundum Simonem Ianuensem a multis uocatur Intuba: ergo est Endiuia. Nam Intuba est nomen græcū, sed a latinis Endiuia nuncupatur. Circa instans ait. Sponsa solis, Helionopia, Intuba, Cichorea, Dionysia, Solsequium idem sunt. Marthæus syluaticus dicit, qd Cichorea est Solsequium, uel Sponsa solis. Et Nicholaus dicit, quod Solsequium est Mirasol, Sponsa solis, uel Cichorea. Sed hic textus Nicholai non uidetur sonare bene: quia Mirasol non est Cichorea, sed Pentadactylos. Ioannes uero Anglicus Calendulam, uel Premulam ueris uocat Solsequium.

DE CAPRIFOLIO.

Caprifolium est Materfylua, & apud Dioscor. Periclymenon.

DE HERBAS. CHRISTOPHOR I.

Herba S. Christophori est Filius ante patrem, *Mergensblumlin* / *Mergentöslin*.

DE MILLEFOLIO.

Millefolium, est herba quæ omnibus nota est. Diosc. Muriophyllos, siue ut latini Millefoliū, id est, supercilium Veneris uocant.

DE SPARGULA.

Spargula, secundum Compositorem est Rubea tinctorum minor. Et sic hodie habetur Gen **B** tilis opinio. Dioscor. uocat Rubeam, & inquit, Rubea, quam alij Trithrodanum, latini uero Rubricam dicunt. Herba est omnibus nota. Eius species sunt duæ. Vna agrestis. Alia quæ appellatur Sparthos, ramulos, siue tyrsos habens tenues, & quasi nodosa folia, per interualla distantia, atq; per singulas enodationes ueluti stellarum imaginem nunguentia. Fructus, siue semen rotundum est, & uiride: dehinc rubrum, aut circa maturitatem nigrum. Radicem habet tenuem, & parua, & rubicunda: & hæc est forma Rubeg tinctorū. Si autē habere non poteris minorem, potas maiorem, Minor uero non est illa herba, quā nostri rustici Rasparellam dicunt, sed est aliud.

DE HERBA VENT I.

Herba Ventī, s. herba Ventī maior: & est Paritaria. Eius species duæ sunt, s. maior, & minor. Maior uero est Paritaria, siue Vitriola, siue Alefenem, ut apud Dioscor. siue herba Vitri, ut apud Auic. Idem Circa instans ait. Paritaria herba est quæ alio nomine dicitur Vitriola. Quia optime uasa mundificat. Hæc apud nos in muris nascitur, & dicitur a uulgo Veraxium. Minor uero est Consolida minor habens florem sicut Artetica: sed sunt purpurea. Et dicunt sapientes, quod utraq; in unguento disponantur.

DE AGRIMONIA.

Agrimonia herba est satis nota, apud nos in pratis reperitur. Dioscor. autem inquit. Agrimonia herba omnibus nota, quæ Feraria minor dicitur. Nascitur in campis, uel circa sepes. Cuius radix græco nomine Eupatorium dicitur: eo quod diuretica sit ualde apud modernos. Eupatorium est aliud. Gal. in lib. ad Paternionem de Agrimonia, & Eupatorio in uno cap. loquitur: in fine uero ait. Huius igitur radicem græci Eupatorium dicunt.

DE HERBA PARALYSI.

Herba Paralysis secundum Compositorem, est herba sancti Petri, siue ut alij Præmula ueris. Eius species sunt duæ, s. maior, & minor. Maior uero est herba sancti Petri, quæ in hortis nascitur, cum folijs uiridibus, parum incis: hæc nota est omnibus. Minor est illa quam hodie generalit herba Margaritā dicimus: cuius flos similis Camomillæ est. Huius in pratis plurimū est.

DE CICHOREA.

Cichorea scdm quosdā, est Intuba. Alij Solsequiū. Alij Sponsam solis uocāt. Columella in lib. de cultu hortorū ait. Cichorea teneris frondēs lactucula fibris. Plī. ait. Intubū erraticum, apud nos qdā Ambulā dicunt. In Aegypto Cichoriū uocāt. &c. Cichorea uero scdm Compositorem, est Rostri porcinū, & est herba cuius flos est coelestis. Et sic est scdm ueritatem, quod uera

C Cichorea, secundum sententiam modernorum habet flores azurinos: & est species Endiuia.

DE BACTISOSERE.

Bactisofere, apud nostros autores non reperio aliquem de ipso loqui. Secundum intentionem Compositoris, est quedam herba cuius flos est celestis: & eius semen est ut semen Scariole agrestis: sed non est album, neque nigrum. Et nascitur in bladis ut plurimum, & credo quod sit Scariole agrestis. Quid autem sit, communiter ignoratur. Sed secundum plures est illa herba, quae in bladis reperitur.

DE I V A.

Iua est uera Chamæpytheos, & non est Chamædryos, ut quidam crediderunt. Generaliter tamen tenetur, quod Iua non sit Chamæpytheos. Sed errant. nam ego uidi apud multos apothecarios in sacculis Chamæpytheos, de quo loquuntur nostri autores, sed loco Chamæpytheos habent Chamædryos. Vnde per hoc dico, si aspexeris illam Iuam, qua moderni utuntur, pro Iua muscata, uidebis, quod & in forma & in reliquis est uerum Chamæpytheos.

DE SERPILLO.

Serpillum secundum Plin. a serpendo putat dictum, quod in syluestri euenit in petris maxime. Satiuum non serpit, sed ad palmi altitudinem crescit. Dioscor. Serpillum, siue ut alij, Herpillum, latini Cicer erraticum uocant, &c. Folia & flores secundum Circa instans medicinae competentur.

DE CORRIGIOLA.

Corrigiola, i. Polygonia, siue Centurnodia, siue Virga Pastoris. Diosc. uocat ipsam Polygonos masculum: & ibi etiam describit aliam, quae dicitur Polygonos feminina. Petrus de Crescentijs inquit. Virga Pastoris est Cardus syluestris. Ille textus non uidetur bene sonare. Nam Virga Pastoris non est Cardus, ut ipse & alij dicunt. Nam si legis capitulum de Polygono apud Dioscor. cum cap. de Virga pastoris apud Serap. & Auic. uidebis, quod idem est. Et idem Io. Serap. in ca. de Lapide, uocat ipsam Diminutionem. Et haec herba in usum multum reperitur. Matthaeus syluaticus, in capitulo de Dyspnoea. i. Cardio fullonum dicit, quod est Virga pastoris. Sed non recte. Quidam uocant Corrigiolam Sanguinariam: sed secundum aliquos Sanguinaria est illa herba, quam hodie Bursam pastoris uocamus, siue a uulgo, herba Gugiarella.

DE ENDIUIA.

Endiuia, nomen latinum est, post graecum Intuba. Arabes etiam post graecum, Hundebe dicunt. In hac uero uolo ostendere omnes species Cichoreae, uel Endiuiae, uel Scariole: sed primo uolo ostendere illas species, de quibus ipse Nicholus in proprio libro loquitur. Nam in cap. de debilitate Epatis, sic ait. Dixit Auic. Taraxacon, quam Gentilis dicit esse Cicerbitam, siue Rostrum Porcinum. Et Guilielmus dixit ipsam esse Cichoream. Et est illa species, quae a multis uocatur planta Leonis. Hic textus Nicholi, uidetur corruptus. Nam ipse Nicholus debebat dicere, quod Dens Leonis, quae est species Cichoreae, & non Planta Leonis, quae est herba dicta Flaura, uel Maura, quae odorem Asphalti habet. Et haec est species Trifolij: quod est consonum. Idem in capitulo de opilatione Epatis dicit. Taraxacon, est species Sponsae folis. Et inferius in eodem cap. inquit. Rostrum Porcinum est Cicerbita. &c. Habita opinione Nicholi, sequitur opinio Iohannis Anglici, quae est, quod Altaraxacon est Rostrum porcinum, uel Cichorea. Idem sentit in capitulo de fistula.

DE ENDIUIA domestica.

Endiuia domestica, id est, usualis, est herba satis nota. Syluestris uero potest dici, quod sit Crispinus herba. Cichorea uero secundam sententiam modernorum, habet flores azurinos, uerentes seipso ad solem: quare Sponsam folis, & Solsequium uocauerunt. De qua Circa instans ait. Sponsa folis, est Cichorea, uel Intuba, uel Solsequium. Haec etiam est satis nota. Serap. in ca. de Endiuia, inquit, Hundebe sunt species. Nam ex ea domestica, & est Scariole. Et est ex ea syluestris, quae est Taraxacon. Et est tertia species quae dicitur Candarel, & est Amiron. Etiam secundum Circa instans, & Petrum de Crescentijs, Endiuia est Scariole. Galenus in octauo simplicium dicit. Seris, i. Endiuia.

DE CONDRIYLLA.

Condrylla est species Cichoreae, uel Lactuae. Auic. in secundo canonis, in cap. de Endiuia, ait, quod est ex ea syluestris, & hortulana duarum specierum. Magis iuuatiua ex eis Epatis, est illa, quae est magis amara. Ego credo, quod sit Cichorea. Idem aliud cap. facit de Taraxaco, & dicit, quod est species Endiuiae. Et ista nota est.

DESCARIOLOA.

Scariola uero secundum Simonem Ianuensem, est uelut Lactuca agrestis, nisi quia in dorso costarum habet spinas paruas. Sed Mathus syluaticus, & Isidorus uolunt, quod Lactuca agrestis sit Scariola: ut dictum fuit. Etiam hic dicam uerba Isidori, quæ in capitulo de oleribus dicit. Lactuca agrestis, est quam Sarraliam nominamus, eo quod dorsum eius in modum ferreæ est. Si mon in hac errat. Nã in cap. de Scariola dicit, qd ipsa est uelut Lactuca agrestis. Et in cap. de Sarralia inquit, ex autoritate Isidori, quod Sarralia est Lactuca agrestis. Et in fine dicit, qd est Scariola: & sic uolunt multi moderni.

DECICERBITA.

Cicerbita uero sicut dicit Nicholus, est Rostrum Porcinum. Secundum Buliæ est Cichorea. Et est herba, cuius flos est cœlestis. Etiam reperiuntur duæ aliæ species, quæ florem cœlestem habent: & omnes in bladis reperiuntur. Et si bene consideretur, uidebis quod species Endiuia, uel Cichorea sunt septem: & sunt istæ uidelicet. Endiuia domestica. i. usualis. Cichorea, quæ ab omnibus nota est. Rostrum Porcinum: & Dens leoninus, differunt parum inter se, secundum modernorum opinionem: in pratis reperiuntur cum flore croceo, nisi solum in folijs differunt. Post maturationem florum producunt quandam lanuginem albam, quæ cum tangitur, euolat. Et alia est dicta Crispinus a uulgo: & hæc apud quosdam est Lactuca asini. Quod non credo, sicut patet, si legis capitulum de Anchusa apud Diosc. uidebis, quod cum cap. de Crispino, non conuenit. Et est alia species quæ dicitur Cicoriastrum: ut est Scariola, quæ in bladis reperitur. Et omnes istæ species, uocantur Endiuia, uel Cichorea, uel Scariola. Et hæc notæ sunt apud sapientes.

Septem species
Endiuia;

DE MELISSA.

Melissa secundum modernorum sententiam, est Ozymum citratum: cuius folia odorem Citri habent, & Citraria dicitur.

DE PERSICARIA.

Persicaria. i. herba sanctæ Mariæ. Et est herba quæ habet folia similia Persicis, signata: apud nos iuxta hortos reperitur. Existimant quidam, quod hæc sit Zinziber caninum, ut uidetur sentire Auicenna in secundo canon. Etiam putauerunt quidam, quod ipsa sit Piper aquæ.

DE PERFORATA.

Perforata. i. herba sancti Ioannis, siue Fuga demonum, siue Hipericon. Et dicitur Perforata, quia folia eius habent foramina parua. In locis domesticis reperitur. Auerrois in quinto Colliget ait. Eufericon. i. Hipericon nelfricon. Et quidam appellant hanc herbam Cordialē, eo quod assimilatur cordi.

DE MATRICARIA.

Matricaria, est Artemisia. Et est illa, quæ Diosc. uocat Leptaphyllos. Sed Auic. in secundo Can. uocat ipsam Vchuen. Aliquando Alacoen. Et hæc est quam Lombardi Crispulā dicunt.

DE MATRICARIA minore.

Matricaria minor, secundum plurimum est secunda species Artemisias. Diosc. formam ipsius describit. Et hæc est illa, quam hodie Tanacetum, siue Daneta uocant.

DESCABIOSA.

Scabiosa, est herba satis nota. Sed miror, quod nostri autores de ipsa non loquuntur. Tamen secundum intentionem Mathæi syluatici dicit Scabiosa latine, quæ græce stibos, uel stibeos. Et ibi loquitur de Scabiosa ex autoritate Diosc. sub litera Scabiosa, quod non reperitur. Verum est, quod Diosc. ca. unum facit de stibeos. Sed ignoro quod illud sit de Scabiosa.

DE BETONICA.

Betonica, est herba satis nota. Dioscor. uocat ipsam Betonicam. Serap. in cap. de Betonica dicit. Plurimum quod ex ea administratur, sunt folia. Galenus in septimo Simplicium dicit. Cestrum latine, dictum Betonica. Macer ait. Betonicam soliti sunt Cestron dicere græci. Plinius. Verones in Hispania, eam quæ Betonica dicitur in Gallia, in Italia autem Sarratula, a græcis Cestron dicitur. Auerrois in quinto Colliget ait. Alchisom quæ in Latio dicitur Betonica & in persica lingua Berahuem.

DE FRAGARIA.

Fragaria, herba est ferens fraga. Et granum ipsum secundum Math. syluaticum, est granum

C acetosum: eius plāta similis Pentaphyllo. Quapropter Plin. in cap. de Quinq; folio dicit, quinq; folium fraga gignere, non quod illud sit Quinq; folium, quo nos utimur in medicinis, sed ad eius similitudinem. s. a numero foliorum, Quinq; folium appellauit. Apud nos uero Fraga sunt fructus, qui quando maturefcunt, rubicundi efficiuntur, & satis noti sunt.

DE EVFRAGIA.

Eufragia, est herba quæ in pratis, ac alibi inuenitur. Et secundum Matthæum syluaticum, est herba Adhil. Et laudat ipsam, Quia medetur ægritudinibus oculorum.

DE CAPITULO VENERIS.

Capillus Veneris apud Auicennā in secundo Canon. uocatur Bescagnascen. Et dicit, quod est Coriandrum putei. Et persice est Bescagnascen. Et syriace, est Capillus porcinus. Et arabice, est Capillus algul. Isidorus dicit. Capillum Veneris uocatum, siue quod elapos post alopiā capillos recreat: uel quod capillorum fluore cōerceat: uel quod sit uirgulis nigris, leuibus, cum splendore, quasi capilli. Eius species secundum modernorum opinionem sunt tres, scilicet capillus Veneris, qui satis est notus. Polytrichum, quod herba est, quæ in puteis reperitur. Et Adianthon, quod similitudinem habet Capillorum Veneris. Et hæc iuxta fossas reperitur. Et sic istæ tres species, in uirtute differunt parum ab inuicem.

DE BERBERI.

Berberis apud Auicem. in secundo Can. nominantur Ambiberberis, & apud Dioscor. uocat Oxyacanthos. i. spina acuta. Et est arbor quæ in parvis nobis iuxta aquas nascit. Eius fructus exprimit, & fit ex eo uinū: quod apud herbarios dicit uinū de Crispino. Etia apud modernos ex succo ipsius fit licitū. Et secundum multos, hæc est arbor mali granati syluestris, quæ a Serap. Darisfaham uocatur. Sapientes habent hoc pro secreto.

DE CITRVLIS.

Citrullus est Cucumer: cuius forma longior & maior est nostro. Et sunt, qui loco eius ponunt semina Cucumeris usualis.

DE ABSYNTHIO.

D Absynthium, secundum Dioscor. est notum. Cuius probabilius est Ponticū, & Cappadocium, nascens in montibus: unde nomen accipit a terra. Infra habentur duæ aliæ species. Plin. dicit. Plura sunt eius genera. Sandonicum appellatur a ciuitate Gallie. Ponticum de Ponto. i. ubi pecora illo pinguescunt, & ob id sine felle reperiuntur. Neq; aliud præstantius, multum Italico amarius: sed medulla Pontici dulcis. Sed illud Absynthium quod hic intendimus, est Absynthium Ponticum, uel Romanum, uel cōmune quod satis est notum.

DE PEDECOLOMBINO.

Pes uero columbinus, secundum Serap. est Amomum. Secundum uero modernorum opinionem, est herba habens folia rotunda, parua, diuisa in magnis & paruis incisuris: stipites ipsi sunt subtilis coloris, subrubei, habentes nodos raros, in quibus sunt duplicia folia, & semina tria, uel quatuor, uel quinque coniuncta in medio eorum, sicut acus. Hæc apud nos nascitur in uis ac pratis. Auerois, in quinto Coll. dicit. Pes columbinus est quatuor specierum, & parum diuersificantur a se ab alia.

DE ANDACHOCHHE.

Andachoch, uel Andachocha, ut apud Auic. & Serap. est Trifolium: cuius alia est syluestris, & alia domestica: & alia est ægyptiaca: & fit ex semine eius panis.

DE ARISTOLOCHIA.

Aristolochia rotunda dicitur, quod radicem rotundam habeat. Isidorus inquit. Aristolochia dicitur, quod optima sit. Nam superflua post partum, matricem beneficio uaporis expurgat. Et sunt duæ species. Vna est rotunda dicta, propter quod rotunda radicem habeat. Altera longa: quia longam radicem habeat. Diosc. habet tertiam speciem quæ dicitur Dermalicis.

DE AGNOCASTO.

Agnus castus, secundum Serap. ex autoritate Dioscor. Sunt ei duæ species. Dicitur castus, eo quod religiosi sternunt hanc plantam sub lectis ad refrigendam libidinem. Et nominatur ligos, propter duritiem uirgarum eius. Et est planta in magnitudine arborum. Nascitur prope aquas & in locis aquefribus. Gal. ait. Id quod administratur ex hac arbore in medicina, sunt folia. Et semen est factum ad modum pipitis. Et propter id uocatur Piperella. Auerois in quinto Coll. inquit Pentasura dicitur a persis arbor Abraham: & in latino dicitur Agnus castus.

Capilli Veneris species tres,

De HERBARVBEA.

A

Rubea, scilicet Rubea tinctorum. Ita habent alij Doctores. Radix eius herbæ est id, quod est iuuatuum in medicina. Plinius ait. Erithrodanum, quam aliqui Ereuthrodanum uocant, nos Rubeam, qua tinguntur lanæ, pelleq; perficiuntur. In medicina urinam ciet.

De CHELIDONIA.

Chelidoniæ uero secundum Serapionem in cap. de Curcuma, dug, sunt species s. f. maior, & minor. Dicit, quod nominantur hoc nomine, eo quod uer incipit apparere ante aduentum hyrundinum, & desiccatur quâdo recedunt. Putant aliqui etiam, quod sic nominentur propterea, quod quando excæcantur pulli hyrundinum, desert eis mater hanc herbam, & dat eam illis in cibum; & reddit uisum hyrundinibus.

De VRTICA.

Vrtica, est herba satis nota. Dioscor. dicit Acalifex, siue ut alij, Ignida, latine dicitur Vrtica. Eius altera maior, quæ & usualis est, & simplex, cum tenui semine, ac folijs minutis, asperis. Altera agrestis est, densioribus folijs atq; latioribus, nigrioribus. Est etiam alia Vrtica dicta mortua; & hæc apud modernos dicitur Angelica, seu Archangelica. Et est alia dicta Vrtica Mora: cuius folia magna ac nigriora sunt; & hæc dicitur Millemorbia, siue herba Ficaria; sed a latinis dicitur Scrophularia.

Millemorbia.

De HARMEL, uel agrestis

R V T A.

Harmel, id est tertium genus Rutæ, secundum Marthæum syluati. Harmel, scriptum cum h, est semen Cicutæ; & Armel scriptum sine h, est genus Rutæ. Eandem habet opinionem Luinen tenebrarum, quod Harmel sit Cicutæ. Sed falsum est. Sed Harmel cum h, & sine h, est tertium genus Rutæ. Nam Dioscor. in cap. de Ruta quasi in fine ait. Alterum genus Rutæ, quod nascitur in Macedonia & Galatia, quam Molin ciues appellant. Idem in fine ait. Rutā multi Armolam uocant. Syri Vafafa. Nascitur locis cultis. Auicenna in secundo canonis inquit. Ruta syluestris, uehementioris est nigredinis, quam Alharmel cum h. Item lege capitulum de Harmel scriptum cum littera h, apud eundem; & est idem cum cap. de Armola apud Dioscor. Idem in quarto canone, in capitulo, de curatione morsus uiperarum, inter reliqua sic Canon ait, Ruta syluestris, & non est Alharmel, secundū quod existimauerunt quidam, imo est species Rutæ ipsi us; & sic est sine dubio. Sed Auerois in quinto Coll. ait, Alharmel, id est, Cicutæ. Quod falsum est. Nam secundum plures sapientes creditur, quod Harmel cum h, & sine h, idem sit; & possibile non est, quod Harmel cum h, sit Cicutæ. Nam Serap. de Harmel cum h, capitulum facit, cuius formam hic uolo describere: ut magis appareat ueritas, & hæc est, Harmel secundum Serapionem nominatur Moli. Et nominant eam multi Rutam syluestem. Et est planta quæ egreditur ex una radice cum multis ramculis; & habet folia longiora folijs Rutæ alterius, & meliora, habentia grauem odorem; & habet florem album; & capitella maiora satis quam capitella Rutæ domesticæ, diuisa tribus diuisionibus: in quibus est semen amarum: cuius color est, ad rubedinē decliuus. Habet tres angulos; & est id, quod de planta uenit in usum medicinæ; & spsum maturat; & colligitur in autumnio; & sic est, si aggregaueris Rutam syluestem qua utuntur moderni, eadem est cum illa.

B

De EVFRAGIA.

Eufragia est herba, quæ apud nos in pratis reperitur; & est minuta herba. Mirabiliter medetur ægritudinibus oculorum. Et propter id Mesue in sua practica, in capitulo allegato, uocat ipsam herbā Adhil. Fœniculus similiter ualeat in illa materia. Vnde uersus. Fœniculus, uerbena, rosa, chelidonia, ruta. Ex istis sit aqua clara, quæ lumina reddit acuta. Et nō est cōpletus uersus, nisi addatur Capillus ueneris, Eufragia, & Betonica.

De CYN OGLOSSA.

Alchazaber humida. i. recens, & est Lingua canis, seu Cynoglossa. Sed generaliter dubitant aliqui, an Alcalcachar, & Alchazaber sint idem: sed sine dubio idem sunt.

De VITICELLA.

Viticella, secundum Marthæum syl. est Fescera, siue Fosire; ergo est Brionia, quæ apud Diosc. Ampelos leuce uocat; sed scdm Simonē Ianuē. est Fesirefin. i. Viuis nigra, siue Ampelos melana, ut apud Diosc. In hac discordia, nescio quid dicam; quia secundū intentionem Marthæi syl.

C est Brionia, siue Vitis alba: & scđm Simonem est Vitis nigra. Non igitur concordant. Verum secundū plures, Viticella, est Vitis nigra: & est planta quæ iuxta hortos nascit: & est quæ Lombardi Tanero vulgari nomine dicunt.

De TAPSO BARBATO.

Tapfus barbatus, est planta omnibus nota. Hęc apud Dioscor. uocatur Flosmos: sed apud Auicē. in secundo Canone uocatur Busrī. Isidorus Flosmos, quam latini herbam lucernarem uocant, ab eo quod ad lichnia proficiat. Hęc planta apud nos nascit super muros, & in campis: & uocant rustici Auidon, siue Auion.

De CARDIO.

Cardo, seu Cardus qui apud Diosc. uocatur Dipfacus, cuius frutex est spinosus: & iste frutex gerit quandam rem qua utuntur fustiones ad garzandum pannos & biretas. Galenus etiam in sexto Simplicium Pharm. dicit. Dipfacus. i. Cardo. Petrus de crescentis inquit. Virga Pastoris. i. Cardus. Sed falsum dicit. Quia Virga Pastoris est herba quæ uocat Corrigiola. Et differt multum, sicut patet apud Dioscor. cap. de Dipfaco. Erapud Serapion. cap. de Virga Pastoris.

De ACEDULA.

Acedula nomen multis herbis attributum est, in diuersis regionibus. Nam Acetosa Acedula potest dici. Idem Trifolium Acetosum, siue Panis cuculi, siue Aleluia idem. Macer autem de Acedula speciale capitulum facit, inquit. Diximus Acedulam, quam græcus dicit *κίω*. Ergo est Semperuiua. Nam Aizon apud Dioscor. est Semperuiua, & componitur ab *αἰ* quod est semp, & *ω* quod est uita. Verū scđm modernos Acedula est Acetosa, aut est idē in uirtute.

De VISCO QUERCINO.

D Viscus quercinus. i. Dabar scđm Diosc. lachryma est arboris, lenis, & uiridis coloris, de intrus obrutum, & nihil asperum. Colligitur & de semine obrotundo, quod in arbore dryi, id est, quercu nascitur. Folia habens similia buxo. Hoc semen primo tundit, et lauatur, & postea coquitur. Multi uero illum masticando conquassant. Fit etiam ex arbore Mariani, & de Piro, et ex diuersis arboribus aliquando: & in radice arborum, & in frutice inuenit. Apud Auicē. eius fructus est similis Ciceri nigro, non sinceræ rotunditatis, uirgularis, frangibilis, ex quo manus inuisantur. Eius autē minera est arbor ferens glandes, & malus, & pirus, in quo sunt uirtus aërea, & aqua multiplicatæ ualde: & qui ex eo bonus est recens, planus, coloris puri, interius uiridis, exterius teritur & lauatur, deinde coquitur. Hodie multi apothecarij, qui omnia scire fatentur, loco eius ponunt Viscum quo utuntur nostri rustici ad capiēdas aues. Sed uerus Viscus quercinus fit ex quodā fructu simili piro, qui reperitur super arbores ferentes glandes, seu arbores quercus: & propter id Viscus quercinus appellat. Desertur a Venetis ad nos in formis rotundis prout succus liquiritiæ.

De CHEIRI.

Cheiri Arabice est planta, quæ flores citrinos, seu aureos producit, & est Viola citrina. Auerrois in quinto Col. ait. Alcheiri est Viola de Romania. Serap. Cheiri est planta nota, habens diuersitatem in specie suo, quæ a diuersitate florū cognoscitur. Nam quedam habent album, quædam purpureum, & quedam citrinum. Qui habet citrinum, melior est & aptior in medicina, & hæc satis est nota.

De TRIFOLIO ACETOSO.

Triphyllon acetosum. i. Trifolium acetosum. Quidam dicunt quod est falsum: quia reperitur in Nicolao Trifolicon. & ibi dicitur, quod Trifolium dicitur a uiridibus folijs Rur, quæ in eo ponuntur: & dicunt, quod hic idem intelligit. Sed ignoro. nam in aliquibus codicibus Me sue antiquis inuenit Trifolium acetosum quod melius est: & est herba dicta Aleluia, siue Panis cuculi, quoniam sapore est acetosa. Præterea uide apud Mattheum syluaticum in cap. de Pane cuculi, quæ dicit de isto Trifolio.

De ARTHANITA.

Arthanita secundū Auicē. in. 2. Can. est Buchormarien. Tamē miror, quod idē in. 1. Can. in Fen. 16. in cap. de compositione solutiuorū eius qui habet colicā ex uentositate, aut materia stagnatica, de quibus sunt clisteria, ponit ibi Buchormariē, & Arthanitam, ergo falsus est textus secundū Can. Rasis in nono Almanso. in cap. de colicā idem habet: idem in capite de apoplexia in clisterijs. Auic. aurem. 2. Can. dicit. Arbor Mariæ, est Buchormarien: & iam dictum est de ea. Et est trium specierum. Una species eius sine fructu, duæ cum fructu. Ego non intelligo quid uelut Auic. per talia uerba. Nam arbor Mariæ est Rosmarinus: & Buchormarien secundum ipsum est Arthanita: quod non est possibile. error uero qui inuenitur in ipsa, pud me nunquam sepa-

rabitur. Hodie generaliter habet opinio, qđ Rafis in illo loco errauerit, ponere Buchormarię, et **A** Arthanitam. Sed non recte: quia in hac inuenitur differentia quę reperitur inter Scedenegi sine. h. & inter Schedenegi cũ. h. similiter est differentia inter Buchormarien scriptum cum litera t, & inter Buchormarien scriptum cum litera. c. nam ibi Rafis habet Buchormarien scriptũ cum litera. c. & hæc est arbor Marię, siue Rosmarinus: si uero reperias Buthormarien, est uera Arthanita, de quo uide Serap. in cap. de Ciclamine, qui inquit, Buthormarien. i. Ciclamen; in cap. uero de arbore Marię dicit, quod est Libanotis: ergo est Rosmarinus: & sic si bene legeris, uidebis quod Buchormarien est arbor Marię, & Buthormarien est Ciclamen, seu Arthanita. Franciscus. de pedemon. in cap. primo de dolore intestinorum & medicinis eius, ait: Buchormarien est radix Piretri, uel Maliterrę. Quod est falsum, nam Buchormarien non est Piretrum, uerum si diceret, Buthormarien est Malum terrę, sed non Piretrum.

De F I L I C E.

Filix secundum Isidorum a singularitate folij dicta, deniq; ex una uirgula altitudine cubitali unum scissum folium gignitur, res applicata uelut penna. Dioscor. autem de ipsa duo facit cap. unum de Dipteris, aliud de Seliteron. Secundum uero Matthæum syl. Dipteris est Polypodiũ. Sed non recte. nam si legis cap. de Dipteris apud Dioscor. cum cap. de Filicę apud Serap. uidebis, quod idem sunt. Ipse uero Serap. in uno cap. loquitur de masculo, & femina. Auicenn. in secundo can. duo cap. facit, unum de Childaru, & aliud de Saracę. Hęc apud Dioscor. nascitur sine semine, sine flore, & sine hasta. Sed quidam modernorum dixerunt, quod in nocte sancti Ioannis aliqui uadunt ad locum ubi Filix nascitur, & ibi stant per horas tres: & dicunt, quod cito in illa hora Filix gerit florem, post semen. Deus melius scit.

De Herba s. M A R I A E.

Herba sanctę Marię secundum Comp. est Persicaria, seu sanguis Christi: secundum uero Matthæum syl. est herba ad albedinem tendens, cum folijs rugosis: sicut herba quę dicitur Flosmos. i. rapus barbatus. Sed non recte dicit: quia si Compositor dicit, quod est Persicaria, eius forma non est: ut dicit Matthæus. Pręterea Leonardus ait. Herba sanctę Marię, siue Persicaria: & sic est secundum ueritatem. Et eius forma est: quod habet folia similia folijs Persici, intra quę sunt puncta nigra: apud nos iuxta hortos nascitur. Inuenitur alia species quę caret maculis: sed hæc non est tantę uirtutis. Quidam uocant ipsam Zinziber caninum, alij Persicariam, am sigillo. Secundum Petrũ de crescentijs, herba sanctę Marię est Menta romana, uel sarracēnica, quod falsum est: nam in isto unguento utrumq; ingreditur.

De Herba C R A S S U L A.

Herba Grassula secundum Compositorem est Faba grossa. Cuius species sunt tres. f. Crassula maior. i. faba grossa. Minor uero est Vermicularis. Media est Cardus benedictus. Sed Lumen, uerius tenebra apothecariorum, exponit, quod est Vermicularis. Sed falsum est, nam uera Crassula est herba habens folia uiridia, & pingua, ut Semperuiua, cum flore tendente ad albedinem: nascitur autem apud nos iuxta fossas: & est illa, quam nostri Rustici uulgo Fabam gracam dicunt. Sed non recte: quia aliud est: sed debent dicere, Fabam grossam. Infra apparebit oleum frigidissimum, uiride: & ibi melius certificabo, quod Crassula non est Vermicularis: ut dicit Lumen male lucens.

De C E N T U M N E R U I A.

Centumneruia secundum Compositorem, ac Giliber. est Arnoglossa, siue Plantago maior. Hęc apud Auicenn. uocatur Lingua arietis, & est herba quam nostri rustici Bletam syluestrem uocant. Illud uero Lumen fuscum, loco Centumneruię, habet Centauream. Quod non recte actũ est, nam in isto unguento ingreditur & Centumneruia & Centaurea.

De Q V I N Q V E F O L I O.

Quinq; folium. i. Pentaphyllon. Auicenn. in secundo can. duo capitula facit: unũ de Pentaphyllon: aliud de Quinq; folio: quod idem est. Dicitur autem Pentaphyllon a numero foliorũ: quia p singulas anodationes habet quinq; folia. Auicenn. in cap. de Lacticio ponit Pentaphyllonem in ter species eorum.

De T E T R A I T.

Tetraite, seu herba Terrait, ut dicit Leonar. secundum Giliber. est herba Iudaica. Idem ait Compositor: sed multi hodierni apothecarij credunt, quod dicat Torathit. Sed non recte: quia Torathit est fungus nascens in radice Rosę caninę, siue Barbę hircinę, ex quo fit Hippoquistidos: & hoc multi ponunt, qui errant. nã aliud est Tetraite, aliud est Torathit. Si uero Compositor uult, quod Tetraite sit herba Iudaica: ergo est Herbum. nam Auicenn. in secundo can. inquit, Herba Iudaica. i. Herbum: & Herbum apud Dioscor. est Orobum: cuius aliud est pallidum, aliud subrus-

C sum, & aliud album. Circa instans dicit. Te trait est herba Iudaica: & sic est secundum veritatem, quod Teraist est herba Iudaica, siue Herbū, siue Orobum: ergo est Herbilis, aut illa herba quā rustici et Mocho vulgo dicunt.

De M E N T A S A R R A C E N I C A.

Menta sarracénica. i. Menta romana, seu nigra. Nam eius planta est nigra, ad similitudinem Sarracenorum: cuius folia maiora sunt quam Mentę hortulanę. Hęc apud nos iuxta aquas inuenitur. Petrus de crescentijs in cap. de Menta ait. Mentę tres sunt species. Est enim quedam domestica: quę proprie hortulana dicitur. Et est alia sylvestris, quę Mentastrum nuncupatur. Et est alia quoque Menta quę longiora, latiora, & acutiora habet folia: & hęc est Menta romana, uel sarracénica: & vulgariter herba sanctę Marię uocatur. Quod falsum est. nam supra in isto unguento posita fuit herba sanctę Marię: ergo non est Menta sarracénica: ut inquit ipse. Hic Nicolaus dicit. Et alię Mentę. Idē dicunt alię, ut Giliber, & Leonard. & significat alias species Mentę quas ipse non nominauit. Nam species Mentę sunt quinę, de quibus tres nominauit supra, & alias duas non nominauit: & illas quas intelligere debemus per alias Mentas, est Menta communis, seu hortulana, & Mentastrū. Et sic meo tempore uidi in hoc ponere quinę species Mentę: quę sunt Menta hortulana, siue communis, uel odorifera: & syluatica, & est Mentastrum: & est alia quę dicitur Sarracénica, siue Romana: & est alia quę dicitur aquatica, siue balsamita: & est alia quę dicitur Menta nō odorifera, & hoc est Calamentum: & sic omnes istę quinę debent poni in isto unguento. Sed Lumen de quo supra, inquit, quod per alias Mentas nō intelligitur, nisi Menta domestica: sed non recte, ut est notum apud omnes sapientes.

De P O L Y T R I C O.

Polytricum: herba est minuta, cuius stipites uergit ad nigredinem. In puteis hanc uidi, in muris, ac locis humidis: & hoc est satis notum.

De L A P A T I O L O.

Lapatiolū, siue Lapatioli secundum Compositorem: nam ac Giliber. est Lapatium acutum: ergo est Acetosa qua generaliter utimur, & sic est quod illa Acetosa qua utimur, est acutior omnibus Lapatorum speciebus. Macer ait. Herba solet Lapati uuglo Paritella uocari. Illius species dicuntur quatuor esse. Idem ait Dioscor. in cap. de Lapatio. Circa instans inquit. Lapatorum triplex est maneries. s. Lapatium rotundum, acutum, & domesticum. Lapatium folia habens acuta, efficacius est Lapatio rotundo: minus efficacē est Lapatium domesticum: quod folia habet aliquantulum lata, & magna: usui medicinę competunt.

De C A R D V N C E L L O.

Carduncellus secundum Gilbertum, est Cardus benedictus. Idem dicit Compositor. ergo est quem Plin. Erigerion, siue Senecionem uocat. De qua Isidorus Erigerion a gręcis dicitur: quod uere primo senecib, unde & eam latini herbam Senecionem uocant. Non intelligitur de Senecione quod dicitur Cressonum, sed de alia herba de qua Macer ait. Erigerion gręci Senecionem nosq; uocamus. Quod canis similis uideatur flore capillis. Nasctur in muris, & in hortis, & regularis. Hęc apud Dioscor. uocatur Sedum, & apud Gal. in libro ad Paternianum uocatur Suedo, quam alię Senecionem uocant. Hęc uero est herba quę in numero Cardonum est. Apud nos in hortis ac in muris inuenitur: & est quam Lombardi herbam Turcham uulgariter dicunt.

De M A T R I S Y L U A.

Matrilyua secundum Compositorem est Oculus lucidus, seu Caprifolium: & de hac apud quosdam siclicium: sed illud licium est debile. Hęc herba apud nos iuxta hortos inuenitur: cuius folia sunt ab nno latere subalbida, & ab altero uiridia, se adhaerentes & inuoluentes sæpius super alias plantas: ut est notū. Et est quam Dioscor. Periclimen non uocāt: & nostri Cefoli uulgariter dicunt.

De M A T V R E L L A.

Maturella secundum Compositorem est Potentilla, seu Amantilla: ergo est Valeriana, seu Fu. Mathæus syl. dicit. Martorella. i. Valeriana, uel Fu, uel herba gattę. Sed herba gattę, apud nos etiam habet aliam significationem. nam significat Nepitā, seu Calamentum montanum. Valeriana apud teutonicos dicitur Thamara. Hęc herba omnibus nota est. Circa instans ait. Fu intelligitur radix in medicina. Lumen malelucens, non posuit in sua descriptione Maturellam: forsitan ignorauit quid esset.

De H E R B A M V S C A T A.

Herba muscata. s. herba muscata maior. Leonardus loco eius habet herbam Garyophyllatam: sed non recte. Giliberus habet herbam muscatam. Secundū Compositorem est maior, &

minor. Maior autem facit actus, & non redolet; minor non facit actus, & redolet: quid autē sit, communiter ignoratur. nō em̄ est herb amuscata: ut quidam dicunt: nec eius forma est, ut dicit Lumen male lucens. Veritas autem est, quod herba Muscata maior, est herba dicta Secabrion, quæ folia habet minuta similia Petroselino, aliquantulum pilosa: florem habet paruum, tendentem ad rubedinem: & quando flos decidit, facit quandam rem ad similitudinem acus acutam, uel ad similitudinem nostri ciconiæ. Hæc suo tempore dum est recens comeditur, in uis ac pratis inuenitur, hanc uulgares Rostru ciconiæ uocant. Et hanc meo tempore uidi ponere in unguenta.

DE ALELUIA.

Aleluia idem dicit Leonar. Giliiber. dicit Aleluia est species Trifolij: & est herba acetosi saporis: ergo est Panis cuculi. Vnde meo tempore uidi multos in hac errare. Reperitur autem super arborem Vlmi quædam res similis uescicæ, & hæc apud malignos herbatikos Panis cuculi uocatur. Sed non recte: quia Panis cuculi est Aleluia: & est herba quæ saporem habet acetosum, habens tria folia sicut Trifolium, sed sunt parua, & tripliciter diuisa, & in cacumine cuiuslibet partis est incisa: femina ipsius sunt in uaginis similibus cornibus: quæ cum tanguntur tempore maturationis, euolant ab eis semina, sicut handachoch, i. Trifolij, tendentia ad rubedinem. Hæc raro in pratis inuenitur.

DE CRISPULA.

Crispula, idē habet Leonar. Giliib. dicit, Crispula, i. Oculus bouis. Secundū autē Compositorem est herba Cancrī. quid autē sit generaliter ignoratur: sed quia Giliibertus dicit, quod Crispula est Oculus bouis, ergo est quædam herba quæ apud Dioscor. uocatur Bupthalmos, cuius folia sunt similia folijs Maratri. i. Fœniculi. Flores habet nigros. Hic textus Dioscor. est corruptus, debet enim dicere, quod habet flores citrinos plus flore Camomillæ: ut dicit Serap. ex uerbo Dioscor. in cap. de Corula, quæ idem est. Auicē. in secundo can. air. Bichar, & est illa quæ uocat̄ Chuslem, i. Oculus uaccæ. Rosa eius est citrini coloris, rubea in medio, grossior rosa Camomillæ, & sic est. Vide ergo, quod Crispula est Oculus bouis, seu Bupthalmos, siue Corula: & hæc apud nos in ciuitatibus, & in uis nascitur. Rasis in libro aphorismorū in libro quarto de dietis medicis & cibarijs inquit. Ladion, i. Oculus bouis, seu Oculus uaccæ, quod idem est, hanc nostri rustici Corulam dicunt.

DE CAMPHORATA.

Camphorata secundum Compositorem est Abrotanum syluestre. Sed Lumen male lucens loco eius posuit Camphoram. Sed non recte factum est. nam Giliiber, ac Leonardus posuerunt Camphoratam, i. Abrotanum syluestre, cuius folia sunt similia folijs Camomillæ. Loco eius uidi ponere Abrotanum usuale.

DE PULICARIA MINORE.

Pulicaria minor secundum intentionem Dioscor. est sicut maior in folijs, sed est odoris grauioris. Et sic est, quod Pulicaria minor, id est, Satureia, seu Timbra habet maiorem odorem quā maior. In folijs idem sunt, & in uirtute sunt quasi idem. In partibus Comæ unus græcus dixit mihi, quod Pulicaria minor apud ipsos uocatur Coniza, seu Timbra: & fecit uerticulos sic dicens. Timbra solet græce, Satureia dicta latine, Timbra solet græce Pulicaria dicta minor. Thymum enim dictum, nos Pulicariam maiorem nominamus: & sic meo tempore pro Pulicaria maiore, Thymum uidi ponere: & pro Pulicaria minore, Satureiam.

DE LAUREOLA.

Laureola apud Dioscor. uocatur Dypnoides. Serap. uero inter species Lauri Laureolā describit: & est quam dicit esse Gar. Est species alia quæ dicitur Daphnides: & est arbor parua, cuius altitudo est unius brachij: habet uirgas multas, subtiles a medietate: supra quibus superius sunt folia, & uirgæ eius non facile frangibiles, & super eadem cortex foriter adherens ligno: & folia eius sunt similia folijs Lauri: nisi quia sunt meliora, & tenaciora, & ad frangendum difficiliora, mordicania & pungentia linguam, & gulam ex asperantia: & habet flores albos: & grana quando sunt matura, sunt nigra: & habet radicem nullius ualoris in medicina: nascitur in locis montuosis. Ioannes Anglicus in cap. de Paralysi dicit, Semen Laureolæ, & uocatur Cocognidium. Quod non est credendum.

DE MANDRAGORA.

Mandragoræ folium apud nos raro inuenitur: sed moderni herbatici reperiunt speciem unam Mandragoræ in partibus Comæ, & illa utuntur: & sic hanc habere non possunt, ponunt folia Prionie. Leonardus autem ibi inquit. Foliorum Mandragoræ, & loco eius Fabæ inuersæ. Fabæ uero inuersæ apud Dioscor. inter species Strigni describitur: & est tertius Strignus, i. Solatrum.

C

De R V B O.

Rubus alius Batus, ferens mora; alius Rubus canis; qui apud Diofcor. Cynosbatus uocatur. Sed hoc intelligitur de Rubo qui fert mora.

De B A R D A N A.

Bardana secundum Compositorem est Illapheos, seu Lappa. Quidam Lappagonem maiorem dicunt. Idem. ait. Lappa domestica; quod habeat caulem ingentem per terrā dispositam; hæc a græcis Philantropos uocatur. Supra de ipso dictum est in Philantropo antidotario.

De S C A T V N C E L L O.

Scatuncellus secundum Compositorem est Umbilicus ueneris. Idem dicit Leonar. de præda palea ibidi. Sed hodierni apothecarii, maxime ignorantes, loco eius ponunt illum Cardum, qui a Diofcor. uocatur Dipfacus; cuius frutex est spinosus, habens folia similia Lactuce; & hoc ununtur Fullones ad garzandum pannos & bireta; & sic meo tempore uidi multos ipsum ponere. Sed errant, nam ut dictum fuit, Nicolaus Compositor uult, quod Scatuncellus sit Umbilicus ueneris. Idem dicit Leonar. & sic est secundum ueritatem. Hæc a Diofcor. uocatur Codillodon. Apud nos nascitur in tectis domorum & ecclesiarum, ac alijs locis, & uocant ipsum uulgo Herbam rotundelam, uel Cibalariam.

De T R I B V L O M A R I N O.

Tribulus marinus, i. Cicer imperiale. Hic apud Auic. in secundo can. uocatur Haseh. Eius species duæ sunt. i. domesticus, & agrestis; sed ille qui hic intelligitur, est ille qui fert quandā fructum ad similitudinem Castane; & propter id multi uocant ipsum Castaneolum. Et isti fructus abundant in locis uicinis sanctæ Mariæ de monte, & ibi uocantur Langani ab incolis, & sunt primo uiridis coloris; deinde nigrescunt, & habent angulos acutos. Apud nos idem inuenitur ultra Padum, maxime in aquis. Et hic fructus piscatoribus nocet, eo quod inuoluitur circa rete, & pisces fugiunt.

De V V A L V P I N A.

Vua lupina, i. Solatrum secundum modernos non est Stasifagria; ut quidam crediderunt. Miror quod Mesue in cap. de alsefera dicat. Nascuntur supra ea botri sicut botri uuarum, & uocantur Vuç luping. Sed apud modernos non recte, nam Vua lupina apud Sera. in cap. de Solatru est idem. Auerois in quinto Coll. inquit. Hupnephathalep. i. Vua uulpis, quæ in latino nominatur Vua canina, hæc herba, i. Vua uulpis, uel Morella. Præterea Auic. in cap. de Chechengi ait. Virtus eius est proxima uirtuti Vuç luping, & proprie uirtus foliorum eius, nam sine dubio Chechengi est species Solatri, siue Vuç lupinæ; quod idem est. Itē Circa instans. Strignum, Vua lupina, Solatrum, Morella idem est. Et sic ex meo iudicio dico, quod Vua Lupina est Solatrum, quæ apud Diofcor. Strignus uocatur; a uulgo dicitur herba Mora. Papias ait, Vua lupina dicta, quod semen eius Vuç simile est; hæc Strignos græce dicitur.

De C A U D A C A B A L L I N A.

Cauda caballina est Cauda equina, & est quam Diofcor. Hippurim uocat. Nicholus loco eius habet Caudam equinam, quæ idem est. Serap. in cap. de Cauda equina inquit. Aliquando uero egreditur a muris in quibus nascitur, & declinat inferius, propter similitudinem foliorum quæ sunt sicut coma; ut uideatur uelut cauda pendens in muro; & propter hoc sic nominatur. Moderni autem duas ponunt species. Vna est maior & asperior, qua tortiores cyphos poliunt. Et alia Tornatila, aliquando Asprella dicitur, aliquando Troxia. Guil. Lombardus ait. Cauda equi est Asprella. Hæc apud nos in fossis ac iuxta aquas inuenitur.

D E G E N E S T A.

Genesta autem frutex est omnibus nota, hæc apud Diofcoridem uocatur Spartus. Plin. Genistæ uinculi usum præstat. Flores apibus gratissimi. Dubito, an hæc sit quam græci autores Saron uocant. Quidam myricam uocant; sed non recte Mesue inquit. Albrachin est capistrum arboris; & est arbor montana, super quam stipitum eleuatur densitas, fustium multæ rectitudinis, & duplicatur; non patiuntur fracturas, unde ligantur ex eis arbores. Et producit flores figuræ lunaris, citrinitatis multæ; & profert folliculos secundum semitâ Orobi, habentes semina distincta; sed in lingua latina Genesta, secundum quosdā Myrica appellatur. Electio ultromarina est melior, & omnes quæ in partibus orientalibus oriuntur, Galen. in octauo simplicium ait. Spargamū, id est, Genesta.

D E E B V L O.

Ebulus est species Sambuci. Vnde uersus. Sambucus est Actis, sed Ebulus est Chamæactis. de quo Serap. in cap. de Ebulo de utraq; loquitur; & ibi describit de forma ipsorum, dicens; quod

illa species quæ dicitur Chamæactis, est minor prima, & habet ramos magis herbæ pertinentes quadratos, in quibus sunt multi nodi: & folia inuicē distantia in singulis nodis, similia folijs Amygdalæ in summitatibus suis: nisi quia habet uenas, & sunt longiores eis: habentia grauem odorem: & in summitatibus ramorum sunt capitella, seu coronæ similes coronæ supradictæ speciei: & flos similiter: & habet radicem longā in grossitudine digiti: & apud nos in uis, ac in multis locis nascitur: & uocant ipsi rustici Lorex.

DE ELLEBORO.

Elleborus secundum Mesue dicitur Barba albugi. Secundum Aueroim in quinto Coll. Elleborus est Condifi. Quod non creditur, uerum multi moderni computant Condifi inter species Ellebori: eo quod sternutationem commouet. Tamen nostri doctores non ponunt species Ellebori nisi duas, scilicet album, & nigrum: quæ satis notæ sunt. Infra in oleo de Euphorbio, ostendam melius, quod Condifi non est Elleborus. Secundum intentionem Mesue, quando niger nascitur apud radices arboris fructuosæ, sunt fructus eius solutui. Papias inq. Anticyra est insula ubi abundat Elleborus, ad capitis purgationem necessarius: & ponitur pro Elleboro antiqua parte templi, quæ ortum respicit. Hic ab aliquibus dicitur Velax: & ab aliquibus dicitur Stranudella: eo quod puluis ipsius in naribus positus sternutationem commouet.

DE SEMPERUIVÆ.

Semperuiua, scilicet maior secundum Circa instans dicitur, quia semper uiridis reperitur. Auic. in secundo inquit. Semperuiuū est Sucutum. In cap. uero de Sucuto inquit. Sucutum dicitur quod est Semperuiua: & dicitur sic. Inquit Dioscor. quod est species seminis Mandragoræ. Sed non recte, quia illud cap. de Sucuto est corruptum, nā apud Arabes est Symphytum: ergo est Consolida maior, & sic si legis illud ca. de Sucuto apud Auicem. cum cap. de Symphyto apud Dioscoridem, uidebis quod idem sunt. Semperuiua apud Dioscor. uocatur Aizon maius. Dicitur, quod omni tempore folia uiridia habet. Dicitur & Bupthalthmon. Quod non est, nam Bupthalthmon est Oculus bouis, aut Zoralmon, aut Ambrosia. quod non est. Aliud facit cap. de Aizon minor: & hæc est Vermifaris, & ambæ notæ sunt. Aizon uero est proprium nomen suum: quia componitur ab αἰζω, quod est semper: & ωῖς, quod est uita, unde Semperuiua dicitur, quia semper folia uiridia habet: nascitur super tegulas plurimum, & in locis quibus stercorea proiecta fuere, & alibi.

DE CICUTA.

Cicuta, aut Schara, est herba satis nota, apud Dioscor. uocatur Comos: hastas habet nodosas sicut Maratrum: folia similia Ferulæ, sed angusta. Apud Auicem, in secundo can. uocatur Siccharam: & inquit sic. Inquit Dioscor. crus huius plantæ est sicut crus Ferulæ: & folia eius sunt sicut folia Cucumeris. Hic textus Auicem. est corruptus: quia debet dicere, hastas habet nodosas sicut Maratrum, folia similia Ferulæ, sicut dicit Dioscor. Liber qui dicitur Bulchafim in tractatu secundo inquit. Forma extrahendi succum ex Sucharam. i. Iulquiamō. Quod falsum est, nam Serap. in cap. de Cicuta ait. Sucharam sic nominatur apud medicos: sed Arabes nominant eam Scicharam, uel Zucharam. Et sic est, quod Zucharam est Cicuta. Idem Serap. in fine eius cap. inquit. Et quando ponitur Cicuta super testiculos puerorum, non dimittit crescere eos. Melior autem ex hac planta est illa, quæ nascitur in Creta, & in Chio, & in Attica. Etiam apud nos in multis locis hæc reperitur, unde si fricaueris folia ipsius recentia, grauem odorem referunt.

DE VERBENA.

Verbena, seu Herbena, est herba quæ apud Dioscor. Hierobotanum uocatur. Quidam uocant ipsam Sacram herbam, quæ Sagmen. i. Sanctimen antiquitus dicebatur: eo quod pagani in sacrificijs & omnibus expiationibus ea utebantur. Hæc autem herba idem nomen accepit, quod sacerdotes eam purificationibus adhibere consueuerunt. In Passionario habetur, quod si medicus uisitando infirmum ipsam manu portauerit ægroto insciente: & dicit ægroto, qualiter habes? si æger dicit, bene, sanabitur: & si dicit, male, morietur. Hæc apud nos in ciuitatibus nascitur. Hanc quidam rustici, herbam sancti Ioannis uocant. Sed non recte. Papias, Herbena herba Sagmen dicitur: sic dicta, quasi pura. Hæc & Hierobotane dicitur græce.

DE HERBA GRATIA DEI.

Herba Gratia dei apud moder. herbaricos uulgo sic est uocata: & est herba, cuius longitudo est unius palmi, aut parum plus. Folia habet similia Hyssopo: florem habet inter folia paruū, cuius color tendit de bicoloribus ad album & purpureum: sicut herba quæ dicitur Volubilis quæ in uineis nascitur. Radicem habet paruam & paucam. Apud nos in pratis ualde abundat. Et cognoscitur propter saporem florum, nam folia ipsius habent amaritudinem prout Centaurea minor, aut parum plus.

C

DE PILOSELLA.

Pilosella herba est satis nota. Dicitur autem Pilosella, propter abundantiam pilorum quos in folijs habet. Ego non inueni autorem auctenticum, qui de ipsa speciale faceret cap. sed apud moder. Pilosella est herba nascens in locis lapidosis, siccis, cum folijs quæ expanduntur super faciem terræ: & super ipsa folia habet pilos ab uno latere, & ab alio cum flore rubeo. Hæc a multis dum est recens comeditur. Existimauerunt quidam, quod hæc sit quam Auic. in secundo can. uocat Fistulam.

DE STAFISAGRIA.

Stafisagria secundum Serap. est Granum capitis: & est dicta Passula montana. Auicenna in secundo can. ait. Stafisagria est Vua passa montana: & est Granum capitis. In monte Libano inuenitur de eo plurimum: & est granū nigrum sicut Ciceri nigrū. Sicut Circa instans inquit, Stafisagria, quæ etiam Caputpurgium dicitur: semen, & herba simili nomine appellant. dicitur etiam Caputpurgium, quia caput purgat. Multæ est efficaciæ. Semen usui medicinæ competit: per decem annos durat. Isid. Stafisagria, hoc est, herba quinq; digitorum.

DE VERMICULARI.

Vermicularis secundum Compositorem est Semperuiua minor, aut Portulaca agrestis: in rectis domorum nascitur. Secundum autem Lumen male lucēs, est Crassula. Quod falsum est: quia in isto oleo utrumq; ingreditur. Macer ait. Semperuiua minor species est istius herbæ, quæ Semperuiuam dicunt: quoniā uiuet omni tempore. Barba Iouis uulgari more uocatur. Secundum intentionem Macri herba Iouis est Semperuiua minor: secundum uero Math. syluaticum herba Iouis est Hercules, uel Bonades. i. Sticados citrinum: sed autem Nichol. est Sticados citrinum, seu Santonicum marinum: ergo est herba marina, i. herba lumhricorū. Aduertendum est autem, quod Macer nō dicit ipsam uocari Barbam Iouis, nisi a uulgaribus: sed deus hoc nouit.

DE CIBALARIA.

Cibalaria, Vmbilicus ueneris, Scaruncellus, idem: apud Dioscor. uocat Cotilidon, siue ut alij Cibaleon, siue ut latini Vmbilicus ueneris. Hæc est herba, quæ folia habet rotunda & lata, quæ in muris nascitur: & est quam nostri rustici herbam Rotundelam uulgariter dicunt.

D

DE CRASSULA MAIORE.

Crassula maior secundum Compositorem est Faba grossa: secundum aliquos est Semperuiua maior. Sed non recte. nam in isto oleo possumus cetrificari, quod idem non sunt: quia in hoc ambæ ingrediuntur. Crassulæ uero species tres sunt. s. maior, minor, & media. Maior uero est herba quæ habet folia uiridia & pinguiora, ut Semperuiua: & florem tendentem ad albedinem. Nascitur autem apud nos iuxta fossas: & hæc est Faba grossa. Minor uero est Vermicularis. Et media secundum Compositorem est Cardus benedictus.

DE HYPERICON.

Hypericon. Auicenna inquit. Hypericon nominatur arabice Alharib: & nominatur syriace Vua demonis. Dioscor. de Hypericon facit tria capitula: & distinguit ipsas species. Vnum facit sub nomine Asquiron. Aliud sub nomine Corium: quod est Rapa rustica. Aliud de Hypericon. Sed Serap. in uno capitulo de omnibus loquitur. Sed illud Hypericon quo utimur, habet folia parua, in eis foramina minuta: & propter id uocatur Perforata, siue herba S. Ioan. siue Fuga demonum.
Apud nos in ciuitatibus nascitur.

C H I E R O N Y M I herbarij Argentorat.

A

A P O D I X I S Germanica, ex qua facile

uulgares herbas omnes licebit per

discere, coacta in seriem

Alphabeticam.

A Andorn. Marrubium.
Andorn von den Griechhen Philofores genant/vñ in Latin Marrubium/oder Prassium/
nach etlichen teütschen Andorn/darumb das es heyle ist die franchtheit der kinder gnant
der Andorn/aber in niderlendischer sprach/Gotts vergeß. vñ ist zweyerley geschlecht/männlich/ vñ
weyblich. Das männlin bunn/schwarz far/ist gleich den grossen Viespien/ mit einem hohen viereck
echten stengel/zweyer ellenbogen hoch/die bletter gleich den Viespien/dann das sye schwertzer in der
grünen farben seind. Des weiblin bletter rund/kruscher/ bleych/mit einem weissen ronden steng-
gel/eins ellenbogen hoch. Wann funden würt Andorn/oder Gott vergeß on zúsat/ so soll genum-
en werden das weiblin. Aber in warheit vast nutz/wenn das männlin gebucht würt dem mann/vnd
das weiblin der frawen.

C Ampffer. Acerosa.

Ampffer in Latin Acerosa/vñ in teütschem saur Ampffer/darum das er saur ist/auch in vnder-
scheid des wilden ampffers/in teütschem Mengel wurzel gnant. Des frauts Ampffer ist dreyer
hand. Einer mit ein hohen stengel off anderhalb ellenbogen hoch/mit kleinen roisfarblümlin/nähe
wie eins kleins breyts sämlin/wachset off den matten oder wisen/von dem ich hie schreib. Der and
mit breytten roisfarben bletteren/genant Mengel wurzel/ mit stenglen eins ellenbogen hoch. Der
drit kaum einer spannen hoch/ mit bleychen grünfarben bletteren wie ein hertz oder fleck/wachset in
den wälden/oder hecken/der in latinschen zungen Aleuia/oder Panis Herculis/vñ in teütschem
Gansch ampffer. Sze zú verston von dem gemeynen sauren Ampffer/Acerosa/oder Acetosella/
nit der Gansch ampffer/wie wol er auch saur ist.

C Mystel. Viscus.

Asolter Mystel/von den Latinischen Viscus genant/hat gelblecht grünfar bletter gleich dem
buchssbaum/doch lenger/vñ schmeler. Vnd das wasser soll gebauet werden off den weissen kömmlin
die vff dem mystel wachsen.

C Aluch. Ebulus.

In Latein Ebulus/mit ein hohen stengel/doch nit holzgehet das er ist als der holder/auch nit
hoch wachsende.

C Alantkraut. Helenius.

Alantkraut von den Griechischen Helenius genant/in Latein Enula campana/von etlichen
Alant/darumb von der wurzel ein wol geschmackter wein gemacht/würt Alantwein genant/als
so das der wein im herbst darüber verfähret ist. Vñ das kraut hat erwan ein haren brei spiz blatt/
gleich dem kraut genant Wulff/doch nit also weis oder weych/mit einer groben wolgeschmackten
den wurzel.

C Adermeng. Agrimonia.

Agrimonia/in Latein mit gemeynem namen Agrimonia/oder Scaria minde/von den teütsche
Agrimenig/oder Adermeng genant/auch vñ etlichen Bruchwurzeln/darum das sye zú den bruch
solt breüchlich sein. Aber in warheit so ist Walwurz aller nechst dem nammen Bruch wurz. Das
kraut Adermeng hat ein langen stengel/off zwey ellenbogen hoch/mit kleinen gelben blümlin/das
raus werden kleine kleidlin die hangen an den kleideren so man dar für geen ist.

C Agleyen. Aquileia.

In Latein nennet man es Aquileia/das ist ein kraut mit einem langen stengel/anderthalben ellenbo-
gen hoch/das merer teil mit blawen blümen/vnd etlich mit weissen blümen.

C Genßdystel. Endiuia.

Das kraut von den Latinischen Endiuia genant/von den Teütschen Genßdystel/ist zweyer/od
dreyerley. Das ein ist Sudsystel/in latein Scariola genant. Das ander Latich/im latein Lactuca
agrestis. Das drit Genßdystel/das da an dem gradt des ruckens hat scharpffe dinglin wie ein seg
in gestalt grosser vñ better har. Wiewol Lumen mains das nennet Tararacón/vnd Echioea/das
ist Wegweyß/das doch nit ist zú glauben. Aber Scariola hat kleine rübe an dem rucken/mit einem
himmelfarben blawen/wenig braunelechtem blatt/vnd gibet milch. Aber Genßdystel/das Anisfen
ist gibet kein milch/wiewol die Latinischen dem selben Tararacón sprechen/so ist es doch Anisfen/
vñ spricht dem kraut Wegweyß Anisfen. das nit war ist/wol es möcht dar für genummen wer-
den/vñ gleichet wollen irer krefft/aber das mit stachelchen ruckgrat sye zú wreyen ist für Anisfe-
en/vnd nit für Tararacón/vnd von den Teütschen Leber dystel/oder Genßdystel genant/darumb

C Das es vast güt ist zu der lebern/hat gele blümen/vnd wechset mit einem hohen einsaltigen stengel zweyer ellenbogē hoch/aber weit vßgespreit. Ist güt für das siechen vßen am ruckgrat.

¶ Aron. Arona.

Aron in Latin genant Barba Aaron / darüß dꝛ es gleich ein bart ist. Oder Serpentaria minor. Vnd wañ das vergeet/so würt vß dem langen roten fößblin/ein grünfar trüblin. die wurzel rund vnd weißz wie ein zybel. Vnd der wurzlen seind zwo aneinander hangen/wann sich eine größert/so würt die ander welch vnd minder.

¶ Alrun Mandragora.

Das frant in Latin Mandragora/ist zweyerley geschlechts/männlich/vnd weiblich. Vnd etlich sprechen / als Aiacenna / das die wurzel der selbigen freüter yedes geschafften sey nach seinem geschlecht/vnd werd gegraben vnder dem galgen/kum von der namr eins harnenden diebs. dꝛ doch falsch. Sonder es seind freüter mit grosser wurzlen. Der wurzel rinden brauchr man in die artzney/wiewol etlich falsch betrieger/schneiden vß der wurzlen Bionia/in teütschem hünffirbs/gestalt eins menschlichen bilds/vmnd faden von reinem garn gezogen mit einer subtilen nadlen in tre hünpter in gestalt des hars/vñ abgeschnitten ires begeren/dann gelegt in ein lyeren erdruch/so geswinnes die farb einer wurzlen/vnd verkauffen es für die wurzel Alrun/es ist aber falsch. Wann Alrun ist ein frant mit bleteren gar nahe gleich dem Lantich / mit einer grossen wurzlen / der rinden vast in der artzney gebrauchr würt. Trägt groß schwarzereben / die von byrt dick geffen werdē / das sye da von entlassen.

¶ Angelick Angelica.

Von dem frant kein alter Philosophus schreibr/darumb sein latinischer nam von den teütschen in übung ist Angelick. Aber in teütscher zungen genant des Heyligen geists wurzel/von vilen Brust wurz/vnd ein geschlecht/der Meyster wurz / von den latinischen genant Astrancia. Aber Angelica geschlecht ist zweyerley/wilder vnd zām/frant vnd stengel in der leng zweyer ellenbogen hoch/das vil von teütschen/Büchalter genant. Sein wurzel hat kein geschmack / vnd werden dann die leüt offbetrogen/das inen etlich falsch würtzler der wildenn Angelica für die redt Angelica verkauffen. Aber die redt Angelica wechset an wilden enden/als in gebürgen / in gärten da sye inn gepflanzet würt. Zu mercken an allen freütern vñnd wurzlen/das ein yedes frant das von im selber wachset/ist stercker vnd edler in krafft vnd geschmack/wann das man vßpflanzet. Des gleichen ist ein yedes frant so im gebürg wechset/fressinger weder dꝛ in dälern /oder in seüchten marten wechset.

D

¶ Abbißz Iacea.

Das frant in latinischer zungen Iacea nigra/oder Moïsus diaboli/in teütsch/Teüffels bißz/das rumb/das die wurzel im grund abgefült ist/gleich als wer sye abgebissen/mit dreyen spitzen/hat echten bleet/erwan roissecklin darüß/ein hoher stengel vß zweyer ellenbogen hoch/oder länger/mit blümen gleich der Scabiose.

¶ Buretsch Borrago.

Buretsch. Das frant würt von den Briehen vnd Latinischen Borrago genant / vñ in teütsch zungen Buretsch. Biß frant ist zweyer geschlecht/wild vñ zām. Das wild von Griechischen Eusglossa/vnd in Latinischer zungen Lingua bouis/in teütscher sprachen Ochsen zung genant. Das zām/von dem ich sag/Buretsch genant.

¶ Bylsen frant Hyoscyamus.

In latinischer zungen Hyoscyamus/vñnd ist ein grossz frant/mit einem groen hohen stengel/vñ hat drey weiche bleter. Des geschlechts ist zweyerley an de somen/also dꝛ es weißz vñ schwarzz somen treget. Der schwarz som ist in die artzney zu bruchen.

¶ Blaw gilgen Iris.

Blaw gilgen / das frant ist von den Latinischen genant Iris / vmb mancherley farben willen. Die blaw gilgen hand vñ den Teütschen den namen blaw Schwertel/seind gleich dem regenbogen/das es ein blawfar blüm/vnd bleter hat gleich den klinglen der schwärer. Hat ein wol schmeckende wurzel/deren geschlecht vil ist. Wie wol sye gleich in den bleteren seind / so ist doch vnder scheyd der farben in den blümen. Iris ist geyzerdt/Ireos weißz farbe gebürt. Gladiolus saffran farb würt. Spatula serda aller enbiert. Darumb wyßz/dꝛ Iris blawgilgē ist/Ireos weißz gilgen treit/vñ seind doch nit die/wie wir in Teütschen landen haben / wann ir frant ist gleich den blawen. Aber Jacobus niger/der sich schreibr ein leydr Apohecario:um spüch/Ireos sey auch v blawen gilgen/aber die wurzel hat ein besseren geschmack/werden gebracht von Venedig/oder Zennua. Die best zeit der blawen gilgen zu distillieren im end des meyens/so sye volkumlich zeytig seind / gebriant in balneo marie allein auß den blümen/vñ nit auß dem frant.

¶ Braunwurz. Scrofularia.

Das obgenant frant von den Latinischen Scrofularia genant/von wegen seiner düßechten wurzel. Aber in warheit drey freüter von den latinischen Scrofularia heissen/die grossz/klein/vñ mittel. Die grossz ist ein frant mit einer düßechten wurzel/seyst dick/rund bleuet an ein stengel

auff anderhalb spannen lang/vñ den Teütschen Knaben/oder Wundtfräut genant. Die Klein mit einer ronden wurtzel/das fräut gleich der Garben / von den Latinischen genant Filipendula / in teütscher zungen / wild Garb. Die mittel von deren ich hie geschriben hab / mit einer düßelichen wurtzlen / vñ brunsfarb stengel.

☞ **Burtzel.** Portulaca.

Burtzel in latinischer zunge Portulaca genant/hat ein seystes fräut kleiner bleych rotsfarb bletter / rundem stengel flechtende vff der erde / wachset in seystem erdtrich bey Sybelen/yederman wol bekant/würt das merer teyl im salat gessen.

☞ **Bibinell.** Pimpinella.

Bibinellen / dz fräut von den Latinischen Pimpinella genant/ist zweyerley geschlecht. Eins mit einem subtilen stengel vff ein ellenbogen hoch/mit einem kleinen weyszen blümlin/mit einer scharpffen wurtzlen im geschmack. Das ander vñ etlichen groß Bibinell/od wilde Bestenaw genant.

☞ **Hartryegel.** Peruina syluestris.

Beyn hülzlin laub/das ist ein stude / von etlichen Latinischen Peruina genant. Vnd von den Teütschen wild Yngrün. Darumb/das sye mit den blettern dem fräut Yngrün gleich ist. Das laub von den Beynhülzlin /oder fülbaumen/von etlichen Hartryegel genant würt/wa in der warheit das laub von Hartryegle gleich mit den blettern etlicher maß dem ölünbaum / der von den Latinischen Alnus genant würt/mit schwarzzen vnnd frusen blettern/aber des Beynhülzlin bletter / oder laub seind gleich dem vor genannten fräut Yngrün/doch etlicher maß lenger vñ schmeler.

☞ **Brunnkressz.** Nasturtium.

Brunnkressz / das fräut ist in Latin Senecion / oder Nasturtium aquaticum / oder Cardamus agrestis genant.

☞ **Bachmüng.** Mentastrium.

Bachmüng von den Latinischen Mentastrium genant/mit reitsfarben stengel vñ blettern. Doch sprechen etlich dem Balsam müng/auch Fisch müng. ist aber nit rechs/darumb das es nit wachsen ist da Fisch wohnt.

☞ **Branntlattich.** Vngula caballina.

Branntlattich würt von den Latinischen Vngula caballina genant/darum das es den braut heylt / vñ einem rossfuß gleich ist/mit beyren runden blettern/stengel vff ein spaß lang.

☞ **Bonen.** Faba.

Bonen in latinischer zungen Faba/ist yederman wol bekant/doch mancherley geschlecht vñ Bonē. als Lupini/vñ in teütsch syckbonen/darumb das sye zün feygwartzen güt seind. Vnd der ist auch zweyerley/etlich bitter/etlich nicht. Vnd ein ander fräut Faba inuersa genant / von den Teütschen Wundtfräut/als ich vor gesprochen hab in Brunwurtz / hat bletter gleich den Bonen / daß das sye seystzter vñ dicker seind an den blettern/vñ wachsen gern auff etlichen matten/oder wysen. Es ist auch ein ander fräut in latinischer zungen fabaria/oder Hyposelinum / vñ in teütscher zungen Bachbon. Aber billicher Bachbon genant / darum das sein fräut de bonen fräut gleich ist/vñ in den bächen wachsen. Vñ den dreyen ich hie nicht schreib biñ/sunder allein vñ den gemeynen bonē.

☞ **Basilien.** Basilicon.

Basilien hat grosse breyte bletter/in latinischer zungen Basilicon/vñ das fräut von den Teütschen groß Basiliē genant/darumb das es grösser bletter hat daß die fruch.

☞ **Brauß Basilien.** Basilicon garyophyllata.

Basilien von den Latinischen Basilicon garyophyllata genant / Darumb/das sein geschmack gleich der Neglin.

☞ **Blaw Meyblümlin.**

Blaw Meyblümen hat ein langen stengel/entpfahet ich denen die es kennen.

☞ **Butten laub.** Spina alba.

Butten laub das ist ein räffze sind. So heyszen es yetz die Latinischen Spina alba / vñ von den Teütschen Butten/oder Hagen/oder Hegen genant/des bletter ein wenig rotsfarb seind/vñ sein blümen wie ein weysßz roßenn/doch nit gefüllt. sein frucht gleich den Oluen/dann allein dz syerod ist/vñ innwendig hol / vñ gefüllt ist mit etlichen samen/yederman wol bekant.

☞ **Betonien.** Betonica.

Betonien fräut in Latin Betonica / vñ nach dem Teütschen ist es dreyerley. Vñ diß würt genant Brun Betonien/oder Betonig/zñ vñderscheyd/dz es brun blümen hat / mit ein schwargzen grünfarben blat. Es ist auch eben des selben geschlechts die weis blümen hond / vñ haben beyd stengel in der höhe eins ellenbogen/das fräut mit gelben blümen nicht also hoch/vñ den Latinischen Herba paralis/vñ in teütscher zungen Hymelschlüssel/vñ der weyszen bletter willen. Es ist aber nit rechs/wann Hymelschlüssel des geschlechts nit ist.

☞ **Bocksbart.** Barba hircina.

Bocks bart fräut / von Latinischen Barba hircina genant/di fräut wechset vff den wysen oder matten / mit ein hohen knodechte stengel bey zweyer ellenbogen hoch/zwo oder drey gelber blümen

C gar nahe gleich den Mergen blümen/genant Paffenblatt/vnnd das kraut mit langen schmalen spizen blettern/daruff erwan funden würt ein weiß schümlin.

Bronbeeren. Rubus caninus.

Bronbeeren von den Latinschen *Mora bacce* genant. Es ist auch ein ander geschlecht Himbeer genant/vnnd würt oft in latin eins für das ander genommen. Das falsch ist. wann Himbeer die stund on dem ist/aber Bronbeeren vol scharpffer dönn.

Boley Pulegium.

Boley von yederman wol bekannt/wachset an feuchten stetten vff anderhalb spannen hoch/der stengel mit kleyne bletlin.

Blaw Kornblümen Flores frumenti.

Blaw Korn blümen/von den Latinschen Flores frumenti/oder Flores siliginis genant/Zu teütsch Kornblümen.

Blaw Violaten. Viola.

Blaw Violan in latin Viola. Es ist auch ein ander geschlecht der Violan/in latinscher zungenn Cheiri/vnnd von den Teütschen Violan/vnnd seind Negel blümlin.

Buck. Artemisia.

Buck in latinscher zungen Artemisa/ein müter der freiter / vnnd von den Teütschen Buck / od Byßig/oder Sonnen wandel genant. Auch vö etlichen sant Johans kraut/oder Gürtel/darum das es an sant Johans tag des Lauffers würt ombgürtet/vñ in das feur geworffen. dz ist falsch. wan sant Johans kraut von den Latinschen *Perforata*/oder herba sancti Johannis genant würt darumb/das sein bletter durchlöcheret seind/vnnd ist der Basilien gleich/vnnd dem teüßel widerwertig/von des wegen es vil genant würt herba fuga demonum/teüßel flächig. Als ich selber gesehe hab/das kraut in die hand verbergen/ein behafften menschen die hand gebotten / greiffen sye die nit an/darumb das selbig kraut von den Latinschen sant Johans kraut genant ist/vnnd nit Buck/wie wol Buck auch ein solch verbo:genheit bey jm hat für zaubernuß / vmb der kütze willenn hye vnderwegen gelassen.

Wegerich. Plantago.

D Breit wegerich in latinscher zungen Plantago/oder Quinquenaria/oder Lingua arietis/oder Plantago maior: gespro:chen/von den Teütschen Breutwegerich/zü vnderseyd der dreyerley Weg erich/die da seind/als Spitz wegerich/von den Latinschen *Lancea lata* /darumb dz es einer langē eisen gleich ist. vnnd Wasser wegerich/von den Latinschen *Plantago aquatica*/von den Teütschen fröschlößel kraut genant/darumb das es in den lachen wechset/da die frösch wonent. Vnnd das diut Plantago maior/von dem ich schreib.

Benedicten wurtz. Garyophyllata altera.

Benedicten von den Latinschen Garyophyllata/oder Sanumunda genant. Welchs kraut sich gleiche erwan mit den blettern der Agrimonien / welche wurtzel ein geschmack gleich den Neglin gib/darumb im Mergen oft die wurtzel würt in wein gelegt/vnnd daru in getruncken.

Bistenaw. Pastinaca.

Bistenaw wurtzel von den Latinschen Pastinaca domestica genant/von den Teütschen Noßel/oder Bistenaw. Vnnd ist zweyerley/wild/vnnd zām. Das wild von den Teütschen groß Bibinel/oder wild Bistenaw/darumb das es gleich ist etlicher massen der Bibinel/doch größer. Es ist auch ein ander geschlecht *Saucus asininus* genant/vnnd von den Teütschen Vogelsnest / wachset vff den ratten mit einer zū gehöhen weissen blümen/wie ein duben nest / gewinnet hochzeiten somen/in d zū geschlossen blümen darin offter funden/darvon der nam Vogels nest entspringt.

Bappelen. Malua.

Bappeln von den Teütschen Bappel kraut genant/des geschlechts manigfaltig ist / als *Malua hispanica*/oder *Malua agrestis* / von den Teütschen genant wild/oder weiß Bappeln.

Bunnellen. Prunella.

Brunellen in Latinscher zungen Prunella genant/vnnd ist ein kraut hat ein bunne blüm/kraut vñ stengel in der höhe einer spannen/vñ ist gar nahe gleich der Guldin gansel blüm/ist blawfarb/dar umb eins für das ander genommen würt. Es ist aber falsch / doch haben sye gar nahe ein tugent/oder krafft.

Bingelkraut. Mercurialis.

Bingelkraut in latin *Mercurialis*/gar nah gleich mit stengel vnd blettern dem kraut Niltan / vñ Latinschen *Trisler* genant/ein wenig schmelet vnd grüner / des halb jm von etlichen Teütschen der nam geben ist Scheißmilt/darumb so es genutzt würt/bewegt es den stül gang. Auch ist ein ander kraut von Latinschen *Mercurialis* genant/vnnd in teütscher sprach Güt heinrich / an etliche enden Schmirbel/doch ist es nit das kraut mit den gelben blümen/gleich dem eyer dotter / das in feuchten matten oder wyßen wachset.

Camillen. Camomilla.

C Amillen in latinscher zungen Camomilla. Des krauts ist dreyerley geschlechts. Eins dz man

nennet Brotblumen/vnd stinckt/vnd wechset gern vmb die stanggräben / von den Latinschen *Corula fenda* genant. Das ander ist Brotten frant das nit stinckt/von den Latinschen *Corula non fenda* genant. Die zwey freüter sein ganz gleich mit blümen/vnd stengel der Camillen / dann allein die Camillen blüm/hat ein güten geschmack/vnd wachset vff den felden/oder in gefertem grund. Aber beyd Brottenfreüter/eins gern stinckt/das ander kein geschmack hat.

¶ Clubenfrant. *Rubca.*

Clubenfrant/von den Latinschen *Rubca* genant/vnd in Teütschem Clib/oder Cleb/darumb wañ man sein blatt oder stengel über die zung streicht das es daran kleben ist. Vñnd das frant ist in der leng anderhalben ellenbogen hoch/mit kleinen bletlin/zü ringe vmb den stengel/ gleich eim sternē/oder dem Walt meister.

¶ Creüz wurz. *Scarum celle.*

Creüz wurz von den Latinschen *Scarum celle* genant / vñ von den Teütschen Creüz wurz/vñ ist ein klein frant/wachset vff den gedreñt ackern/sunder bey zybelē/karstfrant/oder bey bynensch/in der höhe eins ellenbogen/wañ es hoch würt/mit kleinen blettern.

¶ Capis frant. *Bleta alba.*

Capis frant in latin *Bleta alba* genant / von den Teütschen Capis/hat groß köpff /ist yederman wol bekant.

¶ Tausent guldin. *Centaurea.*

Tausent guldin frant / in latin *Centaurea* genant. Es ist auch von erlichen Turin genant/darum dz sein stengel nahe dē gold gleich seind/ mit einer roten blümen. Vñ heisset auch Syeber frant/darumb / wer sein frant seüdt mit wein / oder das puluer yst oder trinckt des morgens nüchtern / der würt sein ledig. Des Frauts geschlecht zweyerley / groß/vñnd klein. Aber wenig Quores hab ich funden/so die grösser geschen haben/ wiewol erlich erfaren den sprechē / es sey das frant Mettram/das von Latinsch *Marricaria* genant würt/das ich für die warheit nit bescheide kan/doch würt er dar für gehalten. Aber das klein/mit eim dürenn stengel / vff anderhalb spannen hoch mit einem rotfarben blümlin/eins bittern geschmacks.

¶ Saubentropff. *Fumus terre.*

Saubentropff/in latin *Fumus terre* / von den Teütschen Erdrauch / oder Saubentropff / oder Ragen köbel frant genēt. Ist ein klein frant mit braunfarb blümlin/ in d höhe anderhalb spanne/ yederman wol bekant/wachset auff ackern/oder weinreben/an gebauenen steten.

¶ Baldron. *Valeriana.*

Denmarck/in latin *Marinella*/oder *Valeriana*/oder *herba Benedicta*/oder *Amantilla*/oder *Genicularis*/oder *Valentina*/oder *Serpillum maris*/oder *Herba Cate*/Ragen frant genant. Vñ von den Teütschen Denmarck/oder Baldron. Doch Ragen frant/darum dz die Ragen die wurzel gern schmacken vñ essen zü behalten ist gesüch. Vñnd das frant Denmarck mit stengel vñ frant wachset vff drey ellenbogen hoch / vñnd klept vff zwey/darnach gewürt es ein langen stengel mit einer weißzen blümen gleich dem holder/vnd das frant nit vil me nütz ist.

¶ Syll. *Anethum.*

Syllen in latinscher zungen *Anethum*/vñ ist ein frant gleich dem Fenchel/wachset an gebauenen enden/vff zwey ellenbogen hoch/gemeynlich wol bekant.

¶ Saub neffelen. *Vrtica mortua.*

Saub neffelen von den Kriechen *Archangelica* genant/in latin *Vrtica mortua*. Vñ seind zwo gestalt/ein mit weißzen blümen/das ander mit blawen. Wie wol ich von der blüt schreib/so ist ir also wenig vñ zert / das du dar für wol nemen magst die öbern gypfel vñnd dolden da die blümen am meisten stond.

¶ Dudyffel. *Scariola.*

Dudyffel das frant von den Latinschen *Scariola* genant/ist ein frant gar nah gleich geschafften der Endiuin/allein das diß milch gibt / mit blaw farben blettern / manglen der stacheln an dem rücken/als die Groß dyffel/oder Endiuin hatt.

Erdberfrant von den Latinschen *herba fragaria* genant/vnd in Teütschem Erdber / darumb dz sye nah bey der erde wachsen / zü vñnderscheid den Bronbern/od Hympern/die in d höhe wachset.

¶ Engelsfüß. *Polypodium.*

Engelsfüß frant vñ wurzel von den Kriechen *Sipteris*. Aber in latin *Polypodium* / vñ zü Teütsch Steinfarb/ oder Engelsfüß/darumb das sein bletter sich neygen zü glych den gemeynen farn. Vñnd wechset vff steinen/des gleich auch gern vñ alten bäumen/darumb es in latin genant würt/Silix ar borea/Baumfarn.

¶ Egerling. *Fungus.*

Egerling/oder Schwammen sein weiß farb Schwammen/in latin *Fungus* genant. Vil seind der geschlecht/von welchen allen hye nicht not zü schreiben.

C

¶ Erenbreiß. Vetonica.

Erenbreiß / in latin Vetonica genant. den nammen jm ein künig von Frankreich geben hat / der rüß / so vffteig vnd gar übel schmacken was. Ein hyrt sein jäger ward / der vff ein zeit gesehen hat ein lang zeit geschädigten hirtzen / gebissen vñ ein wolff / darvon er auch vast an ein hindern lauff verwundet was. Der hirtz sich näheret zu einem eychbaum / da die wurtzel mit der frau Erenbreiß wüchß / offte vnd dick der hirtz davon essen ward / vnd sich daran reiben / also / das er darnon blüthen ward / vnd legt sich daruff nider. Darnach über acht tag sah er aber den genannten hirtzen sich juchel an ein andern end / vnd sah das er ganz heyl was am bißß / aber doch kein har. Darumb so ist es vñ etlichen Teütschen über all gründ heyl genant / darumb das es hehlen ist die frischen wundt. Ist ein frau wächßet off der erden hynfledt / in leng anderhalb spannen / in vngewäc enden. Vnd also machet der jäger ein kübel / oder gölten vol safft / vnd was den künig betten / ein kleine kunst an ym zu verführen zu vergünnen. durch vergunst des künigs ein beyn darin genetzt / vnd damit gewaschen / da von dem künig das beyn wec thün ward / deshalb in der nacht ein lycht gebracht ward / das beyn zu beschen. was das bett vol ruffen. Der künig ersöwet ward / fürbaß mit dem safft das beyn vnd den ganzen leid reiben ließß / biß er heyl ward vnd zart / als ein jung kind. Darumb der künig jm den nammen Erenbreiß gab / das es wol der eren würdig was.

¶ Eniß. Anisus.

Eniß von den Briecken / Arabischen / vnd in latin Anisum genant / vnd in teütschem Eniß. Das frau in gestalt gar nahe gleich dem fenchel / sein somen gemeyniglich bekant.

¶ Epff. Apium.

Epff von den Briecken Selinon / vnd in latin Apium / vñ von den Teütschen Epff / oder Winter epff. Ses Apium geschlecht ist vil / wild / vnd zamm. Von den Latinischen Apium domesticum / cñ Apium hortulanum genant / darumb das es in den gärten / vnd an gepflanzten enden wachsen ist. Vnd sein gestalt gleichet sich dem Peterlin / nür allein das sein frau höher ist.

¶ Epphew. Hedera.

Epphew das ist ein stüd wachsend an ein baum / an der muren / oder erden. Von den Briecken Cissos / vnd in latin Hedera arborea genant / all zeit mit grünen blettern. Es ist auch ein ander geschlecht Hedere / wachsend allein off der erden / von den Latinischen Hedera terrestris / vñ in teütscher sprach Grund reb / ist gemeyniglich wol bekant.

¶ Egelkraut. Centummorbia.

Egelkraut in latin Centummorbia genant / wächßet vñ flychet sich vñ der erde in den flüsszen / oder feuchten matten.

D

¶ Enzian. Genciana.

Enzian / in latin Genciana / vnd ist ein frau mit einer dreien wurtzel / gut im geschmuck.

¶ Eschbaum. Fraxinus.

Eschbaum / o baum in latin Fraxinus wol bekant / doch zweyerley eschin seind / als Büch Eschin / davon ich hie schreibe / vnd steyn Esche / der tragen ist ein anhangendes gewechß / wie eins vogels zung / von den Latinischen Lingua avis genant / ist gleich dem baum dirdar / das ein Esch ist / darumb der baum der genant ist Lingua avis / ist dgr baum steyn Esch / o da gleich ist dē baum Eschin / allein das sein bletter lenger seind dann der Büch Eschin.

¶ Fenchel. Feniculus.

Fenchelkraut in latin Feniculus der geschlecht manigfaltig ist / als wild / vnd zamm. Der zamm gemeyniglich bekant ist. Aber Feniculus romanus / von den Teütschen Eniß genant / vnd Feniculus agal / oder Feniculus porcinius / von den Teütschen Berwurz genant / vñ in latin Peucedanum. Aber Feniculus marinus / oder Feniculus marianus / oder Feniculus erraticus / oder Feniculus callinus / oder equinus / von den Teütschen wilder Koffz fenchel genant.

¶ Fehdystel. Labrum Veneris.

Fehdystelkraut von den Latinischen Labrum veneris / oder Cardo Marie genant / vñ Teütschen fehdystel / oder Unser frauen dystel / ein stehens frau / mit ein hohen stengel / vnd dreyt bletter / bespiengt mit grossen weißzen flecken.

¶ Filipendel. Filipendula.

Filipendula in latin. Dioscorides spricht / das es hab bletter gar nah gleich dem Peterlin / doch mit einer kronen als der fenchel / von vilen / wilde Garb in teütscher zungen genant / darumb das sein bletter ein wenig kleiner seind dan Peterlin. Etlich hab ein stengel daruff die kron wächßet / als der Garben / vnd die wurtzel knodecht / oder düßfecht / darumb sye offte von etlichen Teütschen Scrofularia minor genant würt.

¶ Dreyfaltigkeit blümen. Iacea.

Freisam frau / in latin Iacea / oder herba Clauellata genant / von etlichen Dreyfaltigkeit blümen genant / omb dreyerley farb / gel / blau / weyß / vnd ist wild / vnd zamm. Die wild wächßet off den gewäczen ackern / die zamm gepflanzet würt in gärten.

Jünfinger

¶ Fünffingerkraut. Pentaphylon.

Fünffingerkraut von den Brieden Pentaphylon / vnd in launischer zungen Quinqesolium / von den Teütschen Fünffinger genant / vmb der fünffblätter willen die es hat / vnd ist ein kraut sich flechtend vff der erden mit ein langen zarten stengel.

¶ Feygwarzenkraut. Ficaria.

Feygwarzenkraut / von den Latinschen Testifulus sacerdotis / vnd von Teütschen Feygwarzenkraut genant / darumb das sein wurzel geschaffen ist gleich den feygwarzen. Vnd ist ein kraut hat bletter in der leng einer spannen / vnd gelb blümlin / vnd wär nit ienger den biz vffgang des Meyen / so versckwindt es das man sein nimmer mer findt. die bletter gleich dem Violkraut / doch ein wenig kleiner.

¶ Vogeleszung. Lingua auis.

Vogeleszung / ist ein gewechß anhangend eins baums / als ich geschriben hab im büchßaben E / von dem Eschin baum / vnd das gewechß ist gleich eins Volgeszung / da hær in die Latinschen Lingua auis sprechen.

¶ Storcckenschnabel. Gracia Dei.

Gottes gnad von den Latinschen herba Rüperi genant / oder Zeus muscata / vñ den Teütschen Storcckenschnabel / od Gottes gnad / vñ ist doch nit das kraut das die Latinsche Gracia dei heysset / das bey den wässern wechßet. Dañ diß kraut ist zweyerley / das ein wechß vff hertem erdrich / sich spreitend über das angeßicht des erdrichs / vñ ist der klein storcckenschnabel. Aber das kraut Storcckenschnabel gern wachße ist vff den äckern / mit etwas roßfarben stengeln / in höhe anderhalb spannen / eins bößen geschmacks / die bletter gleich dem Peterling.

¶ Gauchheyl. Anagallis.

Gauchheyl von den Brieden Anagallis / aber in latin Turicula muris / vñ den Teütschen Gauchheyl / oder Colmar kraut / wie wol in die alten Philosophi Turicula muris sprechen / das wir Nüßor nennen / so ist es doch nit das kraut das wir Teütschen Nüßor vñnd die Latinschen Pilosella nennen. Gauchheyl ist dreyerley gestalt / als maior / minor / vñnd media / rot / blau / weiß. Wann das großß hat roßfarblümen / in großß der roten / mit ein fiereckechten stengel / sein so nem gleich dem Coriander / flechrd vñ wachßend vff der erden an gebawenen stetten / in latinscher zungen Mo-fus galline / oder mor gallina / von den Teütschen Hünner darm / oder Hünner bißß genant. Aber die media von den Teütschen Vogel kraut genant / würt mit weißßen blümen. Aber Gauchheyl von dem ich hye schreiben bin hat roßblümen.

¶ Guldin gunzel. Consolida media.

Guldin gunzel in latin Consolida media genant. Wiewol etlich sprechen / das es Consolida maior heisset / das sunder etlich widereden / vñ sprechen / Walwurtz sey Consolida maior / vñ Guldin gunzel Consolida minor / vñnd Maßlieb das kraut Consolida media. Aber in der warheit so ist der Guldin gunzel ein geschlecht deren dreyerley / als Brimel / Guldin gunzel / vñ die Großß gunzel. vñ etlich sprechen Brimel sey Guldin gunzel / das nit ist zu erkennen der vnderßcheyd. Brimel so bin ich genant / Ein bunne blüß mit mir bekant / Guldin gunzel ist der namme mein / Mein blüme gibet ein blawen schein / Großß gunzel sol ich geheissen sein / Wol ich der blümen beraubt bin.

¶ Graß Gunzel.

Graß gunzel von den ich vor geschriben / hat bletter gleich dem Mangolt / doch ein wenig kleiner on alle blümen / yederman wol bekant.

¶ Gamanderlin. Chamædrys.

Gamander von den Brieden Chamædrys / in latin Quercula minor / vñnd von Teütschen Gamander / oder Blawmenderlin / darumb das es blaw blümen tragen ist. Vnd das gang kraut ist in der höhe einer spannen / vast gern wachßend in den gärten.

¶ Genßerich. Potentilla.

Genßerich von den Latinschen Potentilla / oder Tanacetum agrest genant / von den Teütschen Genßerich / darumb das die genß das kraut gern essen. Vnd ist ein kraut spannen hoch / etlich mit gelen blümen / die bletter innwendig grün / vñ vßwendig weißß.

¶ Gudelreß. Hedera terrestris.

Gudelreß / in latin Hedera terrestris.

¶ Gel Viol. Cheiri.

Gel Viol in Arabisch Cheiri genant / der gestalt dreyerley ist / gel / weißß / vñnd brun / oder purpur farb / vñnd seind in der leng stengel vñnd kraut vff anderhalb ellenbogen hoch.

¶ Garb. Mil'esolium.

Garben in latin Mil'esolium / tausent blat genant / von den Teütschen Garb. Das kraut ist zweyerley gestalt / doch nicht ein geschlecht / von etlichen Filipendla / wild Garb genant.

¶ Guldener Klee.

Guldin Klee von yederman wol bekant / auch von etlichen Leber kraut geheissen / darumb das es der lebern gür ist.

C

† Gelgilgen. Gladiolus.

Gelgilgen von den Latinischen Gladiolus genant/vnd sein wurzel von den Briecken Acorns.
Aber sunst Trachen wurzel genant.

¶ Garten Freßz. Nasturtium.

Garten fressz; von den Briechen Cardamus / vnd in latin Nasturtium. Es ist ein ander Bressz / von dem ich vor geschriben hab / in dem büchstaben. B.

Harnkraut in latin *Linaria* / oder herba *Urinalis* / in Teütsch *Harnkraut* / darnmb das es den Harn bewegen ist / auch vñ etlichen Teütschen *Flachs kraut* genant. *visch* / das es dē *flachs* gleich secht / ist wie wolffs milch / allein das es entbürt der milch.

Holder. Sambucus.

Holder ist ein stüd/nit ein frau/vñ in Lätinischer jungen Sambucus genant. Des gestalt drey erley handt ist/als Sambucus/ebulus/vnd Sambucus rubens. Doch etlich Doctores schreiben von Sambuco agresti/oder schlechtri/gang vntfamt. Aber Sambucus ist ein hohe stüd/vñ Ebulus das frau Zinich/oder Vnderholder/darumb diser lätinisch verk gemacht ist. Sambucus est altus/so Ebulus est bene stüdus, darumb/Holder ist höher gebürt/Zinich nider würt.

Hundszung. Cynoglossa.

Cynoglossa.
 Bedeutung von den Griechen Cynoglossa / vnd latinisch Lingua canis genär / ist ein Frant mit
 weychen linden bletern / gleich dem Wegrich / doch an rippen / an einem hohen Stengel / mit rosenfar-
 bnen / vnderman wol bekant.

¶ Banff. Canapus.

Handffraut von den Briecken Canapus/in Teutisch Handff genant/aller menglich wol bekant/
Dann man den zu völdingen brauchē ist in mēschlicher diensfbarkeit / besond zu dē vrych vñ schiffen.

Birthung. Scolopendria.

Eitzung in latin *Lingua cerui* oder *Scolopendria* genant/ ist ein kraut gemeynlich bekant/ vil langer schmaler bleetter vß einer wurzel wachsen/ hat weder samen noch blumen.

Ⓘ Fußwurz. Semperuium.

Eufwurz von den Latiniſchen vnd Griechiſch Barba jenuſ/rend in teüſchem Eufwurz/ oder
Dunderbar/ darumb das es gepflanzt würt iſt die heüßer/ für den Dunder/ iſt vilen bekant.

¶ Hartryeglin.

D Hartryeglin ist ein strod/oder klein bäumlin mit breyten frusen blattern/gleich der ölten / von dem Lateinischen Alnus genant. Vñ etlich sprechen Beinhölzin / auch Hartryeglin/das doch falsch ist. wann Beinhölzin laub gleicher sich dem Buchbaum laub/vnd Hartryeglin den ölten/wie ich geschrieben hab.

† Symel Schlüssel. Herba paralisis.

Eymel schlüssel in latin herba *Paralysis* vnd in teütscher zungen *Eymel* schlüssel/oder *Paradeis* schlüssel/ auch von etlichen weißs *Bathong* / vmb das sein blätter weißs farb seind / das doch falsch ist/als ich vor geschriben hab in dem büchßaben. *B.* von der *Bathong*. *Eye* würt auch von etliche Doctores herba *Arterica* / *Primula* veris genant/ das doch falsch ist. waiß *Primula* veris ist massen/oder zeir lößen/als ich hernach in dem büchßaben. *B.* sagen wil.

II Seyd. Myrica.

Heyd von den Griechen vnd Lateinischen Myrica genant/ist ein wolbekant Kraut / vff anderthalb
spannen hoch/mit halschen kleinen leybfarben blümen vff dem stämmlein.

● **Solneurz.** Anfiolochia.

Holwurtz von den Griechen *Arifion* / oder *Serialoges epifion* / vnd in latin *Arifolochia* / vñ den Teütschen Holwurtz / omb hölkeit willen der wurtzlen. deren zwey geflecht feind / doch drey geftalt / als zwey rund / ein lang / die namen haben / wie wol ein hol / vnd die ander nit hol ift / vñ die beyd von den Latinifchen *Arifolochia* / rotunda genant feind. Vnd das ander geflecht ift lang / von den Latinifchen *Arifolochia longa* / vnd zu teütsch *Ofterlunz* / oder *Holwurtz* / oder *Siber wurtz* genant. Auch von etlichen Hynifch frau / dar umb das man den roffzen die hynfch mit vertreibt. Es ift auch ein ander Hynfch frau in dem bächftab. *Y*. *Yelenger ye lieber* / vñ in latin *Amara dulcis* genant. Wo gefchriben würt *Arifolochia* / oder *Holwurtz* on zúfat / fo werd verftanden die rund / fey offen / oder zú.

† Güner serb. Hyppia minor.

Züner serb/von den Griechen und Latinschen Cyppia minor: geneth/vnd in teütschem Züner
 serb/oder Züner därm/oder Vogel kraut. wañ Cyppia maior:/ist Gaudichryl/von dem ich vo: ges
 schriben hab in dem büchstaben. G.

II Hopf: Lupulus.

Boßfen von den Lateinischen Lupulus / oder Cumulus / oder Volubilis magna / als die alten

Doctores setzen. Aber die puzund halten es für Volubilis media / vnd die Wind mit den weissen glocken / für Volubilis magna / als du findest in dem büchstab. W. von Winden frant / vñ mit das Sopffen frant / dauon man byer machet / ist gemeyniglich wol bekant.

¶ Heckelkraut. *Reita bouis.*

Heckel frant in latin *Reita bouis* genant / seind kleine rote blümlin die vff dürren heyden an eim doemchtigen stengel stond.

¶ Heydnisch wundkraut. *Herba fortis.*

Heydnisch wundkraut / von den Latinischen *Herba fortis* / ist mancherley gestalt. Das ein hat ein trütschen nammen / als Knaben frant mit den seystren blettern gleich den Bonen / von den Latinischen *Crassula maior* genant / vñ von etlichen Teütschen Heydnisch wundkraut / das falsch ist. So sprechen etlich der Wilden wollen auch Heydnisch wundkraut / darumb das es geel blüme trägt / ist doch falsch. Item ein ander frant mit eim langen stengel / vnd vßgeschnittene blettern / sich neygend zu Bynesch gestalt / dz sye auch Heydnisch wundkraut heyszen. Aber das recht Heydnisch wundkraut von dem ich hie schreib / hat ein rotsfarb runden hohen stengel / vff dritthalb ellenbogen hoch / mit zynnelichen blettern / den Weiden gleich / in gestalt einer segel / die beyde wachsen mit gelben blümen in den wälden / das seind beyde die rechten Heydnisch wundkraut in d warheit.

¶ Hympbeer. *Cynosbatos.*

Hympbeer / von den Briechen vñ Latinischen *Cynosbatos* genant / wiewol auch vñ den Brieche die frucht der Bitten *Cynosbatos* genant ist / so ist doch falsch der nam. wai Cynos heyst ein hund / vñ batos ein beer / da von der hunds beer recht nam in Briechisch ist *Cynosbatos* / vñ mit Bitten. Hympbeer ist ein sud vff dreyer ellenbogen hoch on dorn / so har doch Bitten / oder Bronber dorn.

¶ Isenkraut. *Verbena.*

Isenkraut / in latin *Verbena* / oder *Herba sacra* / in teütscher zungen Isenkraut / darumb das Isen mit seinem saffe gehert würt wie der stabel. Des ist zwey geschlecht / männlich / vñnd weyblich / das männlin mit hymel blau farben blümlin / das weyblin mit gelen blümlin / yedes vff ein ellenbogen hoch.

¶ Juden fyrßen. *Alfakengi.*

Juden fyrßen von den Briechen vñ Latinischen *Alfakengi* genant / von den Teütschen Juden fyrßen / oder Schluten / oder Boberellen / von vilen wol bekant / ist ein frant ellenbogen hoch / mit rotsfarb blasen / darinn rorbd: wie die roten fyrßen seind. Vnd würt auch von etlichen Latinische *Solatrium rubrum* genant / das ist / roter nacht schat / darumb das sein bletter gleich seind dem *Solatro* / das ist / dem Nachtschat.

¶ Isop. *Hyssopus.*

Isop von den Latinischen vñ Briechischen *Hyssopus* genant / vñnd von den Teütschen Isop / oder Birch isop / oder Ipsen / zu vnderseyd eim frant dz man auch in etliche länden Isop heyszet / vñ in latinischer zungen *Satureia* / darauff klein Isop bäsemlin gemacht werden.

¶ Ibisck. *Altea.*

Ibisck wurzel in latin *Altea* / oder *Malua hispanica*.

¶ Ingryen. *Peruinca.*

Ingryen in latin *Peruinca* genant / ist ein frant vff der erde hynflechtend / gleich den blettern des Buchsbaums / doch ein wenig spitziger / vilen wol bekant / darumb das man frantz daruff machet / so man zu dem tanz gat.

¶ Karten. *Virga pastoris.*

Karten von den Briechen *Sipscas* / vñnd in Latinischer zungen *Virga pastoris* / oder *Cardo fullo num* / vñnd zu teütsch Karten frant / oder Büben strel genant / ist ein frant innwendig hol voller stacheln / vñnd ist von vilen wol bekant.

¶ Köbelkraut. *Ceri folium.*

Köbelkraut von den Latinischen *Ceri folium* genant / vñnd von den Teütschen Köbelkraut / vil wol bekant / ist wachsen in der leng vñnd höhe zweyer ellenbogen hoch.

¶ Knoblauch. *Allium.*

Knoblauch von den Briechen *Scordion* / vñnd von den Arabischen *Thaum* genant / vñnd in latin *Allium* / vñnd von den Teütschen Knoblauch. Aber in der warheit ist *Scordion* wilder Knoblauch / als die Latinischen schuben. Es ist aber war das der wild Knoblauch nit von jm selber wächst / als vngesplantz / oder gesetz / sunder werden gepflantz von den zehen.

¶ Klee. *Trifolium.*

Klee in den wysen wächst / von den Briechen *Lotos* genant / aber in latinischer zungen genant *Trifolium* / vñnd in teütscher zungen Klee / oder Drey blat / vñnd sein blüim im Elsas freysch blümen / darumb das sye rotsfarb seind gleich de gerechtichten fleych / wächst vff den wysen / oder matten.

¶ Katzen zagel. *Hippuris.*

Katzen zagel frant / das frant von den Briechen *Hippuris* / oder *Equisetum* / vñnd in latinischer zungen *Cauda equina* / vñ in teütscher sprach Katzen zagel / oder klein Schafft hdw. Billicher hyest

Ces pferd schwanz/ oder pferd zagel. Dañ es ist gleich einem pferd schwanz/ in höhe anderhalben ellenbogen hoch/vilen wol bekant.

Blapper rosen. Anemone.

Blapper rosen/ von den Latinschen Flores papaueris rubei/ auch von etlichen Rot Korn rosen/ genant/darumb das sie rot/vnd in dem Korn wachsen.

Lattich. Lactuca.
Lattich von den Latinschen Lactuca genant/des geschlechtes dreyerley ist. Als Lactuca domestica/Lactuca agrestis/vnd Lactuca asinina. Lactuca domestica/das ist der gemeyn Lattich/vnd ist zweyerley/als krauser/vnd schlechter. Aber der Krauß von den Italischen Scariola genant würt. Es ist aber ein ander Scariola von den Teütschen Sudysiel genant/ als ich geschrieben hab in den büchstaben. S. Aber Lactuca agrestis/oder sylvestris/ist Geß dyssel/vnd in latin Endiua. Es ist auch ein ander Lactuca mit einer roten wurzel/ von den Teütschen Eßels lattich/vnd in latin Lactuca asinina.

Leysstöckel. Leuisticum.

Leysstöckel von den Latinschen Leuisticum/darumb das sein wasser weißet des mensche haut/ ist ein kraut mit einem langen hollen stengel/bleuet gleich dem Peterling/doch dreyer.

Lauch. Porrum.

Lauch von den Arabischen Ascar/vnd von den Latinschen Porrum genant/vnd ist vilerley geschlecht/als gegengt ist in den büchstaben. F. F.lauch/vñ in den büchstaben. B. Knoblauch/zämer/vnd wilder. Aber von dem ich hie schreib/ist ein kraut mit einer weißzen wurzlen/gleicht den jungen Ziblen.

Lienenblüm. Caprifolium.

Lienen blümen von den Griechischen Splenon/oder Splenaria/in latin Caprifolium/oder Mater sylua/vnd in teütschem Vasser frauen lian/oder Specklihen/vñnd ist ein kraut flechtend vff ander pflanzung wie reden/vnd blüet zwey mol im jor. Es ist auch ein ander kraut/von den Latinschen Mater sylua/vnd in teütsch Wald meißter genant/von dem im. W. stor.

Leberkraut. Hepatica.

DLeberkraut von den Latinschen Hepatica genant/vnd in teütschem Leberkraut/ist dreyerley gestalt. Das erst von dem ich hie schreiben biß. Das ander Wald meißter/von den Latinschen Mater sylue/oder herba Stellaris genant. Aber in warheit ist Mater sylua Caprifolium/wiewol etlich sprechen/es sey Wald meißter. Das dritt Guldin flec vñ die zwey wachsen in den wäldern. Aber die kraut wächst in alten gärten/vnd an etlichen feuchten steinechten felsen/mit kleinen blätlin vff einander ligende/wie Langwurz/oder Langkraut/doch kleiner/das die Latinschen Herba pulmonis nennet.

Lauander. Lauandula.

Lauander vñ den Latinschen Lauandula/gemeynlich yederman bekant/doch so ist sein zwey gestalt. Das ein in latin Spicula genant/vñnd in teütschem Spica/des auch vil wächst in dem land der Prouintz/zü diser zeit auch in teütscher nation/gleich dem gemeynen Lauander/von des blümen ein öl würt gemacht/genant oleum de spica.

Materkraut. Melissa.

Materkraut von den Griechischen Melissophyllon/oder Melissolum genant/vnd in latin Citraria/oder Melissa/vnd in teütschem Materkraut/oder Melissen/darumb das dz kraut nützlich vñnd güt ist zü dem schmerzen der müter/vnd überflüssig güt zü dem hertzen. Doch ein ander kraut Hertz wurz/in latin Ostici genant würt.wiewol der teütscher des Herbarium spricht/dz Men sey Ostici/das da ist Meißter wurz/oder Hertz wurz/aber es ist falsch. Was Men ist Aneum agreste/Wild dillein kraut/gleich dem fenchel/oder der Sillen. Aber die Meißter wurz ist gleich dem Angelica kraut/war ist es das die wurzlen in der tugend sich vergleichen in etlichen krefftien/darumb ein für die ander oft genommen würt.

Meyblümen. Lilium conuallium.

Meyblümen die weißzen/von den Latinschen Lilium conuallium genant/vñ von den Teütschen Meyblümlin/darumb das es im Meyen wechs/vilen wol bekant.

Maurpfeffer. Crassula.

Maurpfeffer von den Latinschen Crassula minor/oder Vermicularis/vñnd von den Griechischen herba Crassula/vñ in teütschem Maurpfeffer/oder Katzen trübel/darumb das es gen an den altem mauren wachsen ist/mit kleinen böden wie weißze ködnlin. Es ist auch ein andere/doch kleiner vff zweyer gleich eins fingers lang/von den Teütschen Erdweiß genant/vñnd wechs auch vff den mauren.

Maiozan. Maiorana.

Maiozan/vñ den Griechischen Leonium oder Amarum/vnd in latin Samsucus/oder Maiorana/vnd ist gar ein edler stam.

¶ Myng. Menta.

Myng von den Griechē Hebdomon/vnd in latin Menta/des geschlechts manigfaltig ist. Als Bachmyng/von den Latinischen Menta rubra/oder Menta aquatica genant/vnd von den Teütschen Bachmyng/oder Fischmyng/oder Rotmyng/darumb/dz sein stengel rothfarb/vñ an feuchten enden wachsen ist/da auch zu zeiten fisch wohnt. Es ist auch ein ander Myng/Menta saracenicavnd von den Teütschen Balsammyng/oder Unser frauen myng/mit langen blätlin/darumb das es stark schmacken ist wie balsam. Es ist auch ein ander Myng/welcher wachsend/vñ den Latinischen Mentastrum genant/vñnd von den Teütschen Acker myng. Wiewol etlich sprechend vñd gar nahe alle/Mentastrum das sey Bachmyng/das doch in Teütscher nation da für nicht gehalten würt/sunder die off dem acker wachsen ist. Es ist auch ein ander Myng/mit weissen/runden/horehren bleetern vñd stengel/von den Latinischen Menta equi/vñ von den Teütschen Ross myng genant. Aber selten gebucht in der argney. Es ist auch ein ander kraut von den Latinischen Menta non odorifera/von den Teütschen Nept/oder Steinmyng genant. Es ist auch ein ander Myng von Latinischen Menta/vnd von den Teütschen Kraut myng/oder Balsam kraut/oder Biment genant/vñ den ich schreibe. darumb wañ gesunde würt menta od myng one zusatz/so soll alle weg verstande werde Kraut myng/od Biment. darumb/dz sye die aller edelst ist vñd in allen.

¶ Mölsin. Lentigo.

Mölsin in latin Lenticula aque/oder Lentigo/von den Teütschen Mölsin/darumb/dz sye in stillstonden wasser wachsen/gleich den Linfen/einer grünen farben.

¶ Modelgeer. Saponaria.

Modelgeer in latin Saponaria/oder Herba fullonum/vnd in teütschem Modelgeer/oder sant Peters wurtz/oder Seyffkraut/oder Krütz wurtz/darumb/das sein wurtzel krütz weiß durchsichtig ist/vñnd wann man sein kraut reibt in der hand/mit wasser genetzt/so schäumt die hand/in gleicher weiß der seiffen/darumb es Seyffen kraut genant wirt.

¶ Mañs trew. Iringus.

Mañs trew io latin Centum capita/oder Iringus/vñ zu teütsch Mañs trew/oder Ellend/oder Kaddyffel genant/ist ein rauch kraut/mit himmelblaw farben/grünlichen bleetern/vast stehend/wachset off den herten auren mit vil spizen knöpfen/einer vast längen vñd schmalen wurtzlen/deren end selten funden würt/ob zweyer mañ tieff in der erden stot.

¶ Mauraut. Capillus Veneris.

Maurauten in latin Capillus veneris/oder Coriandrum putei/oder Capillus porcinus gesprochen/vñ in teütschem Maurauten/oder Steyn ruten/darumb/das es gern wachset an alten mauren/oder steynen/oder in den mauren der bunnen. Aber in der warheit so ist Capillus veneris ein arß kraut/in teütschem Steynfar/doch nit Engelßuß/wann diß vast kleine bleetlin hat/in breyte der lynch/an einem rothfarb schwarzen stengel/gleich wie strauß fäderlin. Vñd dißer geschlecht seind vier/als Diancos/Politricon/Capillus veneris/vñd Centaurea.

¶ Mosblumen.

Mosblumen/von etlichen gelb Meyblumen/von etlichen Dutterblumen genant/darumb das das kraut ein blum im Meyen bringt/wie ein eyer dutter/im mos wachsend.

¶ Mengelwurtz. Lapatium acutum.

Mengelwurtz von den Latinischen Lapatium acutum/vnd in teütsch Mengelwurtzel/od wild Mangold/oder Zittersch wurtz/darumb das sye für die zitterschen gut ist/oder Streiff wurtz/od Grundwurtzel.

¶ Meiß. Pilosella.

Meiß: kraut/von den Latinischen Pilosella/oder Auricula muris/vnd in teütschem Meiß: wiewol etlich Latinischen dem kraut Anagallis/oder Hippia/auricula muris sprechen/oder als Quicenna Maio:an Auriculum muris nent. das doch falsch dem Latinischen namen nach gesprochen ist/wann Anagallis/oder Hippia ist Gaudheil/von dem ich geschriben hab in dem buchstab en. G. vñnd Maio:ana das ein Meygeron/von dem ich vor geschriben hab Wenn Hippia hat rot blumen/vñnd Meygeron klein blumen/so hat diß kraut gel blumen mit haren bleetern/off der rechten seiten grün/vñd off der linken seiten weiß/off der erden hinstehend/mit einem kleinen haren stengel.

¶ Maulb. Mora celsi.

Maulb: von den Latinischen Mora celsi/ist bey vilen wol bekant.

¶ Mangolt. Beta.

Mangold/dz kraut in Latin Beta/od Beta/vñ in teütsch Mangold/od Römischer röl geheissen.

¶ Möretich. Raphanus maior.

Möretich von den Latinischen Raphanus maior.

¶ Möhyrß. Milium solis.

Möhyrß von den Griechē Lithosperma/vnd in latin Milium solis/oder Grana solis/oder Cauda porcina/vñnd in teütschem Möhyrß/oder Weiß steinbrech genant/das kraut in der leng

C anderhalb ellenbogen hoch wachsen ist / mit weißem herten samen / gleich wie ein kleins runde weißs steinlin / in der groß des Conanders.

Naterwurtz / von den Latinschen Bistorta genant / auch von etlichen Serpentina / von den Teütschen Nater wurtz / darumb das sye ein wurtzel hat gekrümpft wie ein schlinglin mit einem schwenglin Ist doch nit die Nater wurtz / die von den Latinschen Serpentina genant würt / vñ von den Teütschen Groß nater kraut / darumb das sein stengel gleich ist ein schlangen mit flecken / vñ rund wie ein nater / die bleittr und gewächß mit der wurtzel gleich dem Aron / darumb vñ den Latinschen Aron. Serpentina minor genant. Aber Nater wurtz / oder Serpentina von der ich hie schreib / hat ein roisfarb frum wurtzel wie ein schlang.

Nept. Nepeta.

Nepeten / in latin Nepeta / oder Menra non odifera genant / von den Teütschen Nept / oder Katzen kraut / darumb das es die Katzen gern schmacket. Von vilen Schimareck / das ist Baldun / oder Bage kraut. Ist aber ein vnderseyd zwischen yn beyden. wann Nept heysß Katzen kraut / darumb dz die Katzen gern essen / vñ Schimareck heysß Katzen wurtz / darumb das die Katzen die wurtzel gern essen / vñ nit das kraut / vmb der augen willen.

Nachtschatt. Solatrum.

Nachtschatt in latin Solatrum / oder Vua vulpis / vñ den Teütschen Nachtschatt / deren ist dieyersley geschlecht. Als Solatrum mortale / von den Teütschen Solwurtz genant. Vñ Solatrum rubrum / von den Teütschen Schluten / oder Juden kyrben. Das dir von dem ich hie schreib Solatrum in latin / vñ in teütsch Nachtschatt.

Ougentrost in latin Eufragia / in teütschen Ougentrost / oder Ougenclear / darumb das sein krafft wunderbarlich ist zu klären / stercken vñ krefftigen das gesicht der augen.

Osterlucy. Aristolochia.

Osterlucyen in latin Aristolochia / oder Holwurtz / Biber wurtz / Hynsch kraut / darumb so man das kraut den pferden an den hals henckt / die hynsch vertreibt. Es ist auch ein ander Hynsch kraut / von den Teütschen Bittersuß / oder Yelenger yelieber.

Ochsenzung. Buglossa.

D Ochsenzung in latin Buglossa / oder Lingua bonis / oder Gegenstraß genant / ist vilerley geschlecht. Als Ochsenzung mit ein einigen stengel / mit purperfar blümē / wachset vff herte steinchen wegen. Ein ander kraut genant Klein Ochsenzung / vff geerten oder gebawē ackern wachsend / mit kleinen blümlein. Ein ander Ochsenzung wie stunden mit ruben bleitern / vñ blawen blümen / wie Burretsch. Auch etlich mit roten blümen / darumb vñ vilen Burretsch / in latinischer sprach Buglossa syluestris / oder agrestus genant. In etlichen enden vñ etlich zeit haben sye rot wurtzel.

Schwamm. Fungus.

Pifferling vñ den Latinschen Tuber / oder Fungus / vñ Boletus / vñ den Teütschen Schwamm / oder Pifferling / ist ein gewächß von der erden wachsend on kraut. Vñ der Schwammen seind vilerley geschlecht. Als weißs / vñ gelb / etlich gelfarb / sich zeyhē vff ein röde. des geschlechts manig feilich ist also etlich wachsen klein / sinwel / als ein hütlin im anfang des Glenzen / vñ nemen ab in dem Meyen / von den Latinschen Morachi / vñ in teütscher zungen Morcklen. Es seind auch anderley Schwammen die seind breyt vñ dick / oben rot / mit weißzen bleittrlin. Dife in milch gekocht / tödtet die mücken.

Peterlin. Petroselinum.

Peterlin in latin Petroselinum / der geschlecht ist wilder / vñ zam. Das wild in latin Petroselinum macedonicum. darumb / das sein vil in der selben prouinz wachset. Aber das zam von dem ich hie sag / ist wol bekant.

Psaften kraut. Dens leonis.

Psaften kraut rölin / in latin Dens leonis / oder Rostrum porcinum / von den Teütschen Psaffen kraut / oder Mergen blümen. darumb / das sein blümen im Mergen wachsen.

Psfymmen. Geneste.

Psfymmen seind von den Latinschen genant flores Geneste.

Pswenkraut. Persicaria.

Pswenkraut / von den Latinschen Persicaria genant / vñ gleichniß willen seiner blüet / mit der Psirisch baum / on allein das sein bleittr in der mitten dunckel oder braunfarb flecken haben gleich den Pswen spiegel / darumb es von Teütsch Pswenkraut / oder Pswen spiegel genant ist. Vñ ist zweyerley. Eins von den Teütschen Stöck kraut. darumb / so es im summer in ein gemach gespreyt würt / die stöck sich darin zu versamen / vñ mit dem kraut vñ dē gemach gehen werden mögen.

Paffneyen. Paffinaca.

Paffneyen Kraut ist ein gefalt vn̄ geschlecht vn̄nd das weiblin von dem Kraut das die Latiniſche Scabiosa nennen / wann es ist die Scabioß mit den breyten blentern die kein stengel gewin̄t/ vmb Menz vnd Frankfurt vilen wol bekant.

Quendel in latin Serpillum/ vnd von den Teütschen Quendel / oder Hünerkül genant / darumb dz sein Kraut v̄ vil menschen gefüllt würt in die hün̄er. vñ v̄ etlichen wilde Boley genant/ vnd ist ein Kraut mit allem einer spannen hoch.

Querecken wurzel. Hermodactylus.

Querecken wurzel in latin Hermodactylus genant/ vnd in Teütsch Vhr wurzel / oder Oncretz wurzel/ oder Zeilosen wurzel/ vnd ist doch nur Zeilosen Kraut / als ich vor gezeigt hab im büch̄ staben. M. von Maß blümlin.

Ringelblüm. Calendula.

Ringelblümen von den Latiniſchen Caramos/ oder Calendula/ vnd von den Teütschen Ringelblümen / ist ein Kraut wachsend ein wenig lenger oder höher dann ein ellenbogen hoch / mit einer schönen goldfarben blümen.

Kettich. Raphanns.

Kettich von den Brieden Radix/ vnd in latin Raphanns/ vnd in teütschem Kettich/ des ist zweys erley. Als Herietich/ in latin Raphanns maior/ vmb seiner großzen krafft willen/ von den Teütschz Herietich/ oder Brön. Vnd der ander Kettich genant/ von dem ich hie schreib.

Keinsarn. Tanacetum.

Keinsarn in latin Tanacetum/ vnd von den Teütschen Keinsarn. Ir blüm gedd̄rt/ würt von etlichen Teütschen Wurmsoß genant/ daruñ das den kinden nüchtere geben anderhalb quindlin vff ein mal/ tödt die würm.

Römischer föl. Caulis.

Römisch föl von den Latiniſchen Caulis romano:um / vn̄nd in Teütschem Römischer föl / oder Bruser föl.

Roter föl. Caulis rubea.

Rot föl von den Latiniſchen Caulis rubea genant/ von den Teütschen Rot föl/ ist ein Kraut gemeinlich bekant.

Rut. Ruta.

Ruten von den Latiniſchen Ruta/ von den Teütschen wein Rut/ des geschlechts zwey seind / als wild/ vnd zām. Die wild von den Latiniſchen Ruta syluestris. Die zām Rut v̄ der ich hie schreib/ auch von etlichen Latiniſchen Ruta domestica genant. Aber die Teütschen sprechen noch ein Kraut Murut/ das die Latiniſchen Adianon / oder Capillam veneris heissen / als du findest in dem büch̄staben B. Aber ein ander Rut von den Teütschen Abrut / von den Latiniſchen fumus terre/ von den Teütschen Subentropff/ ganz nit in diß geschlecht gehöret/ darumb sich zu allen zeiten nie vff das teütsch zu verlassen/ sonder ein yeder nennt ein Kraut nach seinem gefallē / das den Brieden vnd Latiniſchen widerwertig ist.

Rutter sporen. Conlolia regalis.

Bitter sporen in latin Consolida regalis.

Ratten kraut. Zizania.

Ratten Kraut wechset in dem Forst/ mit kleinen purpur farben blümen/ vnd in latin Zizania genant. Aber etlich Latiniſchen sprechen/ es sey Vigella. Das in keiner warheit funden würt. wā Vigella ist ein schwarzer somen gleich der Ratten. Aber vast eins edlen geschmacks/ von den Teütschen genant/ schwarzer Couander.

Rosen. Rosa.

Rosen/ von den Brieden Rhodon/ vn̄nd in latin Rosa/ der geschlecht manigfaltig ist/ doch vilen wol bekant. als Venedig Rosen/ in latiniſcher zungen Pconia / vnd rot zām Rosen/ vnd weiß zām gefüllte Rosen/ von den Latiniſchen Rosa alba genant/ vn̄nd Heyd oder wilde Rosen/ in latin Rosa syluestris/ oder Rosa agrestis/ vñ burren Rosen/ in latin Rosa bedegar. Vnd die besten Rosen vñ in allen zu freßigen vnd zu stercken/ seind die roten zām Rosen. darumb wann man in der latiniſchen zungen findet/ Rosa/ on zūsatz/ soll alwegen verstanden werden die roten Rosen. Vñnd die besten vñ lieblichsten in diß geschmack/ seind die weißzen gefüllten Rosen. Die besten vnder in allz zu fülen / seind die Heyd rosen. Die aller minste vnder in zu fülen/ seind bunt od̄ wicheg Rosen/ vn̄nd werden auch von etlichen Latiniſchen Rosa vini genant / darumb das sy in versücket es munds ein scharpffe des weins haben. Vnd wā funden würt aqua rosarum / oder rosen wasser on zūsatz in cōsoratino / oder zu stercken/ so werden verstanden von den zāmten roten Rosen. Wā aber funden würt aqua Rosarum on zūsatz zu fülen vnd leschen/ so werd verstanden heyd Rosen. Wā du aber habē wilt ein gemeyn Rosen wasser/ vmb wol geschmacks willē / so werd verstandē weiß gefüllte Rosen wasser. Vnd Rosen wasser würt in vilerley weiß vñ form gebant.

C

C Butten rosen. Bedegar.

Rosenwasser von Butte/ in Latin Rosa Bedegar/ od Rosa vini genant/ vñ in teütschen: Butten rosen/ oder wickhag Rosen/ darumb das der mensch von dem stam weichen soll/ seiner schartf. n. d. den halb/ die den menschen ligen ist.

C Peonien rosen. Peonia.

Rosen von Peonien/ in latin Peonia/ vñnd in teütschem Rosen/ oder Venedische Rosen/ ge- meynlich von vilen bekant.

C Rüben. Rapa.

Rüben in latin Rapa/ vñ in teütscher zungen Rüben/ deren geschlecht manigfaltig ist. Als wild/ vñd zām. von den zāmen ich hye schreib. Es seind auch Rüben von den Latinischen Napus/ Napi- cium/ oder Rapa agrestis/ vñd von den Griechen Bunias/ vñd von den Teütschen Kiopen. Es ist auch ein ander geschlecht der Rüben/ die klein/ vñd lang/ von den Teütschen Streck rüblin genant. Ein ander geschlecht der langen Rüben/ in der farben gelb seind/ der gleichen etliche rot des ges- schlechts/ von den Latinischen Sanci genant/ oder wilder Bestenaw von den Teütschen.

C Byrsen. Cerusa.

Rot Byrsen in latin Cerusa/ od Grana regis genant/ deren geschlecht zweyerley ist. Ein die seind rot vñ klein/ vñ etlichen teütsch Wißlen genant. Das ander geschlecht das seind die gemeynen grossen roten Byrsen mit kurzen stilen/ vilen wol bekant. Es ist auch ein ander geschlecht der rote Byrsen im Elsaß wachsend/ von den Latinischen Co:na genant/ vñd in teütschem Welsch Byrsē. Es ist auch ein ander geschlecht der Byrsen von den ich hye nit schreiben wil/ sunder in dem büch- staben. S. von den s. h. w. arzen Byrsen.

C Schwarz Byrsen. Cerasum nigrum.

Schwarz Byrsen/ in latin Cere/ oder Cerasum nigrū/ oder Vogels byrsen/ darumb das die vögel sye gern essend. Es seind auch ander Byrsen vñ einer weiß/ vñ der andern rot. Es seind au- ch Byrsen ganz weiß/ von den in keiner artzney funden würt.

C Stendel wurzel mǎnlin. Satyrion.

Stendel wurzel in latin Testiculus vulpis/ oder Satyrion/ oder Leporina. Vñ sein frant mit 8 blūmen Kreutz blūme genant/ darumb das sein gewächs die blūmen in der Krütz woch bungē seind. Sein ist zwey geschlecht/ mǎnliche/ vñd weybliche. Des mǎnlins wurzel hat zwo wurzelen an- einander hangen wie zwo muscarnuß/ von etlichen Teütschen Rag wurzel genant. Das weyblin hat zwo wurzelen vñ einander ligen/ gleich zweyen henden/ von den Latinischen/ Palma Christi/ vñd in teütschem stendel wurzel des weyblins genant. Beyde tragen seind blūmen gesprēgt weiß/ vñd rot. Des weyblins frant bleter gemengt mit purpur farb flecken/ gleich dem spizigē wegrich/ ein wenig kürzer. Aber das mǎnlin best teyl von dem gewächs ist die wurzel.

C Stendel wurzel weyblin. Palma Christi.

Stendel wurzel von dem weiblin/ das von den Latinischen Manus Christi/ oder Palma Chris- ti/ vñd in teütschem Stendel wurzel genant/ darumb das zwo gestalt der heud seind die mit der wurzel in einander hangen/ auch von etlichen teütschen Stendel wurzel das weiblin genant.

C Steinklee. Corona regia.

Steinklee in Latinischer zungen Corona regia.

C Sanci Christoffels frant. Os mundi.

Sanc Christoffels blūmen/ von den Latinischen Os mundi genant/ ist ein geschlecht der farn/ aber nit yederman bekant.

C Seeh blūmen. Nenuphar.

Seeh blūmen in latin Nenuphar/ od Ecabae veneris/ oder Papauer palustre/ darumb das es in still stehenden wassern wachsen ist/ vñd sein wurzel Koller wurzel genant. Vñ ist zweyerley/ weiß/ vñd gelb/ das erant würt bey der blūmen/ mit grossen wurzeln/ von etlichen Harstrand genant/ darumb das sye har machen wachsen. Es ist aber falsch. Harstrand ist ein groß wurzel/ wachset vñd den wyß/ oder matten/ vñd wenig schwarz/ vñd inwendig weiß/ mit einer durchtringenden seichte/ gleich dem schwebel/ vñd den Latinischen feniculus porcinus genant/ von 8 ich nit schreib.

C Steimbrech. Saxifraga.

Steimbrech von den Latinischen Saxifraga/ vñd in teütschem Steimbrech/ ist manigfaltige ge- schlechte. Als Saxifraga maior/ vñd Saxifraga minor/ vñd Saxifraga rubra. Saxifraga maior/ die har weiß blūmen/ vñ sein somen rot in der erden/ an der wurzeln hangend. Saxifraga minor/ ist ein klein frant vñd angefrucht der erden sich spreitend/ vñd den Teütschen Steimbrech/ od Grün frant genant. Vñ zwo vrsachen. Ein/ das es vñd den berten fischechten vñ steinechten grün wachset/ vñd das ist für das grün güt. Die ander/ das es den stein brechen ist. Vñd Saxifraga alba/ von den Teütschen Merburs/ vñd der weißsen farb seiner blūmen willē/ das auch falsch ist. Vñd Saxifra- ga rubra/ von den Teütschen Zuden Byrsen/ oder Schlutten/ oder Boborellen genant/ darumb/ dz es rot böden trege/ vñd zū dem steimbrechen güt ist.

Scabioß

Scabios. Scabiosa.

Scabiosen kraut/in latin Scabiosa/mit großen blettern zerschnitten wie die Wegweiß. Die and mit kleinen zäferföhen blettern/nabe gleich dem Harstrang.

Sanickel. Sanicula.

Sanickel von den Latinischen *Fennaria maior*/oder *Consolida minor*/oder *Sanicula* genant/ist ein kraut vff anderhalb spannen hoch/wurzel/kraut vnd stengel. Es ist auch ein ander Sanickel genant Wider sanickel/des wurzlen von den Teütschen Regen würmlin genant. Das kraut wechselt mit weißsen blümen im Meyen/vnd bald darnach wider vergangen.

Synnaw. Alchimilla.

Synnaw von den Griechen *Alchimilla*/oder *Arrecilla*/oder *Leucopodion*/vnd von den Latinischen *Des leonis*/oder *Planta leonis*/vñ in teütschem Synnaw/oder vnser frauw mantel/ist kraut in der lenge vnd höhe wie ich geleert hab von dem Sanickel.

Spiz Kletten. Lappa minor.

Scharpff/oder spiz Kletten von den Latinischen *Lappa minor*/oder *Lappa acuta* genant/vñ von den Teütschen Süw Kletten/oder scharpff Kletten/darumb das die sew das kraut gern essen./vñ ad sein stengel scharpff vnd hert ist/in gestalt ein spizechten freyges Kolben. Es seind auch and Kletten die sich an die kleyder hencken/mit grossen breyten blettern/in latin *Lappatum*/oder *Lappa maior* genant. Es seind auch ander geschlecht me/von den nit nor ist zu schreiben.

Schoswurcz. Abrotanum.

Schoswurcz/von den Latinischen *Abrotanum*/vnd in Teütscher sprach Strabwurcz/oder Gart hagen/oder Schoswurcz. darumb /ob ein mensch geschoszen würt/das kraut daruff gelegt/so zeücht es an sich was in des menschen fleisch stecken ist. Vnd deren ist zweyerley/als wild/vñ zamm. aber die wild mir nit bekant ist. Sie zamm mit ein überflüssigen wolriechenden geschmack/in lenge eins ellendogen hoch/ist nabe gestalt dem Fesengbaum.

Spiz wegrich. Plantago minor.

Spiz wegrich/in latin *Plantago minor*/oder *Lanceolata* genant/vñ von etlichen Teütschen Spitzer wegrich/oder Kippel/darumb das es fünff rippen hat/darvon es von vilen in latin *Quina quenerua* genant würt.

Schölwurcz. Chelidonia.

Schölwurcz von den Griechen *Chelidonia*/vnd in latin *Celidonia*/ein gab von dem hymel/vñ in teütschem Schölwurcz/deren wild/vnd zamm ist. Sie wild von den Latinischen *Papauer cornutum*/oder *Nemita* geheyssen würt. das ist/Papauer *cornutum* mit den hörlin die daran waschsen/das du selber siehest. das safft seiner wurzlen getrich von den Latinischen *Nemita* genant. Vnd die wurzel hat ein gelbe blüm mit einer goldfarben wurzlen/darvon sye oft in etlichen teütschen Goldwurcz genant/yederman wol bekant.

Saurlauch. Berberis.

Saurlauch in latin *Berberis*/ist ein stüd bünget ein läge runde frucht/in dick d weißsen könter/gemeynlich bekant.

Spicanarden. Spica nardi.

Spica nardē ist zweyerley geschlecht/wiewol etliche alte autores von dreyen schreiben/vnd yetzt die nimen darzu thun ein kraut genant *Spicula*/das von dan Teütschen auch *Spica* genant würt. Aber nit *Spica nardi* allein *Spicula*/von dem man yetzt machen ist olei/als ich gezeügt hab in dem buchstaben L. von Lavander/des geschlecht es ist. *Spica nardi* ist ein blüm oder gewächs in gestalt d lange figwurcz/vñ in latin herba *Vicissialis* genant/eins güten geschmacks vñ India biß gen Allekayr bracht/von Allekayr gen Alexandria/vñ Alexandria gen Venedig/oder Genna/die es vns dann liffen. Vnd wo funden würt *Spica on* zusatz/so werd verstant *Spica nardi*/diz bracht würt von India. Ein ander geschlecht *Spica* ist/das in latin *Spica romana* genant/vñ in teütsche sant Marien magalenen blümen/wachset zwischen Vngern vñ Ostreich/nit weit von der Streimarck/etlich maß anhangend mit dem geschmack der vorgenanten *Spica nardi*/das drit geschlecht der *Spica* von den Latinischen *Saluica*/oder *Spica celica*/in teütscher zungen Batzen leylerlin/ist ein kraut lang aneinander hangend/ein grün farb/in gestalt des *Spicanardi* zu gleicher weiß einem seyl/ganz on geschmack. Aber etliche Doctores diesem gewächs nit anders sprechen dann *Saluica*/vnd *Spica celica*/oder *Spica romana*. zu dem gehellen der merer teyl der alten Philosophen/diz ich auch also halte. Das best teyl *Spica nardi* ist in India/das man vñ Alexandria bringet. Darnach *Spica romana*/deren blümen in die land gerhon werden/vnd gebrant. Das drit nit dauwert.

Seuenbaum. Sabina.

Seuenbaum in latin *Sabina*/ist ein stüd/vnd mit kraut gar nah gleich den Psrimen oder Tamarischen/das wider Seuenbaum ist.

Senffkraut. Synari.

Senffkraut von den Latinischen *Synapsis*/vnd von den Arabischen Chardel/vnd in teütsch em

C

¶ Weißgilgen. *Lilium album.*

Weißgilgen von den Griechen *Lirium* / vnd in latin *Lilium album* / vñnd in teütschem Weißgilgen / sind vast vilen bekant. Vnd wann du in latin findest *Lilium* / on zûsatz / so werd verstanden die Weißzen gilgen. Aber widerwertiger ist es in teütscher zungen / wann du findest geschriben Gilge on zûsatz / werd verstanden die Blawen gilgen / die in latin *Iris illyrica* genant. Vñnd der Lilien oder Gilgen ist viererley / als blaw / gel / weiß / vnd rot gilgen / die von den Latinischen *Narcissi* genant sind. Wiewol das merer teyl der lerer halten die Gold wurzel für *Narcissi* / das bey etlichen nit ist. Wann Gold wurzel ist *Lilium* *flusuestre* / oder *Lilium agreste*. wann sye zû allen zeiten in wälden / oder wilden enden wachsen ist / vñ von etlichen iorechten vnersarenden arzeren geheysen würt *Asfodillus* / das ganz nit die warheit ist. Wann *Asfodillus* ist ein kraut gleich demlauch / das auch die warheit ist / als ich dir gezeiget hab in dem büchstaben. A. vñ *Asfodillus*. wann *Asfodillus* hat ein wurzel wie ein rund zybel oder lauch / der vñ den Latinischen *Porrum* genant würt / vnd ein goldfarb blüm / darumb würt *Asfodillus* geteütsch Goldblüm / oder wilder lauch. Aber *Lilium agreste* mag geteütsch werden Gold wurz / darumb das sein wurzel gelfarb ist / wie ein geschelter knoblauch. wiewol etlich Schölwurz sprechen / das falsch ist. auch seind vil ander geschele der Gilgen / vñ den nit noch hie zû schriben.

¶ Widertode. *Capillus Veneris.*

Widertode kraut / von den Latinischen *Capillus veneris* genant / vñnd von etlichen klein Steinsarn / darumb das der Stengel klein wie ein struß federlin / dem sarn gleich / vñ von etlichen jungtfrawen har genant / darumb so die bläseln die allein einer linden dieyt seind von den stengeln gestreyffet / gleich dem har ist. Es ist auch ein ander des geschlechts / doch nit ein kraut / sunder ein gewächs mit goldfarben steinlin / wie goldfarb har / der guldin Widerthon genant / würt von einfältigen menschen glaube / das so sye verzaubert werden / so bald sye das gehenck an dem halß eragen in widerbracht würt ir krafft vñ macht / vñ vmb seiner goldfarb / der Guldin widerthon genant. Auch so sye mit eines kraut wurzelen / von den Latinischen *Herba victorialis* / an dem halß eragen / in teütscher zungen Lang sygwurz / das sye nit wund werden / vñd ir seind überwinden. Darumb es Sygwurz / oder aller mann harnesch genant würt / vmb das ir wurzel überagen wie härlein / in gestalt des panzers. Des gestalt zwey seind / rund / vñd lang. Kund in groß einer kleinen zibel. Lang in leng eins fingers / oft beyd in solcher maß gebrauchet werden. Aber Widertode das kraut genant ist / vñd seiner grossen tugend vñnd krafft willen die es har / zû temperieren alle gebrechen der brust / darumb wider den tod genant ist.

¶ Waldmeister. *Marrisylua.*

Waldmeister / von den Latinischen *Marrisylua* / oder *herba stellaris* / ist in gestalt mit blestin vñnd stengel gleich ein sternen / als die wild Röt / oder Sygwurz / von vilen Leber kraut genant. aber nit recht / als ich gezeiget hab in dem büchstaben. L. von dem Leber kraut. Waldmeister selte über anderhalb spannen hoch funden würt.

¶ Wilder Saffron. *Cartamus.*

Wilder Saffron / von den Griechen *Enicus* / vñd von den Arabischen *Cartamus* / vñd von den Latinischen *Erocus Cornulans* / vñd in teütschem Wilder Saffron / oder Flo: genant / mit beyren ruh'n distelechten blettern / vñd stamme vñd diey ellenbogen hoch. Auch ist ein ander blüm Wilder Saffron genant / darumb das sein blüm dem zammen oder edlen Saffron gleich ist / von den Latinischen *Hermodactylus* genant / vñd in teütscher zungen Zeirlosen / oder Wilder Saffron / oder Quereken wurzelen / vñd ist doch nit Maßlieb das von den Teütschen auch Zeirlosen genant ist / als ich im büchstaben. S. zeügen wil.

¶ Christwurz. *Elleborus niger.*

Christwurzelen von den Arabischen *Melampolios* genant / in latin *Elleborus niger* / vñ zû teütsch Christwurz / oder Lieberley / oder Schwarz nieß wurz genant.

¶ Christian wurz. *Asa dulcis.*

Christian wurz / das gewächs von den Latinischen *Asara alba* / oder *Asa dulcis* genant / vñd seiner süsse willen. Aber *Asara alba* / Christian wurzel genant / ist ein kraut vñ spannen hoch / mit einer süssen wurzelen / gleich der *Liquirici* / oder Süßholz / von den Latinischen *Liquiricia* genant / rund / in grössze einer halben festen / oder gleich eins kleinen fingers.

¶ Yelenger ye lieber. *Amara dulcis.*

Yelenger ye lieber / das kraut vñ den Latinischen *Amara dulcis* / oder *arbor dulcis* / vñ in teütschem Yelenger ye lieber / auch von etlichen Hynsch kraut. doch so sprechen etlich Osterlucy / oder hynsch kraut / es ist aber falsch.

¶ Zybelem. *Cepe.*

Zybelem von den Griechen *Bulbos* / vñd in latin *Cepe* / vñ von den Teütschen Zybel / oder Dick

Seren zweyerley geschlecht ist. Als die gemeynen vñ grossen Zybelen/von den Latinischen Squilla genant / vnd in teütschem Nö:zyblen/ darumb das sye nahe bey dem mör: wachsen. Das wasser darinn sye gelegen seind/so das die müß trincken/ so sterben sye darvon. Die gemeynen Zybelen von vilen bekant.

¶ Zeitloßen. Primula ueris.

Zeitloßen kraut/von den Latinischen Primula veris/vnd in teütschem Zeitloßen kraut /od Mas lieblin/das ist gemeyniglich vilen bekant.

¶ Wilder Zitwan. Vitis alba.

Zitwan wurzel/ oder Wilder Zitwan/von den Brieden Ampelos leuce/ vnd in latin Viticella/ oder Vitis alba/oder Büonia/vnd in teütschem Wilder Zitwan/oder Hunds fürbs genant.

¶ Zucker. Zuccarum.

Zuccarum zu latin/in teütsch Zucker/hat sein vrsprung/als man sagt /über mör: vnd Hypania en/vß den kannen vñ edie/die man Zuckero: heysset. Der zucker wächst in den selbigen als das marc in dem Holder/oder ro:/davon man jn vsructet / vnd laßt jn stossen/vnd gerinnen.

¶ APODIXIS GERMANICAE

Hieron. Herbarij finis.

O V I D.

Est DEVS in nobis, sunt & commercia cœli,
Sedibus æthereis spiritus ille uenit.



In vns ist Gott/vnd hymmlisch krafft/
Mercurisch seyr im geyst verhafft.
Wiewol wir menschen sunst gering/
Noch hat ein yeder sein geding/
Sein gab/vnd gnad in sonderbeyr.
Wol dem/ders fruchtbarlich anleyr.

A P P E N D I C I S

INDEX Appen dicis singlarū Her barum huius To mi Secundi.

¶ A	
A BSINTHIUM	174 d
Acacalis	8
Acacia	9. 41
Acantha	19
Acanthion	60.
Acedula	176 c
Acetofa	117 168
Aconitum	18 61 b 151 b
Acorus	1. 41 169 a
Adarca	99 b 100 c
Adarche	47 b 72 c
Adhil	169 a
Adiantos	29
Aegilops	10 34 74 d 212 d
Agrimonia	133 a 171 b
Aera	73 a 111 a
Aethyopiae olea lachryma	9
Agalloche	4
Agaricus	19
Agnos	9
Agnus castus	174 d
Aizoum maius & minus	28
Albara	34
Albized	15
Alcea	35
Alchafengi	121 c
Alchanna	127 a
Alcibium	52 d 77 b 107 a
Aleuia	179 a
Alibium	154 d
Alœ	239 a 114 d
Alfine	28 145 a
Alhæa	15
Aluta	125 a
Alyson	21
Ambrosia	25
Ambubicia	96 d
Ameos	168 d
Amigdalæ	10
Ammi	21
Amomi semen	4
Amurca	9
Amylum	15
Anagallis	19 170 d
Anagyris	25
Anchusa	26
Andachoeche	174 d
Anemon	34
Angelica	155 b 165 b
Anguilla	11
Anisum	21
Anonis	20

Anthemis	118 c
Anthera	30 d
Anthyllis	24
Anurhinon	29
Aparine	11 67 a
Apium hortulanum	38 c
Apij genera	21
Apocynon	23
Apollinaris	60.
Arbutus	10
Arction	23 55 b 109 b
Argemone	19
Argemonia	119 b
Avifarum	18
Aristolochia	46 c 174 d
Armeniacæ	9
Arnoglossa	16
Aron	18
Arthanita	176 c
Artemisia	23
Arum	169 a
Afarum	1. 167 a
Assarus	157 a
Asclepius	22
Asparagus	16 18
Asphalathus	4. 41 a
Asphaltos	7
Asphodelus	159 a
Asplenion	24 120 d
Aster	29
Astragalus	23
Astrantia	55 b 163 b
Athera	15
Atractylis	22
Atriplex	16
Auena	57 b 112 d
Auricula muris	29

¶ B	
B ACCHAR	20 32
Bactiosere	172 c
Balaustium	9
Ballote	25 90 c
Balsamita	170 d
Balsamum	4
Bardana	180 c
Bdellium	7
Bechion	23
Berberis	174 c
Beronica	25 45 b 93 b 171 b
Bezed	35
Bibinella	66 d
Blitum	16
Borrago	86 c 120 c 132 c
Borrys	23
Brassica	16 164 d
Brathos	8
Brion	4
Bromi	15
Bromos	30

Buglossa	29 37 85 b 120 c 131 c
Bulbus uomitorius	18
Bulbus cibarius	60.
Buniada	15
Bupthalmus	24 119 a
Buprestis	14
Buryrum	60.
¶ C	
C ALAMENTUM	144 b e
Calamentum fluuiiale & mon-	
tanum	168 c
Calamintha	10
Calamus	2
Calamus aromaticus	4. 41 a
Caliopis	28
Callitrychon	123 b
Camphorata	179
Cancanum	4
Cancer	11
Cantharides	14 154 c
Capillus Veneris	123 b 174 c
Capnos	29
Capparis	19
Caprifoliū	32 d 171 a
Caput monachi	119 a
Carabe	147 a b
Cardamomū	3. 35
Carduncellus	178 d
Cardus	126 c 176 c
Cardus benedictus	60 d &c
Caros	177 a
Caros	28
Castor	13
Cassia	4. 38 a 135 a
Caranance	29
Carapota	52 d 106 d
Caraputia	ibidem
Caucalis	17
Cauda æquina	125 b 130 d
Cedria	8
Cedris	60.
Cedrides	60.
Centaurium	152 d
Centaurium maius	161 a 65
b 19	
Centunculum	35 a 107 b
Centumneruia	177 b
Centumnodia	118 c
Cepæa	25
Cerafia	8
Chamæcisus	29
Chamædaphne	20 56 c 67 a
71 b 110 c	
Chamædaphne duplex	110 d
Chamædrys	22 31 161 a 169 b
Chamælea	30 139 b
Chamæleon	126 c
Chamæleo albus	19

Chamæmilon 113 c
 Chamomilla ibi.
 Chamæpitys 25 120 d 161 a
 Cheiri 176 d
 Chelidonia 19 175 a
 Chriſtophori herba 171 a
 Chryſion 119 a
 Chryſcome 27
 Chryſantheon eo.
 Cibalaria 382 c
 Cicerbita 16 82 b 158 c 173 a
 Cichorea 123 a 158 c 171 b
 Ciclaminoſ 117 b
 Cicuta 61 b 133 b 140 d 181 b
 Cinnabaris 58 d 90 d 114 d
 Cinnamomū 4 38 d
 Ciradia 24
 Ciſſampelos 55 a 117 b
 Ciſſus 43 d 101
 Ciſthus 43 d 83 101 138 d
 Citria 37
 Citrullus 174 c
 Clematis prima 16
 Clinopodium 22
 Cnicus 30
 Colchicon 23
 Colocynthis 31
 Colymbades 9
 Conchula indica 10
 Condrylla 17 172 c
 Conſolidæ 170 d
 Conuoluolum 54 c 55 a
 Conyza 24
 Coreum 27
 Corion 21
 Cornus 19
 Coronopus 16
 Corrigiola 172 c
 Cortex thuris 7
 Coſtus 4
 Corylidon 31
 Cræſſula 177 b
 Cræſſula maior eo. d
 Crateogonon 24
 Crinum 14
 Criſpula 179 a
 Crithmum 16
 Crocus 4
 Crocomagma eo.
 Cucumer ſylueſtris 30
 Cucurbita 17
 Cucurbita ſylueſtris 30
 Cupreſſus 7
 Cuſcuta 169 b
 Cyclamen 13
 Cyclaminus eo. 95 b
 Cyclamini radix 46 c
 Cynogloſſa 29
 Cynorhodus 161 b

Cyperus
 Cyphi
 Cyprus
 Cytisus
 Cytus

D

Daphnides
 Daucus 21 158 d 163 d
 Delphinum 22
 Dens leonis 123 a 158 d
 Dictamnus 20
 Dictamnus 40 c
 Diſſacus 126 b
 Dracontius 126 c 167 b
 Dracunculus 18

E

Eboris raſura
 Ebulus 180 d
 Echium 52 d 77 b 107 a
 Erenbreiſ 156 d
 Elatina 12 124 d
 Elleborus 181 a
 Eleſtrum 147 b
 Eleomel 5
 Emperum 45 b 93 a
 Endiui 123 a 157 b 172 d
 Endiui ſylueſtris 124 c
 Enula campana 121 b
 Ephemerum 28 c
 Epimedium 26
 Epipactis 29
 Equiſetum 27
 Erica 8
 Erinaceus 10
 Eringerion 28 35
 Eringion 20 125 b 159 b
 Eruca 17 167 b
 Eruſia 32 d
 Eruum 15
 Eryon thalaſſium 28
 Eſula 166
 Euphorbium 22
 Eufragia 174 c 175 b
 Eupatorium 27 119 b 169 a 153 a

F A B A ægyptia

Fidicula 15
 Filix 29
 Filix 177 a
 Fragaria 175 b
 Fragaria duplices 99 a
 Fraxinus 8
 Fuligo thuris 7

G

Gallitricum

Garum 1
 Garyophylli 4
 Geneſta 127 a
 Gentiana 29
 Geranion 9
 Gith 22
 Glans unguentaria 30
 Glaſtum 50 c 70 a 104 c d
 Glaucium 22
 Gluten piſcium eo.
 Glutinum eo.
 Glycyrridis 35
 Glycyrriza 19
 Glycyſida 28
 Gramen 123 c 161 b 26
 Graminis ſloſ 155 b
 Granum Indicum 52 a
 Grapaldum 23 32
 Graſſblumen 155 161 b
 Graua Dei 181 b
 Gualda 105 b

H A L I C A

Harmel 175 a
 Haſenpoſſien 156 d
 Hebenus 8 32
 Hedera 49 b 61 a b
 Hedera terreſtris 124 d
 Helenium 9
 Helichryſon 27
 Heliotropium 46 d 77 b 90 d
 Helxine 27 145 a
 Helxine duplex 141 b
 Hemerocallis 24
 Heradium 45 a
 Herbarij excudendi formula 127 b & ſeq.
 Herba S. Mariæ 177 a
 Herba muſcata 178 d
 Hiacyanthus 28
 Hieracia duplex 32
 Hierobotane 31
 Hippace 16
 Hippogloſſus 29
 Hippuris 125 b
 Hoſoſteum 29
 Holuſarum 28
 Hordeum 14
 Horminum 29 b
 Hydropiper 13
 Hyoſcyamus 38
 Hypericon 25 120 d 182 d
 Hypocitiſ 3. 32
 Hyrundo 14

I A S I N E

Iberis 10
 Inguinalis 157 a
 Intybus 16 38 c 123 a

I N D E X A P P E N D.

Inybus duplex	96 d	Lotus	9	Narcaphthum	4
Inula	162 c	Lunaria	160 d	Narcissus	124 c
Iringus	170 c	Lupinus	15	Nardax	22
Irion	18	Lupulus	169 b	Nardus celtica	5
Iris	3	Lychnis	22	Nardum montanum	60.
Isatis	104 d 125 a 143 a	Lychnis sylvestris	23	Nardi spica	39 b
Isatis sativa	19	MACER	3	Nardus gallica	113 a
Isohyron	29		3	Niegelblum	156 d 162 c
Iua	166 172 c	Malabathrum	4. 39 b	Nenufar	122 d
Iuiubæ	150 d	Malus	9	Nuces ponticæ	10
Iuncus	27	Mala sylvestria	60.	Nux myristica	41 a
Iuncus odoratus	4	Mala orbiculata	60.	Nymphæa	24 122 d
Iuniperus	7	Mala coronæa	60.	O	
Ixia	145 b	Mala medica	60.		
KEIRI	K	Malum punicum	60.	O Cimastrum	20 16
		Malicerium	60.	Ocimum	17
Körbelfraut	176 d	Mandragora	28. 179 b	Olea uaria	5. 6
L	L	Manna	129 b	Oleastellus	30
		Manna thuris	7	Oleaster	9
Lactuca	17 157 b	Maron	41 a	Olyra	15
Lactuce quatuor genera	104 d	Mastyche	7	Opobalsamum	38 c
Lactuca agrestis	124 c	Matersylua	32 d 178 d	Origanum persicum	168 d
Lada	102 c d	Matricaria	178 b 170 d	Orminon	44 c
Ladanum	9 138 d	Maturella	178 d	Ormithogalum	13
Lagine	103 d & seq.	Medica	18	Orobanche	17
Lagopus	26	Medion	26	Oryza	15
Lampfanz	16	Mæne	13	Ossifragus	14
Lana uicida	14	Melilotum	162 c	Osyris	30
Lapathium	51 a 116 d	Medissa	173 a	Oxylapathium	117 a
Lapathum	37	Melissophyllon	21	Oxymirline	56 d 110 d 143 d
Lapariolum	178 c	Memithe	149 a	PALIVRVS	3
Lapis cyanæos	37	Medomela	9		2
Lapis Lafuli	155 b	Mendesium	6	Palma	29
Lapis armenus	60.	Menta farracenica.	178 c	Panax	15
Laserpitium	32	Meon	3	Pancration	15
Lafine	28 c d	Metopium	6	Papauer erraticum	28
Lathyrus	30	Meu	169 a	Papauer cornutum	60.
Laureola	179 b	Mezereon	34 d 139 b	Papauer heraclium	91 d
Laurus	3	Milium folis	160 c	Paralyfis herba	171 b
Laurus Alexandrina	37	Milos arbor	66 d	Paritaria	124 d
Lemnia terra	39 b 40 b	Minium	115 a	Paronychia	17
Lemnium sigillum	48 c 80 c	Mintha	20	Parthenium	24 45 b 94 c 113 c
Lens palustris	28	Mixaria	35	Pastilli rofei	9
Lentiscus	7	Moly	20	Pastinaca	12
Leontopetalion	2	Momum	38 d	Pastinaca erratica	159 a
Leontopodium	29	MORICIA	156 d	Pentaphyllon	27 40 d 47 b
Lepidion	17 19 168 c		98 c 121 a	Penula	108 c
Leucoion	24	Mullum	11	Pëonia	24
Leucographis	44 c 91 a	Mus araneus	14	Perforata	175 b
Lichne	17	Myotis	35	Periclymenos	31
Lichene	151 b	Myofotis	145 a	Persea	10
Lidium	9	Myrrha	3	Persicaria	173 b
Ligustru	8 23 54 c 127 a	Myriophyllon	29	Persica poma	9
Limonium	26	Myrrhis	60.	Perfolatia	177. 3
Linaria	160 d	Myrtidandum	9	Perfonata	109 b
Lingua auis	167 d	Myrtus	60.	Perfonaria	55 b 77 a
Lithospermon	24	N	N	Pes leporis	123 a
Lolium	57 b 111 a 164 c			Pes coruinus	146 b
Lonchitis	25	Napellum	61 b 131 b 140 d	Pes columbinus	174 d
		Naphra	7		

A P P E N D I C I S

Petroelinum	40 c	Ranunculus	19	Sepia	39
Petalites	29	Rapa syluestria	15	Seps	14
Peucedanum.	12. 170 c	Refina terebinthina	40 c	Seridis species	17 56 d
Phalangium	23	Rhamnus	8	Seriphium	35
Phalaris	24	Rhaphanus 15 38 c 163 b	167 a	Serpilium	172 c
Phaselus	15 149 b	Rhaphanus syluestris	16	Sertula campana	20
Phasiolus	ibi.	Rheubarbarum	42 c 130 c	Seseli	21
Phoenix	27	Rheum	38 d	Seseli aethiopica	60.
Phyllirea	8	Rhododendron	28	Sideritis	26 130 d
Phyllis	23	Rhos	14	Sigillum lemnium	80 c
Phylliris	60.	Rhus obfoniorum	9	Silaus	58 c. 79 b 113 b
Phu	169 a	Ricinus	30	Siler montanum	163 c
Picea	7	Rubeca	28 175 a 169 a	Siliqua	9
Pilosella	181 c	Rubrica Lemnia	109 c	Silurus	13
Pineae nuce	7	Rubus	17 180 c	Sisymbrium	16
Pinus	60.	Rubus canis	8	Sium 16 58 c. 79 b 113 b	121 b
Piscacium	10	Rumex	16 105 a	Smilax	13 30
Pityusa	30	Ruscus	30	Smyrnion	21
Pix	7	Ruta syluestris	131 a 169 a	Solanum	28
Praeficca	60.	S A C			Solatrum 30 112 c 169 b
Plantarum genera quatuor	20 c				Soldana 83 a 156 d
Platanus	8	Sagapenum	137 b	Solsequium	158 c 171 a
Polemonia	26	Salamandra	22	Sonchus	158 c
Polenta	41	Saliunca	43 a	Spargamon	26
Polion	31	Salix	9	Spargula	171 b
Polium	44 d 91 b	Samfuchus	180 170 d	Sparuum	30
Polium montanum	23	Sanamunda	171 a	Sphondilium	22
Polycnemom	22	Sandaracha	136 d	Spica nardi	39 a
Polygonon 25 31 11 c 163 a		Sanguinaria	110 c 162 c	Spina acuta	8
Polygonatum 25 31		& seq.	170 d	Spina arabica	19
Polypodium 43 b 110 d 170 c		Sanguis draconis duogua	115 b	Spina syluestris	20
Polyneuros	31	Sanicula	99	Spina alba	60.
Polytricum 123 b 178 c		Santonicum	35	Spinachia	16 159 b
Pompholix	41 a	Saponaria	52 c	Spinacium	38 c
Populus 8 148 c		Saxifragia	170 c	Stachys 23 44 c 90 d	
Populus alba	34	Saxiphagos	26	Stacte	6
Populus nigra	60.	Satureia	10 160 d	Stafisagria	30 182 c
Portulaca	16	Satyron	24	Stellariae herbae	157 b
Poramogeron	23	Scabiosa	173 b	Stratores	23
Praefum	89 b	Scamonia	30 31 169 a	Stratiotes chiliophyllon	60.
Praefum	ibi.	Scandix	17 125 a	Strichnos	112 c
Praecocia	9	Scariola	167 a 173 a	Strobili	7
Prunus	10	Scatuncellus	180 c	Struthium	13
Psilium	169 b	Scea	15	Syrax	7
Prarmica	13	Scincus	14	Storcifschabel	157 a
Pteris	35	Schoenanthos	7	Sucutum 41 b 159 a	
Pulicaria	161 a	Schoenus	31 39 b	Sydiae	35
Pulicaria minor	179 b	Schiftum lac	14	Symphytum	26 41 b
Pulmo uulpis	13	Scolopendria	31 65 d	Syriaca herba	170 d
Pyrastrum	10	Scolymos	19 126 d	T A P	
Pyretum	11	Scordium	37 40 c 169 a		
Q Vinqfoliū		Scorpiodes	30	Tapfus barbatus 111 b 176 c	
		Scylla	18	Taraxacon	166
Q Vinqfoliū		Sebeste	110 d	Tarcon	38
		Secacul	115 b 167 a	Taxus	19
Q Vinqfoliū		Securidaca	24	Telephium	18
		Seitaragi	169 c	Terminthos	7
Q Vinqfoliū		Semen Careos	35	Terralemania 39 b 47 b	
		Semperliua	181 a	Terra figillata	48 c
Q Vinqfoliū				Tetrac	177 b
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					
Q Vinqfoliū					

INDEX APPEND.

Thapsa	30	Tripolium	29 44 d.	31 b	Viscus quercinus	176 e
Thlaspi	13 37 40 d	Triticum		24	Viticella	175 b
Thus		Tubera		19	Vmbilicus Veneris	16
Thuris cortex	eo.	Tuderi		163 d	Vnguenta uaria	6
Thuris manna	eo.	Turbit	43 b. 51 a.	3; b.	Vngula caballina	111 c
Thuris fuligo	eo.	Typha		23 31	Volubilis	117 b. 132 c
Thymelæa	30	¶ V			Volucrum	108
Thymus	20	V Accinium		164 d	Vua lupina	180 c d
Tidymalus	30	Venti herba		71 b	Vua siccae	37
Tomentum	103 d	Verbascum	18	121 b	¶ W	
Tomentellum	eo.	Verbenä		131 b	Weggras	chriß a
Tormentilla	40 d. 91 b.	Verbenaca	23		Weißwurz	chriß d
Tragacantha	20	Vermes terreni		14	Wintgrüen	60.
Tragoponos	37	Vermicularis	121 c		¶ X	
Tragum	27	Vesicaria	123 c		X Anthion	29
Tribulus marinus	180 c	Victoriola	124 d		Xiphion	16
Trichomanes	29	Vincetoxicum	129 c		Xyris	60.
Trifolium	23 31 b.	Vipera		11	¶ Z	
Trifoli genera septem	162 c	Virga Pastoris	125 d		Z E A	14
Trifolium acetosum	176 d	Viscus	142 c		Zithum	60.

¶ APODIXIS Germanica sua ipsius serie sese legenti offert,

ARGENTORATI apud Ioannem
Schottum librarium. XIII. Febr.
Anno. M. D. XXXII.

Ciconiæ custodierunt tempus aduentus sui,
populus autem meus non cognouit iudiciū
Domini. Ieremiæ. s.



Innocentem & impium Domi-
nus consumit. Iob. 9.

¶ C V M Gratia & priuilegio Imperatoriæ
Maiestatis ad Quinquennium.